



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Karla Pallichová Vymětalová / 545 110 443
E-MAIL: karla.pallichova-vymetalova@ukzuz.cz

DATUM: 24. 7. 2019

1. *Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

a) *Informace k příbalovému letáku dle přílohy I odst. 1 písm. p) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Před použitím si přečtěte příložený návod k použití.

b) *Informace ke skladování přípravku podle přílohy I odst. 1 písm. q) a r) nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby; teplota skladování + 5 °C až + 30 °C.

c) *Kategorie uživatelů, kteří smí podle přílohy I odst. 1 písm. u) nařízení Komise (EU) č. 547/2011 přípravek používat:*

Profesionální uživatel

d) *Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:*

i. *Obecná ustanovení*

SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).

2. *Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:*

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob.

Po ukončení práce opusťte ošetřované prostory!

Opětovný vstup na ošetřený pozemek je možný až po zaschnutí.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí úletem, odparem ani splachem.

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

3. Rozsah povoleného použití:

ACTIVUS SC

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale ozimé, žito ozimé	plevele dvouděložné jednoleté s výjimkou heřmánků a rmenu rolního, chundelka metlice	4 l/ha	AT	3) postemergentně
kukuřice setá	plevele dvouděložné jednoleté s výjimkou heřmánků a svízele přituly	4 l/ha	AT	3) postemergentně

AT - ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Dávka vody: 200 - 400 l/ha

Maximální počet aplikací: 1x v plodině

Přípravek se v ozimých obilninách aplikuje na podzim v růstové fázi plodiny BBCH 10-13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. listu: 3. list rozvinutý.

Růstová fáze plevelů: v růstové fázi BBCH 10-13 tj. první list vystoupil z koleoptile, dělohy plně rozvinuty až do fáze 3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty.

Citlivé plevelé:

penízek rolní, pomněnka rolní, kokoška pastuší tobolka, zemědělm lékařský, chundelka metlice (do BBCH 11), konopice polní, mák vlčí, svízel přitula, ptačinec žabinec, hluchavky, rozrazil, violky, lipnice roční

Méně citlivé plevelé:

výdrol řepky, nepatrnec rolní, psárka polní, chundelka metlice (od BBCH 11).

Přípravek se v kukuřici aplikuje v růstové fázi plodiny BBCH 10-13 tj. první list vystoupil z koleoptile až do fáze 3. list vyvinutý.

Růstová fáze plevelů: v růstové fázi BBCH 10-13 tj. první list vystoupil z koleoptile, dělohy plně rozvinuty až do fáze 3 pravé listy, listové páry nebo přesleny rozvinuty.

Citlivé plevelé:

merlíky, laskavce, rozrazil, kokoška pastuší tobolka, zemědělm lékařský, violka rolní, konopice polní, hluchavky, lilek černý a lebeda.

Méně citlivé plevelé:

pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, rdesno červivec, bažanka roční, ježatka kuří noha, rosičky

Přípravek je vhodné aplikovat na vlhkou půdu, protože se aktivuje a tak se zvyšuje jeho účinnost.

Na lehkých písčitých půdách s nízkým obsahem organické hmoty se aplikace přípravku ACTIVUS SC nedoporučuje!

Pokud po aplikaci přípravku následují silné srážky, nelze vyloučit splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Přípravek nelze použít v množitelských porostech kukuřice a v kukuřici cukrové.

Následné plodiny

V rámci normálního osevního postupu po sklizni plodiny a orbě do hloubky min. 20 cm není omezena volba následných plodin. Nelze vyloučit poškození následně pěstovaných meziplodin a řepky ozimé.

Náhradní plodiny

Pěstování náhradních plodin konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek ACTIVUS SC se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

ACTIVUS SC	bez redukce	tryska 50 %	tryska 75 %	tryska 90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]				
ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé	30	15	7	4
kukuřice	30	14	7	4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]				
ječmen ozimý, pšenice ozimá, tritikale ozimé, žito ozimé, kukuřice	15	10	5	5

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek nelze na těchto pozemcích aplikovat ani při použití vegetačního pásu.