



ČR – ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ,
organizační složka státu
SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ
ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN
Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Věra Fridrichová /545 110 474
E-MAIL: vera.fridrichova@ukzuz.cz

DATUM: 6.3. 2014

Gamit 36 CS – rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
řepka olejka	svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	
brambor	svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	
hrách	svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	
mák setý	svízel přítula, plevele dvouděložné jednoleté	0,25 l/ha	AT	

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Dávka vody: 300 – 400 l vody/ha

Max. počet ošetření: 1x za vegetaci plodiny

Růstová fáze plodiny v době aplikace:

- preemergentně do 3 dnů po zasetí
- brambory – po slepé proorávce, vegetační vrcholy musejí být pod povrchem půdy

Růstová fáze plevelů v době aplikace: nejsou vzešlé

Plevele citlivé: svízel přítula, ptačinec žabinec, kokoška pastušůvka

Předpokladem účinnosti přípravku je dostatečná půdní vlhkost, herbicid musí být aktivován např. srážkami. Na půdách s vyšší sorpční schopností a na půdách s vysokou náchylností na vysychání povrchových vrstev nelze vyloučit snížení účinnosti.

Při aplikaci na písčitéch půdách, zejména s obsahem humusu pod 1 %, není vyloučeno poškození porostu.

Pokud po preemergentní aplikaci přípravku následují srážky, nelze vyloučit, zejména na lehkých půdách, splavení přípravku do kořenové zóny rostlin a následné poškození ošetřovaného porostu.

Případné příznaky fytotoxicity jsou zpravidla přechodného charakteru bez vlivu na další růst a výnos plodiny.

Pěstování následných plodin bez omezení.

Citlivost náhradní plodiny konzultujte s držitelem povolení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje pouze účinnou látku klomazon na stejném pozemku po sobě bez přerušení ošetřením jiným herbicidem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek se aplikuje postřikem.

Nedostatečné vypláchnutí aplikačního zařízení může způsobit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.