



ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Sídlo ústavu: Hroznová 63/2, 656 06 Brno

SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ

ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO

VYTVOŘIL/TELEFON: Ing. Marcela Nováková /545 110 471

E-MAIL: marcela.novakova1@ukzuz.cz

DATUM: 21. 3. 2014

Corzal - rozsah povoleného použití přípravku

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	3) Poznámka
cukrovka, řepa krmná, řepa salátová červená	ptačinec žabinec - je méně citlivý	2 l/ha 80-200 l vody /ha do celkové dávky 6 l/ha/vegetační sezónu	AT	1) od: 13 BBA 2) ve f. 10 BBCH 3) max. 3x , aplikace je dělená

AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny.

Při aplikaci je třeba používat zařízení vybavené míchacím zařízením.

Upřesnění podmínek aplikace:

Spektrum účinnosti:

plevele citlivé: -

plevele méně citlivé: ptačinec žabinec

plevele odolné: lebeda rozkladitá, merlík bílý, opletka obecná, jednoleté trávy

Růstová fáze plodin v době aplikace: v aplikačním termínu T1 – BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté; T2, T3 – po vzejití nové plevelné vlny

Počet aplikací: aplikace je dělená v termínech T1-T2-T3, interval mezi aplikacemi je min. 7 dní; poslední aplikace nejpozději před zapojením porostu plodiny

Růstová fáze plevelů v době aplikace: BBCH 10, tj. děložní listy plně rozvinuté

Maximální počet aplikací: děleně, 3x za vegetační sezónu, do celkové dávky 6 l/ha

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem.

Přípravek neaplikujte, je-li plodina pod vlivem stresu, např. použitím jiných pesticidů, poškození větrem, nedostatkem vápníku, nedostatkem živin, napadením hmyzem nebo houbami atd. – porost může být nevratně poškozen.

Neaplikujte po mrazíku nebo jsou-li očekávány mrazíky nebo je-li očekáván déšť. Déšť do 2 hodin po aplikaci může snížit účinek ošetření.

Aplikujte pouze na suchý porost.

Neošetřujte plodinu v případě vysoké intenzity světla nebo při vysokých teplotách (>21°C). V takových případech odložte aplikaci na večer.

7 dnů před aplikací nebo po aplikaci neprovádějte válení ani vláčení kulturními branami.

Nelze vyloučit přechodné projevy fytoxicity na ošetřované plodině.

Účinky na zpracování plodin a na kvalitativní výnosové parametry konzultujte s držitelem povolení.

V případě zaorání ošetřené plodiny je možné vysévat řepu ihned po aplikaci. Ostatní plodiny po orbě do hloubky 15 cm.

Pěstování následných plodin je bez omezení.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty úletem, odparem ani splachem!

Přípravek nelze použít v množitelských porostech!

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Corzal.