

Greenhouse gas emissions arising from the cultivation of rapeseed (canola oilseed) in the Czechia regions
(tonne CO₂-eq/tonne rapeseed harvested on dry matter basis)

NUTS 2 region according to Regulation (EC) No 1059/2003	Soil N ₂ O		Embedded			Fuel Use	Seed	Total
	Direct	Indirect	Fertiliser	Neutralisation	Pesticide			
CZ 01 Hl. město Praha	0,1650	0,0114	0,1967	0,0063	0,0055	0,1102	0,0007	0,4958
CZ 02 Střední Čechy	0,1651	0,0128	0,1823	0,0065	0,0056	0,1095	0,0008	0,4826
CZ 03 Jihozápad	0,2537	0,0497	0,1766	0,0108	0,0055	0,1099	0,0008	0,6070
CZ 04 Severozápad	0,2043	0,0319	0,1688	0,0103	0,0049	0,1138	0,0008	0,5348
CZ 05 Severovýchod	0,2908	0,0623	0,1921	0,0116	0,0059	0,1094	0,0008	0,6728
CZ 06 Jihovýchod	0,1805	0,0149	0,1999	0,0138	0,0057	0,1125	0,0008	0,5281
CZ 07 Střední Morava	0,3036	0,0692	0,1821	0,0106	0,0055	0,1069	0,0008	0,6786
CZ 08 Moravskoslezsko	0,3741	0,0998	0,1758	0,0087	0,0046	0,1063	0,0008	0,7701