



VĚSTNÍK

ÚSTŘEDNÍHO KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO
ÚSTAVU ZEMĚDĚLSKÉHO

Ročník XXIV

Řada: Národní odrůdový úřad
Číslo: 4
Č. j.: UKZUZ 099497/2025

Vydáno: 15. července 2025

POPISY ODRŮD

zapsaných ve Státní odrůdové knize
v období od 16. června 2024 do 15. června 2025

Descriptions of Varieties

listed in the State Variety Book
during the period from 16. 6. 2024 to 15. 6. 2025

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, stručné popisy významných pěstebních a užitkových vlastností odrůd pěstovaných rostlin, které byly zapsány do Státní odrůdové knihy v období od 16. června 2024 do 15. června 2025 (mimo dobrovolně registrovaných odrůd a odrůd ovocných rodů a druhů registrovaných na základě úředně uznaného popisu).

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture publishes pursuant to Article 33 (6) of the Act No. 219/2003 Coll., on the marketing of seed and planting material of cultivated plants and amending certain acts (Act on the marketing of seed and planting material), as last amended, brief descriptions of the most important characteristics for cultivation and use of the varieties of cultivated plants registered into the State Variety Book during the period from June 16th, 2024 to June 15th, 2025 (except the varieties registered voluntarily and the varieties of the fruit genera and species registered on the basis of the officially recognised description).

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
CZ - 603 00 Brno, Hroznová 63/2, Czech Republic
Tel.: +420 543 548 111
e-mail: nou@ukzuz.gov.cz
<http://www.ukzuz.cz>

Obsah

	Strana
Zemědělské druhy	5
Obilniny	5
Krmné plodiny	15
Trávy	15
Luskoviny	18
Jeteloviny	20
Olejniny a přadné rostliny	20
Brambor a jiné okopaniny	24
Réva	27
Zeleninové druhy	28
Ovocné rody a druhy	40

Zemědělské druhy

Obilniny

Čirok

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. *bicolor*

Trail Boss BMR je dvouliniový středně pozdní hybrid s mutací BMR (brown mid rib).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, průměr stébla středně velký až velký, list dlouhý, středně široký. Lata hustá s vysokou polohou nejširší části, obilky oranžové. Doba metání lat velmi pozdní.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a teplejší řepařské.

Ječmen

Hordeum vulgare L.

- jarní

- dvouřadý

LG Lokal je polopozdní sladovnická odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná proti napadení spálou ječmene, středně odolná proti napadení růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské a bramborářské oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 4,6 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením "České pivo".

LG Vaclav je polopozdní sladovnická odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání, odolná proti lámání stébla pod klasem. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí, spálou ječmene a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti a v obou variantách v bramborářské oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné oblasti a v ošetřené variantě pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 5,0 bodu. Odrůda je doporučena Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením "České pivo".

SY Signet je sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda méně odolná proti poléhání, středně odolná až odolná proti lámání stébla pod klasem. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká až vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Odolná proti napadení padlím ječmene na listu a spálou ječmene, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a růžověním klasů ječmene.

Výnos předního zrna v obou variantách pěstování v bramborářské oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v řepařsko-obilnářské oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě v kukuřičné oblasti středně vysoký.

Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,4 bodu.

- ozimý

- dvouřadý

Organa je dvouřadá středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Hmotnost tisíce zrn vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Středně odolná proti napadení padlím ječmene na listu a komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, odolná proti napadení spálou ječmene, odolná proti napadení virovou žlutou zakrslostí ječmene (BYDV).

Dle testů mrazuvzdornosti odrůda středně odolná až odolná proti vymrznutí.

Výnos zrna v rámci sortimentu dvouřadých odrůd v obou variantách pěstování velmi vysoký.

- víceřadý

KWS Antonis je víceřadá středně raná odrůda.

Rostliny vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká až vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím ječmene na listu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, komplexem listových skvrnitostí a spálou ječmene.

Dle testů mrazuvzdornosti odrůda odolná proti vymrznutí.

Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd v neošetřené variantě pěstování středně vysoký až vysoký, v ošetřené variantě pěstování vysoký až velmi vysoký.

RGT Alessia je víceřadá středně raná odrůda.

Rostliny vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla. Hmotnost tisíce zrn středně vysoká až vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím ječmene na listu, méně odolná proti napadení hnědou rzivostí ječmene, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí a spálou ječmene, odolná proti napadení virovou žlutou zakrslostí ječmene (BYDV).

Dle testů mrazuvzdornosti odrůda méně odolná proti vymrznutí.

Výnos zrna v rámci sortimentu víceřadých odrůd v neošetřené variantě pěstování vysoký, v ošetřené variantě pěstování vysoký až velmi vysoký.

Kukuřice

Zea mays L. (partim)

Armoreen je tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Caballo je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid pro kombinované využití na siláž nebo na zrna (číslo ranosti 230 S, 240 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos zrna vysoký.

Výnos suché hmoty vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské a na zrna v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

DKC3148 je tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 220 S).

Rostliny vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělské výrobní oblasti bramborářské.

DKC3247 je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 230 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

DKC3559SC je tříliniový (Tc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 280 S).

Jedná se o hybrid se zkrácenými internodii (Short Stature Corn).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) nízká až středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost DINAG / (INRA) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Edoro je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Eleganto je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 230 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Evenia je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti 260 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Fizz je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 320 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Galismo je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) středně vysoká. Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Iquique je dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty vysoký až velmi vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovená s využitím NIRS) nízká až středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovená s využitím NIRS) nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Javelo je čtyřliniový (Dc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 260 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Kabelo je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 200 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ. Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Keldeo je dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti 240 S).

Rostliny vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp. Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký až středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

KWS Artesio je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

KWS Kaduro je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 240 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné a řepařské.

KWS Lupollino je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos suché hmoty vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký až vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

KWS Norento je tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

KWS Seducto je dvouliniový (Sc), středně pozdní až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 300 S).

Rostliny vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty nízký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Lautario je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos suché hmoty vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Lesno je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 330 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

LG31298 je tříliniový (Tc), středně raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

LG31301 je tříliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

LID2214C je dvouliniový (Sc), raný až velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 250 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

LID2233C je tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 270 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

LID2623C je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos suché hmoty vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký až středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepašské a bramborářské.

LID3315C je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 310 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

Meditia je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 220 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

Pedro je dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 270 S).

Rostliny velmi vysoké, palice nasazený vysoko až velmi vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký až vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepašské.

P8902 je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 270 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

P9944 je dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 340 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká,

stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) vysoká.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.

P9975 je dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti cca 360 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna vysoký až velmi vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.

Quarido je dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti 220 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn malý až středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu vysoký až velmi vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

Queenstown je dvouliniový (Sc), středně raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 300 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Radmilo je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty středně vysoký, obsah škrobu středně vysoký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) středně vysoká až vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

RGT Alonixx je tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské.

RGT Alpixx je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

RGT Peterxxon je dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 290 Z).

Rostliny vysoké až velmi vysoké, palice nasazený vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna koňský zub.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Tiviera je tříliniový (Tc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 260 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ až mezityp.

Výnos zrna středně vysoký až vysoký.

Určen pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné a řepařské.

Variolo je tříliniový (Tc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti 320 S).

Rostliny vysoké, palice nasazené vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý typ.

Výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký, výnos zelené hmoty nízký až středně vysoký, obsah škrobu nízký, stravitelnost – ELOS (de Boever a kol., 1986, stanovena s využitím NIRS) nízká, stravitelnost – IVDOM (Tilley and Terry, 1963, stanovena s využitím NIRS) nízká až středně vysoká.

Určen pro pěstování na siláž v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.

Oves setý

Avena sativa L.

- jarní

Waran je pluchatá středně raná odrůda.

Rostliny vysoké, odrůda odolná proti poléhání, středně odolná proti lámání stébla pod latou. Zrno velké, barva pluchy žlutá.

Odrůda středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím ovsa.

Výnos zrna vysoký, výnos čistých obilek středně vysoký až vysoký.

Pluchatost středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká. Obsah dusíkatých látek středně vysoký. Výtěžnost ovesné rýže vysoká.

Pšenice setá

Triticum aestivum L. subsp. *aestivum*

- jarní

Laskarina je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně odolná až odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování velmi vysoký, v ošetřené variantě pěstování vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek v sušině vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká až vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká až velmi vysoká.

- ozimá

Ambientus je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně až méně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až nízký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až nízký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva velmi vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký až vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká až nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

Dalmatius je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí

pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů náchylná k napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu středně vysoká až vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Elliska je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno velké.

Středně až méně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

KWS Espinum je pekařská pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžováním klasu pšenice, středně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti nízký, v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti nízký, v řepařské oblasti středně vysoký až nízký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

KWS Peplum je poloraná odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Méně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, středně až méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti a v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Objemová výtěžnost pečiva velmi nízká, obsah dusíkatých látek velmi nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.

LG Abraso je raná odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná

proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná až odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký až velmi vysoký.

Odrůda nevhodná pro pekařské využití (kategorie C). Obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zelenyho testu nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

LG Aikido je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nízké, odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti velmi vysoký, v řepařské oblasti vysoký až velmi vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká až nízká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

SU Canolon je pekařská raná odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně až méně odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžověním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti vysoký, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek velmi nízký, hodnota Zelenyho testu nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

SU Marathon je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžověním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký, v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zelenyho testu středně vysoká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost středně vysoká.

SU Pulsion je pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno malé.

Odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, méně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů náchylná k napadení černou rzivostí trav, méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti vysoký, v bramborářské oblasti velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování ve všech oblastech velmi vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek velmi nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu středně vysoká, objemová hmotnost vysoká.

WPB Devon je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná až odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, středně až méně odolná proti napadení růžováním klasu pšenice, méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až nízký, v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký až vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objemová výtěžnost pečiva středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, hodnota Zeleného testu vysoká, vaznost mouky vysoká, hodnota čísla poklesu středně vysoká až vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Xenie je pekařská polopozdní odrůda.

Rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím pšenice na listu, středně odolná proti napadení padlím pšenice v klasu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí pšenice, středně odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí pšenice v klasu, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí pšenice, odolná proti napadení žlutou rzivostí pšenice na listu.

Dle provokačních testů středně odolná proti napadení černou rzivostí trav, méně odolná až náchylná k napadení růžováním klasu pšenice, středně až méně odolná proti vymrzání.

Výnos zrna v neošetřené variantě pěstování v kukuřičné oblasti středně vysoký až vysoký, v řepařské oblasti velmi vysoký, v bramborářské oblasti vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě pěstování v kukuřičné a v řepařské oblasti středně vysoký až vysoký, v bramborářské oblasti středně vysoký.

Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva velmi vysoká, obsah dusíkatých látek nízký, hodnota Zeleného testu středně vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost vysoká.

Tritikale

x *Triticosecale* Wittm. ex A. Camus

- ozimé

Triagent je polopozdní odrůda pro krmné účely.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání. Zrno střední.

Středně odolná proti napadení padlím tritikale na listu, méně až středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí tritikale, odolná proti napadení feosferiovou skvrnitostí tritikale v klasu, středně odolná až odolná proti napadení hnědou rzivostí tritikale, středně odolná proti napadení žlutou rzivostí tritikale.

Výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě pěstování vysoký.

Hodnota čísla poklesu středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, objemová hmotnost středně vysoká až vysoká, podíl předního zrna vysoký.

Žito

Secale cereale L.

- ozimé

SU Bebop je pekařská středně raná odrůda.

Rostliny vysoké, méně až středně odolné proti poléhání. Zrno středně velké až malé.

Odolná proti napadení padlím žita na listu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí žita, středně odolná proti napadení hnědou rzivostí žita.

Výnos zrna v rámci sortimentu odrůd typu populace v neošetřené i ošetřené variantě pěstování středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná pro pekařské využití. Objemová hmotnost středně vysoká, obsah dusíkatých látek středně vysoký, podíl předního zrna středně vysoký, hodnota čísla poklesu středně vysoká, amylografické maximum středně vysoké až nízké, teplota mazovatění středně vysoká.

SU Thor je středně raná hybridní odrůda pro využití na zelenou hmotu.

Rostliny středně vysoké.

Méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí žita.

Výnos zelené hmoty velmi vysoký, výnos suché hmoty vysoký.

Krmné plodiny

Trávy

Festulolium

x *Festulolium* Asch. & Graebn.

Melfest je tetraploidní odrůda pro pastevní využití.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. Doba metání pozdní až velmi pozdní.

Rychlost jarního růstu středně vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav a rzivostmi trav.

Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech vysoký.

Výnos suché hmoty ve všech užitkových letech velmi vysoký.

Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích ve všech užitkových letech nízký.

Jílek mnohokvětý italský

Lolium multiflorum Lam. subsp. *italicum* (A. Br.) Volkart

Arman je tetraploidní odrůda pro využití v monokultuře a jetelotravních směskách.

Růstový habitus na jaře střední. Doba metání střední.

Rychlost jarního růstu středně vysoká až vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav, středně odolná až odolná proti napadení rzivostmi trav.

Výnos zelené hmoty středně vysoký, výnos suché hmoty středně vysoký až vysoký.

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

BF-2 je diploidní travníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní travníky i pro ostatní travníkové plochy.

Big League je diploidní travníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní travníky i pro ostatní travníkové plochy.

Black Sparrow je diploidní travníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní travníky i pro ostatní travníkové plochy.

Clonakilty je diploidní odrůda pro pastevní využití.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. Doba metání pozdní.

Rychlost jarního růstu středně vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav a rzivostmi trav.

Výnos zelené hmoty v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký.
Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém a třetím užitkovém roce vysoký.
Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích ve všech užitkových letech nízký.

Dark Matter je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Gray Wolf je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Green Angel je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu středně až tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Lulu je tetraploidní odrůda pro pastevní využití.

Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Doba metání střední až pozdní.

Rychlost jarního růstu vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav a rzivostmi trav.

Výnos zelené a suché hmoty v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký.

Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích v prvním a druhém užitkovém roce velmi vysoký, ve třetím užitkovém roce středně vysoký.

Milanova je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu středně až tmavě zelená. Doba metání střední až pozdní.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Polly je tetraploidní odrůda pro pastevní využití.

Růstový habitus na jaře střední až polorozkladitý. Doba metání střední.

Rychlost jarního růstu vysoká. Hustota obrůstání po sečích středně vysoká.

Středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí trav a rzivostmi trav.

Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech středně vysoký.

Výnos suché hmoty v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce nízký až středně vysoký.

Výnos zelené a suché hmoty v prvních sečích ve všech užitkových letech velmi vysoký.

Sun Hawk je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu středně až tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

West Green je diploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus polovzpřímený. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Kostřava červená

Festuca rubra L.

Sea Hawk je hexaploidní krátce výběžkatá trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu středně až tmavě zelená. Doba metání raná.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Sebastian je hexaploidní trsnatá trávníková odrůda.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. Barva listu středně až tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Sockeye je hexaploidní krátce výběžkatá trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Kostřava ovčí

Festuca ovina L.

Whisper je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List krátký, světle až středně zelený, ojíněný. Doba metání velmi raná.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Kostřava rákosovitá

Festuca arundinacea Schreb.

Ambit je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Avenger III je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Bachelor je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Dynamite G-LS je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Inlustris G-LS je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro ztěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Raptor LS je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Sol je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Tabernas je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Talladega II je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Tank je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Teacher je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Titanium G-LS je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání polovzpřímený až střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Tuff je hexaploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus v metání střední. Barva listu tmavě zelená. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Lipnice luční

Poa pratensis L.

Arc II je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List středně široký až široký, středně až tmavě zelený. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Blue Gem je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. List úzký až středně široký, středně zelený. Doba metání pozdní.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Blue Wave je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List středně široký, středně zelený. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Ironblade je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. List středně široký, středně zelený. Doba metání střední až pozdní.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Kickstart je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List středně široký, středně až tmavě zelený. Doba metání raná

až střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

SR 2150 je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední až polorozkladitý. List středně široký, středně zelený. Doba metání pozdní.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Steelhead je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List středně široký, tmavě zelený. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Umbrano je trávníková odrůda.

Růstový habitus střední. List úzký až středně široký, středně až tmavě zelený. Doba metání střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávníkové plochy.

Psineček výběžkatý

Agrostis stolonifera L.

MTV1 je tetraploidní trávníková odrůda.

Růstový habitus na podzim v roce zásevu polorozkladitý. List na podzim v roce zásevu středně široký až široký, světle zelený až středně zelený. Doba metání raná až střední.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i jiné specifické trávníkové plochy.

Luskoviny

Bob polní

Vicia faba L. (partim)

Ketu je poloraná barevně kvetoucí odrůda, indeterminantní růstový typ.

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké. Hmotnost tisíce semen střední.

Výnos semene vysoký.

Obsah dusíkatých látek nízký až středně vysoký, nízký obsah vicinu a konvicinu.

Hrách polní (včetně pelušky)

Pisum sativum L. (partim)

- jarní

Colin je středně raná odrůda typu semi-leafless.

Počáteční růst rychlý. Rostliny nízké, barva květu červenavě purpurová, barva semene hnědozelená, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen vysoká. Méně odolná proti poléhání před sklizní.

Středně odolná proti napadení komplexem virových onemocnění, středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob.

Výnos semene vysoký až velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek nízký až středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký, obsah taninu nízký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká až střední.

Fleret je poloraná odrůda typu semi-leafless.

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké až vysoké, barva květu bílá, barva semene zelená, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Méně až středně odolná proti poléhání před sklizní.

Středně odolná až odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, středně odolná až odolná proti napadení komplexem virových onemocnění, středně odolná až odolná proti napadení mykoserelovou hnědou strupovitostí.

Výnos semene středně vysoký až vysoký.

Obsah dusíkatých látek středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká.

Iconic je středně raná odrůda typu semi-leafless.

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké až vysoké, barva květu bílá, barva semene žlutá, semeno elipsovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Středně odolná proti poléhání před sklizní.

Středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, středně odolná proti napadení komplexem virových onemocnění.

Výnos semene vysoký až velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká až střední.

LG Corvet je středně raná odrůda typu semi-leafless.

Počáteční růst středně rychlý až rychlý. Rostliny středně vysoké, barva květu bílá, barva semene žlutá, semeno elipsovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Méně až středně odolná proti poléhání před sklizní.

Středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, středně odolná proti napadení komplexem virových onemocnění.

Výnos semene vysoký.

Obsah dusíkatých látek středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká.

NOS Impact je středně raná odrůda typu semi-leafless.

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké až vysoké, barva květu bílá, barva semene žlutá, semeno válcovitého tvaru. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká, barevná vyrovnanost semen vysoká. Středně odolná proti poléhání před sklizní.

Středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob, středně odolná proti napadení komplexem virových onemocnění.

Výnos semene vysoký.

Obsah dusíkatých látek středně vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká až střední.

Lupina bílá

Lupinus albus L.

Zubejda je středně raná odrůda, determinantní růstový typ.

Počáteční růst rychlý. Rostliny středně vysoké až vysoké, barva křídel modrobílá, barva špičky člunku modročerná. Semeno bez kresby, semena se středně vysokým až vysokým obsahem hořkých látek, hmotnost tisíce semen střední.

Středně odolná k napadení komplexem antraknóz.

Výnos semene vysoký.

Obsah dusíkatých látek nízký až středně vysoký.

Jeteloviny

Jetel luční

Trifolium pratense L.

Amalthea je diploidní, středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání.

Lodyha středně dlouhá, středně tlustá. List středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký.

Rychlost jarního růstu vysoká. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odolná proti napadení krčkovými a kořenovými hnilobami jetelovin, středně odolná proti napadení padlím jetele a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí jetelovin.

Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce velmi vysoký.

Garbin je tetraploidní, středně raná odrůda, středně odolná až odolná proti poléhání.

Lodyha středně dlouhá až dlouhá, středně tlustá. List středně dlouhý až dlouhý, středně široký.

Rychlost jarního růstu vysoká. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Středně odolná proti napadení krčkovými a kořenovými hnilobami jetelovin, středně odolná proti napadení padlím jetele a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí jetelovin.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, ve druhém užitkovém roce vysoký. Výnos suché hmoty v obou užitkových letech vysoký.

Vinovia je diploidní, středně raná odrůda, středně odolná proti poléhání.

Lodyha středně dlouhá, středně tlustá. List středně dlouhý, středně široký.

Rychlost jarního růstu vysoká. Rychlost obrůstání po sečích středně vysoká až vysoká.

Odolná proti napadení krčkovými a kořenovými hnilobami jetelovin, středně odolná proti napadení padlím jetele a středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí jetelovin.

Výnos zelené a suché hmoty v prvním užitkovém roce vysoký, ve druhém užitkovém roce velmi vysoký.

Jetel nachový

Trifolium incarnatum L.

Invincible je nízká až středně vysoká odrůda, odolná proti poléhání.

Začátek kvetení je středně raný, rychlost jarního růstu je středně vysoká. Výnos zelené hmoty vysoký, suché hmoty nízký.

Olejníky a přadné rostliny

Hořčice bílá

Sinapis alba L.

MHR Palma je středně raná žlutosemenná odrůda určená pro pěstování na semeno.

Rostliny středně vysoké, méně až středně odolné proti poléhání před sklizní.

Výnos semene vysoký. Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.

Nežádoucí výskyt šedých a jinak zbarvených semen nízký.

Len

Linum usitatissimum L.

- olejní

Gilbert je raná až středně raná odrůda olejného lnu.

Rostliny středně vysoké. Barva květu modrofialová, barva semene žlutá, hmotnost tisíce semen středně vysoká. Výnos semene a oleje v rámci celého sortimentu středně vysoký. Obsah oleje vysoký, skladba mastných kyselin nezměněna, jodové číslo velmi vysoké. Obsah kyseliny alfa-linolenové velmi vysoký a linolové nízký.

Mák setý

Papaver somniferum L.

- jarní

Avatar je středně raná modrosemenná odrůda určená pro produkci semene pro potravinářské účely.

Rostliny jsou nízké, středně odolné proti poléhání.

Odrůda je méně odolná proti napadení pleosporovou hnědou skvrnitostí máku na listech a méně odolná proti napadení pleosporovou hnědou skvrnitostí máku v tobolkách, středně odolná proti napadení plísní máku. Odrůda typu slepák, výskyt hleďáků nízký.

V rámci sortimentu modrosemenných odrůd výnos semene velmi vysoký, výnos makoviny středně vysoký až vysoký a výnos morfinu středně vysoký až vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Obsah morfinu v makovině středně vysoký.

Řepka

Brassica napus L. (partim)

- ozimá

Andor je středně raný pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině nízký až středně vysoký.

LG Aphrodite je polopozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování středně vysoký až vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině středně vysoký.

LG Avenger je polopozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně až středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký až vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký až vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině středně vysoký.

LID Invicto je středně raný pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni velmi vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině středně vysoký až vysoký.

LID Sandro je středně raný pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny vysoké, odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná až odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně až středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině středně vysoký až vysoký.

Luisa je raná až středně raná liniová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým až nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování středně vysoký až vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování středně vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen vysoká. Obsah oleje v semeni nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji odpovídá odrůdám s vysokým obsahem kyseliny olejové v oleji. Obsah N-látek v beztukové sušině nízký až středně vysoký.

Nebraska je raný až středně raný pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování velmi vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování velmi vysoký.

Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině nízký.

Nicky je středně raná liniová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nízké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, méně až středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování středně vysoký až vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování středně vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině vysoký.

Oskar je raná až středně raná liniová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým až nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nízké, středně odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a středně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu liniových odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování středně vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování středně vysoký až vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině středně vysoký až vysoký.

PT323 je středně raný pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání před sklizní.

Odrůda středně odolná proti napadení fomovým černáním stonku brukvovitých, středně odolná proti napadení bílou hnilobou brukvovitých, středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí brukvovitých a méně odolná proti napadení komplexem kořenových chorob brukvovitých.

V rámci sortimentu hybridních odrůd výnos semene v teplé oblasti pěstování vysoký a v chladné oblasti pěstování středně vysoký až vysoký, výnos oleje v teplé oblasti pěstování velmi vysoký a v chladné oblasti pěstování vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni velmi vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní. Obsah N-látek v beztukové sušině nízký až středně vysoký.

Sója

Glycine max (L.) Merr.

Acassa je velmi raná až raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, hlavní stonek žlutohnědě ochmýřený.

Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká, barva pupku semene tmavě hnědá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná až odolná proti napadení bakteriózami, odolná proti napadení plísni sóje.

Odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního lusu vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu velmi raných odrůd velmi vysoký, výnos dusíkatých látek velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině nízký, obsah tuku v sušině středně vysoký až vysoký.

Amiata je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus polovzpřímený, hlavní stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, středně odolná proti napadení plísni sóje.

Odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního lusu středně vysoká až vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině nízký až středně vysoký.

Apulia je velmi raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny nízké, růstový habitus polovzpřímený, hlavní stonek šedě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Odolná proti napadení bakteriózami, odolná proti napadení plísni sóje.

Odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního lusu středně vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu velmi raných odrůd vysoký až velmi vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký.
Obsah dusíkatých látek v sušině nízký, obsah tuku v sušině středně vysoký až vysoký.

Atalana je velmi raná až raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny nízké až středně vysoké, růstový habitus vzpřímený, hlavní stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen středně vysoká, barva pupku semene tmavě hnědá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná až odolná proti napadení bakteriózami, odolná proti napadení plísni sóje.

Odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního luku středně vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu velmi raných odrůd velmi vysoký, výnos dusíkatých látek velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký, obsah tuku v sušině středně vysoký.

Sahara je raná fialově kvetoucí odrůda.

Rostliny středně vysoké, růstový habitus vzpřímený až polovzpřímený, hlavní stonek žlutohnědě ochmýřený. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká, barva pupku semene žlutá.

Počáteční růst rychlý.

Středně odolná proti napadení bakteriózami, středně odolná proti napadení plísni sóje.

Odolná proti poléhání před sklizní, odolná proti praskání lusků, výška nasazení prvního luku středně vysoká až vysoká.

Výnos semene v rámci sortimentu raných odrůd vysoký, výnos dusíkatých látek vysoký až velmi vysoký.

Obsah dusíkatých látek v sušině středně vysoký až vysoký, obsah tuku v sušině nízký až středně vysoký.

Brambor a jiné okopaniny

Brambor

Solanum tuberosum L.

Saxana je raná až poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy dlouze oválné, velké, odolné proti mechanickému poškození, očka velmi mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Středně odolná proti napadení virovými chorobami, středně odolná až odolná proti napadení plísni bramboru na nati a středně odolná proti napadení aktinobakteriální obecnou strupovitostí bramboru.

Výnos hlíz nízký, výnos hlíz pod závlahou středně vysoký. Výnos tržních hlíz nízký.

Vařené hlízy pevné až velmi pevné konzistence, středně vlhké, slabě moučnaté, jemné až středně hrubé struktury, nedostatky v chuti velmi malé až malé, hlízy po uvaření velmi slabě tmavnou.

Řepa cukrová

Beta vulgaris L. var. *altissima* Döll

BTS SMART 2040 N je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii, cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k háďátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký až vysoký.

Odrůda vhodná ke střední sklizni.

BTS SMART 3830 N je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k háďátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah aminodusíku vysoký až velmi vysoký.

Odrůda vhodná ke střední až rané sklizni.

BTS SMART 4680 je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku nízký. Odrůda vhodná ke střední až rané sklizni.

BTS 2700 N je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii, cercosporióze, NC typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin vysoký až velmi vysoký, obsah aminodusíku středně vysoký.

Odrůda vhodná ke střední až rané sklizni.

BTS 7535 N je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene velmi vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi vysoký, obsah aminodusíku nízký.

Odrůda vhodná ke střední sklizni.

Kvilda je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Dle testů rezistence odrůda středně odolná k hádátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k hádátku řepnému výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin nízký, obsah aminodusíku nízký.

Odrůda vhodná ke střední sklizni.

Moravia je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, N typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná až náchylná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene velmi vysoký, cukernatost středně vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene velmi vysoký, cukernatost středně vysoká až nízká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku nízký.

Odrůda vhodná ke střední sklizni.

Silvana KWS je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký až vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná ke střední až rané sklizni.

Smart Daniela KWS je diploidní Conviso Smart odrůda, odolná vůči ALS, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NC typu.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření výnos kořene středně vysoký, cukernatost vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením výnos kořene středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády středně vysoký až vysoký. Obsah popelovin velmi nízký, obsah aminodusíku velmi nízký.

Odrůda vhodná ke střední až rané sklizni.

ST Rotterdam je diploidní odrůda, tolerantní k rizománii a cercosporióze, NV typu.

Dle testů rezistence odrůda méně odolná k háďátku řepnému.

Odrůda je odolná proti vybíhání do květu, méně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí.

V systému pěstování bez fungicidního ošetření v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost středně vysoká až nízká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády středně vysoká až nízká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin středně vysoký až vysoký, obsah aminodusíku nízký až velmi nízký.

V systému pěstování s fungicidním ošetřením v rámci sortimentu odrůd s odolností k háďátku řepnému výnos kořene vysoký až velmi vysoký, cukernatost nízká, výnos polarizačního cukru vysoký, výtěžnost rafinády nízká, výnos rafinády vysoký. Obsah popelovin vysoký, obsah aminodusíku nízký.

Odrůda vhodná ke středně pozdní sklizni.

Réva

Vitis L.

- odrůdy moštové

Modrý Janek je bílá moštová středně raná odrůda.

List je střední, pětiúhelníkového tvaru. Hrozen středně velký a hustý. Bobule je středně velká široce elipsovitého tvaru. Barva slupky je žlutozelená.

Při pěstování pod běžnou fungicidní ochranou podle zásad integrované produkce odrůda odolná proti napadení plísní révy, odolná proti napadení padlím révy a středně odolná proti napadení plísní šedou. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos hroznů je nízký.

Víno velmi dobré kvality, žlutozelené barvy, květinové a bylinné vůně, květinové, kořenité a bylinné chuti, svěží, lehké, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Ruby Pinot je modrá moštová středně raná odrůda.

List je velký až velmi velký, pětiúhelníkový tvar. Hrozen je středně velký a středně hustý. Bobule je středně velká kruhovitého tvaru. Barva slupky je modročerná.

Při pěstování pod běžnou fungicidní ochranou podle zásad integrované produkce odrůda odolná proti napadení plísní révy, odolná proti napadení padlím révy a odolná proti napadení plísní šedou. Odrůda odolná sprchávání.

Výnos hroznů je středně vysoký.

Víno velmi dobré kvality, rubínové barvy, ovocná a květinová vůně, bylinné, kořenité a ovocné chuti, svěží, plné, harmonické, jemně aromatického typu.

Zeleninové druhy

Bob zahradní

Vicia faba L.

Dreifach Weisse je středně pozdní odrůda.

Růstový typ indeterminantní, výška rostliny střední s velmi malým až malým počtem lodyh bez antokyanového zbarvení. Intenzita zelené barvy listoví světlá až střední bez šedého odstínu, lístek široký, dlouhý až velmi dlouhý s maximální šířkou u středu, středně až silně zvlněný. Květ středně dlouhý až dlouhý. Střední až velký počet květů v květenství. Pavéza bez antokyanového zbarvení bez melaninové skvrny. Lusk střední až tmavé intenzity zelené barvy. Velmi malý počet lusků v plodenství. Suché semeno na podélném i příčném středovém řezu elipsovitého tvaru, barva osemení béžová bez pigmentace pupku, hmotnost suchého semene nízká.

Rosa je raná až středně pozdní odrůda.

Růstový typ indeterminantní, rostlina vysoká, počet lodyh malý až střední s antokyanovým zbarvením. Intenzita zelené barvy listoví střední bez šedého odstínu. Počet květů v květenství malý až střední, doba kvetení střední. Pavéza s antokyanovým zbarvením bez melaninové skvrny. Počet lusků v plodenství velmi malý až malý. Suché semeno na podélném i příčném středovém řezu úzce elipsovitého tvaru, barva osemení béžová bez pigmentace pupku, hmotnost suchého semene střední až vysoká.

Cibule sečka

Allium fistulosum L.

Everest je odrůda růstového typu s jedním nepravým stvolem.

Rostlina středně vysoká. Počet listů na nepravém stvolu středně velký. Olistění středně až tmavě zelené, vzpřímené, se silnou voskovou vrstvou. List středně dlouhý, s velmi slabým zahnutím špiček. Nepravý stvol středně dlouhý až dlouhý, bez antokyanového zbarvení, rozšíření do cibule není nebo velmi slabé.

Hrách

Pisum sativum L.

- cukrový

Ambrosia je raná odrůda hrachu cukrového, listového typu.

Lodyha krátká až středně dlouhá se dvěma bílými květy na nodu. Barva listoví středně až tmavě zelená. Lusk světle až středně zelený, úzký až středně široký, středně dlouhý, bez pergamenové vrstvy, se zašpičatělou distální částí. Počet základů semen v lusu střední až velký. Nezralé semeno světle až středně zelené. Barva děloh zralého semene žlutá, tvar semene válcovitý. Hmotnost semene nízká až střední.

- dřeňový

Akacia je středně pozdní až pozdní odrůda hrachu dřeňového, bezlistého typu.

Lodyha středně dlouhá se dvěma bílými květy na nodu. Barva listoví středně zelená. Lusk středně zelený, úzký, krátký, s pergamenovou vrstvou a tupou distální částí. Počet základů semen v lusu střední. Nezralé semeno světle až středně zelené. Barva děloh zralého semene žlutá, tvar semene elipsovitý. Tvar škrobového zrna jednoduchý. Hmotnost semene střední.

Antony je raná odrůda hrachu dřeňového, bezlistého typu.

Lodyha krátká až středně dlouhá se dvěma bílými květy na nodu. Barva listoví středně zelená. Lusk tmavě zelený, úzký, středně dlouhý až dlouhý, s pergamenovou vrstvou a tupou distální částí. Počet základů semen v lusu střední až velký. Nezralé semeno středně zelené. Barva děloh zralého semene zelená, tvar semene kosočtverečný. Hmotnost semene střední.

Colognola je raná odrůda hrachu dřeňového, listového typu.

Lodyha krátká až středně dlouhá se dvěma bělavě krémovými květy na nodu. Barva listoví středně zelená. Lusk středně až tmavě zelený, úzký, krátký až středně dlouhý, s pergamenovou vrstvou a zašpičatělou distální částí. Počet základů semen v lusu střední až velký. Nezralé semeno středně až tmavě zelené. Barva děloh

zralého semene žlutá, tvar semene válcovitý. Tvar škrobového zrna jednoduchý. Hmotnost semene nízká až střední.

Meduza je raná odrůda hrachu dřeňového, bezlistého typu.

Lodyha krátká se dvěma bílými květy na nodu. Barva listoví středně zelená. Lusk tmavě zelený, úzký, středně dlouhý až dlouhý, s pergamenovou vrstvou a tupou distální částí. Počet základů semen v lusku střední až velký. Nezralé semeno středně zelené. Barva děloh zralého semene zelená, tvar semene kosočtverečný. Hmotnost semene střední.

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *sabauda* L.

Ernesta je velmi raná hybridní odrůda pro rané polní pěstování.

Rostlina nízká s malým až středním průměrem a s velmi krátkým až krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, vodorovné, kruhovitého tvaru, středně až tmavě zelené, středně až silně zvlněné, silně bublinaté s malými až středně velkými bublinami a slabě ožíněné. Hlávka krátká až středně dlouhá s malým až středním průměrem, kruhovitého až široce vejčitého tvaru, světle zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá s jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem. Doba praskání hlávek po zralosti velmi raná až raná.

Lilek vejcoplodý

Solanum melongena L.

Biancona je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, listová čepel středně velká až velká, středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu středně až tmavě fialová. Plod středně dlouhý až dlouhý, základní tvar plodu opakvejčitý s prohloubeným vrcholem, prohloubení květní jizvy mělké až středně hluboké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti bílá bez pruhů a skvrn.

Clarissa je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká, listová čepel středně velká až velká, středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu středně až tmavě fialová. Plod středně dlouhý, základní tvar plodu hruškovitý se zaobleným vrcholem, prohloubení květní jizvy mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti bílá bez pruhů a skvrn.

Dominga je raná až středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, listová čepel středně velká až velká, slabě až středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu světle až středně fialová. Plod středně dlouhý, základní tvar plodu hruškovitý se zaobleným vrcholem, prohloubení květní jizvy velmi mělké až mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti tmavě až velmi tmavě fialová bez pruhů a skvrn.

Indira je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, listová čepel středně velká až velká, slabě až středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu středně až tmavě fialová. Plod krátký, základní tvar plodu kulovitý se zploštělým vrcholem, prohloubení květní jizvy mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti středně až tmavě fialová bez pruhů a skvrn.

Isabel je raná až středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká, listová čepel středně velká, středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu světle až středně fialová. Plod středně dlouhý až dlouhý, základní tvar plodu hruškovitý se zaobleným vrcholem, prohloubení květní jizvy mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti tmavě až velmi tmavě fialová bez pruhů a skvrn.

Magellano je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, listová čepel středně velká až velká, slabě až středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu světle fialová. Plod středně dlouhý, základní tvar plodu opakvejčitý se zaobleným vrcholem, prohloubení květní jizvy velmi mělké až mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti tmavě až velmi tmavě fialová bez pruhů a skvrn.

Nerona je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, listová čepel středně velká až velká, středně bublinatá. Počet květů v květenství jeden až tři, barva květu světle fialová. Plod krátký až středně dlouhý, základní tvar plodu vejčitý s prohloubeným vrcholem, prohloubení květní jizvy mělké. Základní barva plodu ve sklizňové zralosti tmavě až velmi tmavě fialová bez pruhů a skvrn.

Meloun cukrový

Cucumis melo L.

Ananas je pozdní odrůda.

Listová čepel středně velká, středně zelená. Květy oboupohlavní a samčí, mladý plod tmavě až velmi tmavě šedavě zelený, s hustými až velmi hustými malými až středně velkými tečkami. Plod v tržní zralosti krátký až středně dlouhý, na podélném řezu široce elipsovitého tvaru, bez brázd. Základní barva slupky plodu tmavě okrově žlutá se středně hustými až hustými malými světle žlutými tečkami, beze skvrn. Hlavní barva dužniny bílá. Skladovatelnost plodů krátká.

Oliwin je středně pozdní odrůda.

Listová čepel malá až středně velká, středně zelená. Květy oboupohlavní, mladý plod světle žlutavě zelený, s velmi hustými velmi malými tečkami. Plod v tržní zralosti krátký až středně dlouhý, na podélném řezu kruhovitěho tvaru, bez brázd. Základní barva slupky plodu žlutavě bílá, bez teček a skvrn. Hlavní barva dužniny zelenavě bílá. Skladovatelnost plodů střední.

Mrkev

Daucus carota L.

- jedlá

Opus je hybridní odrůda mrkve typu Berlikum.

Listy polovzpřímené, krátké až středně dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořen středně dlouhý až dlouhý, středně široký, úzce trojúhelníkovitého až úzce obdélníkovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a středně rýhovaným povrchem, středně oranžové barvy, dřevina středně až tmavě oranžová. Hlava na povrchu nezelená nebo velmi slabě zelená, uvnitř středně zelená, bez antokyanového zbarvení.

Vera je hybridní odrůda mrkve.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořen dlouhý až velmi dlouhý, středně široký, úzce trojúhelníkovitého až úzce obdélníkovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě až středně rýhovaným povrchem, středně až tmavě oranžové barvy, dřevina středně až tmavě oranžová. Hlava na povrchu nezelená nebo velmi slabě zelená, uvnitř slabě zelená, bez antokyanového zbarvení.

Okurka

Cucumis sativus L.

- nakládačka

Artemis je raná hybridní partenokarpická odrůda okurky nakládačky.

Rostlina středně až velmi vzrůstná s téměř výlučně samičími květy. Plod středně dlouhý, v tržní zralosti středně zelený, se slabým až středně silným zkrabacením povrchu, bez pruhů, bez teček, ojínění není nebo velmi slabé. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

- salátová

Andromeda je středně pozdní až pozdní hybridní nepartenokarpická odrůda okurky salátové, vhodná pro pěstování ve skleníku a foliovníku.

Rostlina velmi vzrůstná s téměř výlučně samičími květy. Plod dlouhý až velmi dlouhý, v tržní zralosti tmavě zelený, s velmi silným zkrabacením povrchu, bez pruhů, bez teček, ojínění středně silné až silné. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

Colossos je středně pozdní až pozdní hybridní partenokarpická odrůda okurky salátové, vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina středně až velmi vzrůstná s téměř výlučně samičími květy. Plod dlouhý až velmi dlouhý, v tržní zralosti středně zelený, se středně silným až silným zkrabacením povrchu, s dlouhými pruhy, bez teček, ojínění středně silné až silné. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

Cumini je raná až středně pozdní hybridní partenokarpická odrůda okurky salátové, vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina velmi málo až málo vzrůstná s téměř výlučně samičími květy. Plod velmi krátký až krátký, v tržní zralosti středně zelený, s velmi slabým zkrabacením povrchu, se středně dlouhými pruhy, bez teček, ojínění slabé až střední. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

Delikateß je pozdní nepartenokarpická odrůda okurky salátové, vhodná pro pěstování na poli.

Rostlina velmi vzrůstná s přibližně stejným poměrem samčích a samičích květů. Plod středně dlouhý, v tržní zralosti středně až tmavě zelený, se slabým až středně silným zkrabacením povrchu, s dlouhými pruhy, s tečkováním převážně v pruzích po celé délce plodu, ojínění středně silné až silné. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

Krissos je středně pozdní hybridní partenokarpická odrůda okurky salátové, vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina středně až velmi vzrůstná s téměř výlučně samičími květy. Plod dlouhý, v tržní zralosti tmavě zelený, se středně silným až silným zkrabacením povrchu, se středně dlouhými pruhy, bez teček, ojínění středně silné až silné. Základní barva pokožky ve fyziologické zralosti žlutá.

Paprika

Capsicum annuum L.

Ainoayellow je středně pozdní hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina nízká až středně vysoká, plod velmi krátký až krátký, na podélném řezu trojúhelníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka velmi mělká, apikální konec zaoblený, povrch slabě zvrásněný, slabě až středně lesklý, mezikomorové brázdy mělké, barva před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti středně až tmavě oranžová, oplodí středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0.

Aspis je raná až středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, plod středně dlouhý až dlouhý, na podélném řezu tvaru rohu, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka velmi mělká až mělká, apikální konec slabě špičatý, povrch silně zvrásněný, silně lesklý, mezikomorové brázdy středně hluboké, barva před zralostí světle zelená, ve zralosti světle až středně červená, oplodí středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin.

Dreamer je středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina vysoká, plod dlouhý až velmi dlouhý, na podélném řezu tvaru rohu, na příčném řezu elipsovitý, stopečná jamka není, apikální konec slabě špičatý, povrch silně zvrásněný, středně až silně lesklý, mezikomorové brázdy mělké, barva před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti tmavě červená, oplodí tenké až středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tomato Spotted Wilt virus patotyp 0.

Konstance je raná až středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, plod krátký až středně dlouhý, na podélném řezu trojúhelníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka mělká, apikální konec slabě špičatý, povrch slabě zvrásněný, slabě až středně lesklý, mezikomorové brázdy středně hluboké, barva před zralostí světle až středně zelená, ve zralosti světle až středně oranžová, oplodí středně tlusté až tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0 a k Pepper mild mottle virus patotyp 1-2.

Nereaorange je středně pozdní hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina středně vysoká, plod krátký, na podélném řezu trojúhelníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka velmi mělká, apikální konec zaoblený, povrch slabě zvrásněný, slabě až středně lesklý, mezikomorové brázdy mělké až středně hluboké, barva před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti středně až tmavě oranžová, oplodí tenké až středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0.

Noeliared je raná až středně pozdní hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Rostlina vysoká, plod krátký, na podélném řezu trojúhelníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka velmi mělká, apikální konec zaoblený, povrch slabě zvrásněný, středně lesklý, mezikomorové brázdy mělké, barva před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti středně červená, oplodí tenké až středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0 a k Pepper mild mottle virus patotyp 1-2.

Oranka je raná až středně pozdní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob.

Rostlina středně vysoká, plod krátký, na podélném řezu trojúhelníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka velmi mělká, apikální konec slabě vtlačený, povrch hladký nebo velmi slabě zvrásněný, středně lesklý, mezikomorové brázdy mělké až středně hluboké, barva před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti středně oranžová, oplodí tenké až středně tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0.

Osmon je pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, plod krátký, na podélném řezu čtvercovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka středně hluboká, apikální konec silně vtlačený, povrch slabě zvrásněný, středně lesklý, mezikomorové brázdy středně hluboké až hluboké, barva před zralostí tmavě zelená, ve zralosti středně až tmavě červená, oplodí středně tlusté až tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0, Pepper mild mottle virus patotyp 1-2 a Tomato Spotted Wilt virus patotyp 0.

Tova je raná až středně pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká, plod krátký, na podélném řezu obdélníkovitý, na příčném řezu hranatý, stopečná jamka středně hluboká, apikální konec slabě vtlačený, povrch slabě zvrásněný, středně lesklý, mezikomorové brázdy mělké až středně hluboké, barva před zralostí tmavě zelená, ve zralosti středně červená, oplodí tlusté, placenta neobsahuje kapsaicin. Rezistentní k Tobacco mosaic virus patotyp 0.

Petržel

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

- **kořenová**

Osat je odrůda kořenové petržele.

Rostlina nízká až středně vysoká, středně široká s řídkým olistěním a malým až středním počtem listů. Listy polovzpřímené až poléhavé, středně zelené se středně dlouhou čepelí a krátkým až středně dlouhým řapíkem. Kořen dlouhý až velmi dlouhý, široký, středně větvený.

Rajče

Solanum lycopersicum L.

- **determinantní**

- **odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek**

Bejbínek je raná hybridní determinantní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob.

Postavení listů na rostlině horizontální, list krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce není. Plod malý, kruhovitěho tvaru, žebrovaní u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Imunek je středně pozdní hybridní determinantní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob.

Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list krátký, velmi úzký až úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý až středně velký, slabě zploštělého tvaru, žebrovaní u stopky slabé až střední, počet komor dvě a tři, barva před zralostí středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Minigelbus je velmi raná hybridní determinantní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevísle, list velmi krátký až krátký, velmi úzký. Květenství převážně složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitěho tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí středně zelená se žíháním, ve zralosti žlutá.

Minipeelus je raná hybridní determinantní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob. Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list krátký, úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitěho tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Minirotus je velmi raná až raná hybridní determinantní odrůda pro pěstování na poli i ve skleníku, vhodná i do nádob.

Postavení listů na rostlině horizontální, list velmi krátký až krátký, velmi úzký až úzký. Květenství převážně složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitěho tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

- indeterminantní

Almara je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi velký, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor čtyři, pět nebo šest, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp.–rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Award je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevísle, list dlouhý až velmi dlouhý, středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod středně velký až velký, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor čtyři, pět nebo šest, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Středně rezistentní k *Meloidogyne incognita*, rezistentní k *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

BGT-21039 je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list krátký, velmi úzký až úzký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitěho tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žíháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

BGT-21280 je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list dlouhý, široký až velmi široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý až středně velký, válcovitěho tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Brownie je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Postavení listů na rostlině polopřevísle, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitěho tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí středně zelená bez žíhání, ve zralosti hnědá.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Enoch je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevíslé, list středně dlouhý, středně široký až široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žlhnáním, ve zralosti žlutá.

Rezistentní k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Eraclito je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevíslé, list středně dlouhý až dlouhý, úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce není. Plod malý až středně velký, válcovitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí středně zelená bez žlhnání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Frupo je pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod středně velký až velký, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor čtyři, pět nebo šest, barva před zralostí světle až středně zelená bez žlhnání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Garum je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevíslé, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velký, zploštělého tvaru, žebrování u stopky silné až velmi silné, počet komor více než šest, barva před zralostí středně zelená se žlhnáním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Giantball je pozdní až velmi pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevíslé až převíslé, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi velký, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor čtyři, pět nebo šest, barva před zralostí světle až středně zelená bez žlhnání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Verticillium* sp. – rasa 0 a k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1.

Goldbaby je velmi raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí světle zelená se žlhnáním, ve zralosti žlutá.

Rezistentní k *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Heruka je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevíslé, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý až středně velký, slabě zploštělého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí tmavě zelená se žlhnáním, ve zralosti hnědá.

Rezistentní k *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebs Strawberry Fields je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně

jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, srdčitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita* a k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1.

Krebsau je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, podlouhlého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebsbrota je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevislé, list krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí středně zelená se žiháním, ve zralosti hnědá.

Rezistentní k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebsele je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0.

Krebshonplum je velmi raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list krátký až středně dlouhý, úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, elipsovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle až středně zelená se žiháním, ve zralosti oranžová.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebsli je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevislé, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0,1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebslun je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list krátký až středně dlouhý, úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, podlouhlého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Středně rezistentní k *Meloidogyne incognita*, rezistentní k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebsmand je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list krátký až středně dlouhý, úzký. Květenství převážně složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená se žiháním, ve zralosti oranžová.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Krebssali je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevislé, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý, slabě zploštělého tvaru, žebrování

u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Makarov je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevislé, list středně dlouhý až dlouhý, široký až velmi široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, opakvejčitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí středně zelená bez žihání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Nassor je velmi raná až raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list krátký, velmi úzký až úzký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Orange Sunset je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevislé, list středně dlouhý, středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, hruškovitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená bez žihání, ve zralosti oranžová.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Redda je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevislé, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, podlouhlého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Rosebaby je raná až středně pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální až polopřevislé, list středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký. Květenství ve stejném poměru jednoduché i složené. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí velmi světle až světle zelená bez žihání, ve zralosti růžová.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0 a k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1.

Serbo di inverno je velmi pozdní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý, kruhovitého tvaru, žebrování u stopky slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí velmi světle až světle zelená se žiháním, ve zralosti žlutá.

Rezistentní k *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1.

Singored je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, podlouhlého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žiháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Sting je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku. Postavení listů na rostlině polovzpřímené až horizontální, list středně dlouhý až dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod středně velký, válcovitého tvaru, žebrování u stopky velmi slabé až slabé, počet komor dvě a tři, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Sukkary je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině polopřevíslé, list středně dlouhý, velmi úzký až úzký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle zelená se žíháním, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0, 1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Tarchon je raná hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, úzký až středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod velmi malý až malý, kruhovitého tvaru, žebrování u stopky není nebo velmi slabé, počet komor jen dvě, barva před zralostí světle až středně zelená bez žíhání, ve zralosti červená.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0,1 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Thesan je středně pozdní až pozdní hybridní indeterminantní odrůda vhodná pro pěstování na poli i ve skleníku.

Postavení listů na rostlině horizontální, list středně dlouhý, středně široký. Květenství převážně jednoduché. Dělivé pletivo ve stopce je. Plod malý, válcovitého tvaru, žebrování u stopky slabé až střední, počet komor dvě a tři, barva před zralostí světle zelená se žíháním, ve zralosti růžová.

Rezistentní k *Meloidogyne incognita*, *Verticillium* sp. – rasa 0, *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* – rasa 0 a k virové mozaice rajčete – kmen 0.

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. *sativus*

Victory je raná hybridní odrůda.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené barvy, s malým počtem laloků. Bulvička středně dlouhá, středně široká, středně elipsovitého až kulatého tvaru, na bázi zaoblená, červené barvy, s matně bílou dužninou a slabou tendencí k houbovatění.

Řepa salátová

Beta vulgaris L. ssp. *vulgaris* var. *conditiva* Alef.

Goldsun je víceklíčková odrůda.

Listová čepel středně dlouhá, středně široká, středně elipsovitého tvaru s polovzpřímeným postavením, světle až středně zelená s žádným nebo velmi slabým zbarvením žilek, řapík se středně širokou až širokou základnou, polovzpřímený, zelené až žluté barvy. Bulva středně dlouhá, středně široká, kruhovitého tvaru se zaoblenou až špičatou bází, žlutou pokožkou a se střední korkovitostí. Dužnina žlutooranžová, kroužky slabě až středně výrazné.

Sklon k vybíhání do květu silný.

Salát

Lactuca sativa L.

Ctibor je raná odrůda máslového salátu.

Listy polovzpřímené až vodorovné, úzce zploštělého tvaru, světle zelené barvy, bez antokyanu, tenké

až středně tlusté, slabě až středně bublinaté se středně velkými až velkými bublinami, slabě lesklé, se slabě zvlněným okrajem. Hlávka malá až středně velká, středně hustá až hustá, kruhovitěho tvaru. Doba vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne raná až středně raná. Odrůda je rezistentní k plísni salátové (*Bremia lactucae*) rase BI16.

Greencat je pozdní odrůda listového salátu typu Batavia.

Listy polovzpřímené, úzce zploštělého tvaru, středně zelené barvy, bez antokyanu, středně tlusté až tlusté, středně bublinaté se středně velkými bublinami, slabě až středně lesklé, se silně zvlněným a nepravidelně zoubkovaným okrajem. Netvoří hlávku. Doba vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne pozdní. Odrůda je rezistentní k plísni salátové (*Bremia lactucae*) rasám BI16 a BI29.

Querkus je odrůda dubolistého salátu.

Listy polovzpřímené, s širokými laloky, středně zelené bez antokyanového zbarvení, tenké, středně až silně bublinaté s malými bublinami, slabě lesklé se středně zvlněným okrajem. Netvoří hlávku. Doba vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední. Odrůda je rezistentní k plísni salátové (*Bremia lactucae*) rasám BI16 a BI29.

Redbell je odrůda listového salátu pro jarní až podzimní polní pěstování.

Listy vzpřímeně postavené, úzce elipsovitého tvaru, středně tlusté, středně až silně bublinaté, silně až velmi silně lesklé, se středně až silně zvlněným okrajem, s velmi silným antokyanovým zbarvením s purpurovým nádechem. Netvoří hlávku. Doba začátku vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne raná až středně raná. Odrůda je rezistentní k plísni salátové (*Bremia lactucae*) rasám BI16 a BI29.

Sygnalin je pozdní odrůda římského salátu.

Listy vzpřímené, středně elipsovitého tvaru, středně až tmavě zelené barvy, bez antokyanu, středně tlusté až tlusté, slabě až středně bublinaté s malými až středně velkými bublinami, středně lesklé, s velmi slabě zvlněným okrajem. Hlávka středně velká až velká, volná, úzce elipsovitého tvaru. Doba vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne pozdní.

Zikmund je raná odrůda máslového salátu.

Listy polovzpřímené až vodorovné, úzce zploštělého tvaru, světle až středně zelené barvy, bez antokyanu, tenké až středně tlusté, slabě až středně bublinaté se středně velkými až velkými bublinami, slabě lesklé, se slabě zvlněným okrajem. Hlávka malá až středně velká, středně hustá až hustá, kruhovitěho tvaru. Doba vybíhání do květu v podmínkách dlouhého dne raná.

Tykev obecná včetně cukety a patizonu

Cucurbita pepo L.

Argon je hybridní odrůda tykve typu cuketa.

Rostlina keříčkového typu, bez větvení, úponky na lodyze nejsou nebo jsou zakrnělé. List velký až velmi velký, okraj středně až hluboce členitý, tmavě zelený se stříbřitými skvrnami. Mladý plod světle zelený. Plně vyvinutý plod krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký, válcovitěho tvaru, světle až středně zelené barvy, v botanické zralosti světle až středně žlutý. Semeno středně velké, elipsovitého tvaru, s plně vyvinutou slupkou bělavé barvy.

Black Beauty je odrůda tykve typu cuketa.

Rostlina keříčkového typu, bez větvení, úponky na lodyze nejsou nebo jsou zakrnělé. List velký, okraj středně až hluboce členitý, tmavě zelený se stříbřitými skvrnami. Mladý plod tmavě zelený. Plně vyvinutý plod středně dlouhý, úzký, válcovitěho tvaru, tmavě zelené barvy, v botanické zralosti tmavě oranžový. Semeno malé až středně velké, elipsovitého až široce elipsovitého tvaru, s plně vyvinutou slupkou bělavé barvy.

Hammurabi je hybridní odrůda tykve typu cuketa.

Rostlina keříčkového typu, bez větvení, úponky na lodyze nejsou nebo jsou zakrnělé. List velký, okraj středně až hluboce členitý, tmavě zelený se stříbřitými skvrnami. Mladý plod světle až středně zelený. Plně vyvinutý plod krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký, válcovitěho tvaru, velmi světle až světle zelené barvy, v botanické zralosti středně žlutý. Semeno středně velké, elipsovitého tvaru, s plně vyvinutou slupkou bělavé barvy.

Sagin je hybridní odrůda tykve typu cuketa.

Rostlina keříčkového typu, s velmi slabým až slabým větvením, úponky na lodyze nejsou nebo jsou zakrnělé. List středně velký až velký, okraj hluboce členitý, středně zelený se stříbřitými skvrnami. Mladý plod světle až středně zelený. Plně vyvinutý plod krátký až středně dlouhý, úzký, válcovitého tvaru, světle až středně zelené barvy, v botanické zralosti světle oranžový. Semeno středně velké, elipsovitého tvaru, s plně vyvinutou slupkou bělavé barvy.

Sprint je hybridní odrůda tykve typu cuketa.

Rostlina keříčkového typu, bez větvení, úponky na lodyze nejsou nebo jsou zakrnělé. List velký, okraj středně až hluboce členitý, středně až tmavě zelený bez stříbřitých skvrn. Mladý plod středně zelený. Plně vyvinutý plod středně dlouhý, úzký, kyjovitého tvaru, středně až tmavě zelené barvy, v botanické zralosti středně oranžový. Semeno středně velké, elipsovitého tvaru, s plně vyvinutou slupkou bělavé barvy.

Tykev velkoplodá

Cucurbita maxima Duchesne

Atlantic Giant je volně opylovaná odrůda.

Hlavní stonek středně dlouhý až dlouhý. List velký, středně až tmavě zelený. Plod kruhovitý, dlouhý, s velmi mělkými brázdami. Hlavní barva pokožky plodu středně až tmavě oranžová se světle až středně oranžovými skvrnami a pruhy. Povrch plodu hladký, korkovité útvary nejsou nebo velmi řídké. Semeno středně velké až velké, úzce elipsovité, barva slupky světle hnědá.

Melonowa Žolta je volně opylovaná odrůda.

Hlavní stonek středně dlouhý. List malý až středně velký, středně zelený. Plod kruhovitý, středně dlouhý, s velmi mělkými až mělkými brázdami. Hlavní barva pokožky plodu světle až středně oranžová s krémovými skvrnami a pruhy. Povrch plodu hladký, korkovité útvary nejsou nebo velmi řídké. Semeno středně velké, středně elipsovité, barva slupky bílá.

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.

Spring Salute je raná hybridní odrůda zelí bílého.

Rostlina nízká až středně vysoká se středním až velkým průměrem a krátkým vnějším košťálem. Listy polovzpřímené až vodorovné, středně velké, kruhovitého až příčně široce elipsovitého tvaru, středně šedozele až zelené barvy, slabě až středně ojíněné se středním zvlněním okraje a středně velkými až velkými bublinami. Hlávka krátká se středním až velkým průměrem, na podélném řezu příčně úzce elipsovitá, středně hustá, dobře krytá, středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a středním až dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda odolná proti praskání hlávek.

Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *rubra* (L.) Thell.

Rubira je pozdní hybridní odrůda.

Rostlina středně vysoká až vysoká se středním až velkým průměrem a středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy polovzpřímené, velké, kruhovitého tvaru, středně až tmavě fialové barvy, silně ojíněné se slabým až středním zvlněním okraje a mírnou bublinatostí, bubliny středně velké až velké. Hlávka středně dlouhá se středním průměrem, na podélném řezu kruhovitá, hustá, dobře krytá, uvnitř fialová se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem. Odrůda odolná proti praskání hlávek.

Ovocné rody a druhy

Meruňka

Prunus armeniaca L.

Farbuz je pozdní odrůda.

Vzrůstnost stromu silná, jeho habitus vzpřímený až rozložitý. Hmotnost plodu vysoká, tvar z bočního pohledu obdélníkovitý, z čelního elipsovitý, souměrný, povrch středně hrboletý. Základní barva slupky středně oranžová, na střední ploše se vyskytuje růžová krycí barva ve formě celistvého líčka. Dužnina středně oranžová, tuhá. Pecka z bočního pohledu elipsovitá, k dužnině velmi slabě až slabě přilnavá. Jádru středně hořké. Doba začátku kvetení střední.

Lesanka je středně raná odrůda.

Vzrůstnost stromu střední, jeho habitus vzpřímený až rozložitý. Hmotnost plodu středně vysoká, tvar z bočního pohledu zploštělý, z čelního elipsovitý, slabě nesouměrný, povrch slabě hrboletý. Základní barva slupky tmavě oranžová, na střední ploše se vyskytuje purpurová krycí barva ve formě celistvého líčka. Dužnina středně oranžová, středně tuhá. Pecka z bočního pohledu kruhovitá, k dužnině nepřilnavá nebo velmi slabě. Hořkost jádra není nebo slabá. Doba začátku kvetení střední.

Název:

**Věstník Ústředního kontrolního
a zkušebního ústavu zemědělského**
Ročník XXIV, řada Národní odrůdový úřad
číslo 4, 2025
Popisy odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize
v období od 16. června 2024 do 15. června 2025

Vydavatel:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
603 00 Brno, Hroznová 63/2
Tel.: +420 543 548 111