

V Praze dne 27. října 1998

Dodatek č. 2

k „Zásadám regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998“
k druhé části , t. j. k Zásadám intervenčního nákupu pšenice potravinářské
ze sklizně roku 1998


Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství schválila na svém zasedání dne 27. října 1998 dodatek č. 2 k druhé části „Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998“, t. j. k Zásadám intervenčního nákupu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998 (k č. j. 1525/98 ze dne 11. 5. 1998), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. července 1998 (č. j. 2289/98), tohoto znění:

Znění bodu 9) se doplňuje na konci věty takto:

„....., nebo když o tom rozhodne Rada SFTR.“.

Ostatní body druhé části „Zásad regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998“, t. j. Zásad intervenčního nákupu pšenice potravinářské ze sklizně roku 1998 se nemění.

Ing. Jan Fencel
ministr zemědělství
a předseda Rady SFTR



O z n á m e n í

o odrůdách rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona č. 92/1996 Sb.
v období od 25. listopadu 1997 do 20. srpna 1998

Ve sloupcích jsou uvedeny následující údaje:

- 1 - identifikační číslo odrůdy
- 2 - udržovatel odrůdy a žadatel (žadatel jiný než udržovatel je uveden v závorce)
- 3 - zmocněný zástupce
- 4 - název odrůdy
- 5 - označení odrůdy v řízení o registraci
- 6 - datum podání žádosti o registraci
- 7 - datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci

Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

OBILNINY

JEČMEN

Hordeum vulgare L. sensu lato

- jarní

HRV3363	202		Heris	HE-6260	15.12.1994	16.04.1998
HRV3448	31	271	Madonna	LP 7133-5	31.12.1994	16.04.1998
HRV3375	77	196	Nordus	NS 90/1465	21.12.1994	16.04.1998
HRV3453	411	223	Prosa	P 6833.92	02.01.1995	16.04.1998

KUKUŘICE

Zea mays L.

ZEA3696	330	124	Audis	PAU 3B1	06.02.1995	31.03.1998
ZEA3662	357	662	Banguy	Banguy	30.01.1995	31.03.1998
ZEA3681	6	493	Evelina	3752	02.02.1995	31.03.1998
ZEA3690	6	493	Felicia	X 0852 N	02.02.1995	31.03.1998
ZEA3742	339	124	Flavius (syn.: Bosco)	Flavius	02.02.1995	31.03.1998
ZEA3685	362	145	LG 2243	LZM 243/12	02.02.1995	31.03.1998
ZEA3633	711	268	Manatan	NX-0503	17.01.1995	31.03.1998

ZEA3677	606	671	Marquis	SK 321 757	31.01.1995	31.03.1998
ZEA3688	6	493	Matilda	X 0802 X	02.02.1995	31.03.1998
ZEA3762	711	268	Notoa	CGS 3302	28.03.1995	31.03.1998
ZEA3714	69	645	Santiago	KX 3133	09.02.1995	31.03.1998
ZEA3726	427	147	Scarlet	VDH 9043	16.02.1995	31.03.1998
ZEA3752	427	147	Sesver	Sesver	06.03.1995	31.03.1998
ZEA3691	6	493	Virginia	X 0863 B	02.02.1995	31.03.1998

OVES

Avena sativa L.

AVS4010	172		Izak	SG-K 4360	02.01.1996	09.03.1998
AVS2869	172		Neklan	SG-K 92805	22.12.1993	09.03.1998

PŠENICE SETÁ

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- jarní

TTA3382	172		Aranka	SG-U 202	21.12.1994	31.03.1998
TTA3359	172		Leguan	SG-S 271	10.01.1995	31.03.1998

- ozimá

TTA3312	528	223	Contra	Contra	07.09.1994	19.06.1998
TTA3295	31	271	Elpa	LP 307.2.92	26.08.1994	19.06.1998
TTA3314	202		Nela	HE-3625	07.09.1994	19.06.1998
TTA3321	474	478	Solara	SO-1269	07.09.1994	19.06.1998
TTA3304	292	636	Tower	Cebeco 9305	01.09.1994	19.06.1998

TRITIKALE

x Triticosecale Wittm.

- ozimé

XTS2847	77	172	Modus	Modus	06.09.1993	09.03.1998
---------	----	-----	-------	-------	------------	------------

TRÁVY

JÍLEK VYTRVALÝ

Lolium perenne L.

LLP2979	497	171	Baristra	Bar LP 8186	07.01.1994	17.03.1998
LLP3054	306	160	Bravo	ZHC 3	11.01.1994	17.03.1998
LLP2930	115	32	Calibra	Si 13-86	30.12.1993	17.03.1998

LLP2929	115	32	Canasta	Canasta	30.12.1993	17.03.1998
LLP3055	306	160	Castillo	Zlp 122	11.01.1994	17.03.1998
LLP2911	147		Jantar	VV-I/89	23.12.1993	04.08.1998
LLP3084	25	464	Livree	Livree	19.01.1994	17.03.1998
LLP3119	710	147	Madera	Madera	25.01.1994	17.03.1998
LLP3056	306	160	Magyar	Zlp 166	11.01.1994	17.03.1998
LLP3120	302	147	Montagne	Mom Lp 196	25.01.1994	17.03.1998
LLP2932	115	32	Pimpernel	Pimpernel	30.12.1993	17.03.1998
LLP3085	24	171	Sirius	SLM 2.438/86	17.01.1994	17.03.1998
LLP2873	544		Talon	ČD-IV	21.12.1993	17.03.1998

KOSTŘAVA ČERVENÁ

Festuca rubra L. sensu lato

FSR3396	147		Barborka	VV-BC	22.12.1994	30.06.1998
FSR3480	292	636	Cindy	RU 499	02.01.1995	30.06.1998
FSR3481	115	32	Elanor	Elanor	02.01.1995	30.06.1998
FSR3484	115	32	Suzette	Suzette	02.01.1995	30.06.1998
FSR3485	115	32	Tamara	Tamara	02.01.1995	30.06.1998

KOSTŘAVA LUČNÍ

Festuca pratensis Huds.

FSP2981	497	171	Bartran	Bartran	07.01.1994	17.03.1998
FSP2934	115	32	Laura	Laura	30.12.1993	17.03.1998

KOSTŘAVA OVČÍ

Festuca ovina L. sensu lato

FSO3487	115	32	Pamela	Pamela	02.01.1995	30.06.1998
---------	-----	----	--------	--------	------------	------------

KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ

Festuca arundinacea Schreb.

FSA3658	306	160	Asterix	Asterix	30.01.1995	30.06.1998
FSA3488	115	32	Cochise	Cochise	02.01.1995	30.06.1998

LIPNICE LUČNÍ

Poa pratensis L.

PAP3489	115	32	Andante	Andante	02.01.1995	30.06.1998
PAP3388	497	171	Barcelóna	BAR VB 1184	21.12.1994	30.06.1998
PAP0617	497	171	Baron	Baron	02.03.1998	17.03.1998

PAP3490	115	32	Conni	Conni	02.01.1995	30.06.1998
PAP2936	292	636	Fortuna	Fortuna	30.12.1993	17.03.1998
PAP3060	306	160	Orfeo	Zpp 8104-8	11.01.1994	17.03.1998

MEDYNĚK-VLNATÝ

Holcus lanatus L.

HOL3365	158	Hola	Zuberský	15.12.1994	30.06.1998
---------	-----	------	----------	------------	------------

SRHA ASCHERSONOVA

Dactylis aschersoniana Graebn.

DTA3400	544	Tosca	ČD-SA	22.12.1994	30.06.1998
---------	-----	-------	-------	------------	------------

SVEŘEP SAMUŽNÍKOVITÝ

Bromus catharticus Vahl

BUC3401	544	Tacit	ČD-BR	22.12.1994	30.06.1998
---------	-----	-------	-------	------------	------------

LUSKOVINY

CIZRNA BERANÍ

Cicer arietinum L.

CIC3425	511	Irenka	D 1212-1	29.12.1994	31.01.1998
---------	-----	--------	----------	------------	------------

PELUŠKA

Pisum sativum L. (partim)

- ozimá

PSS3291	172	Arkta	SG-C 1	24.8.1994	24.02.1998
---------	-----	-------	--------	-----------	------------

JETELOVINY

JETEL LUČNÍ

Trifolium pratense L.

TFP2881	201	Amos	HŽ-6	30.12.1993	17.03.1998
TFP2877	147	Cyklon	DO-6	23.12.1993	17.03.1998
TFP2878	147	Dolly	DO-7	23.12.1993	17.03.1998

TOLICE DĚTELOVÁ*Medicago lupulina L.*

MDL2913	511		Ekola	TB-11	30.12.1993	17.03.1998
---------	-----	--	-------	-------	------------	------------

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY**LEN***Linum usitatissimum L.*

LNU3720	292	636	Escalina	Cebeco 9002	09.02.1995	19.03.1998
LNU3729	231		Jordán	SL-1292	16.02.1995	19.05.1998

MÁK*Papaver somniferum L.*

PPS3746	405	147	Przemko	Przemko	28.02.1995	09.03.1998
---------	-----	-----	---------	---------	------------	------------

ŘEPKA*Brassica napus L. (partim)***- jarní**

BRN3498	66	255	Lambada	Lambada	02.01.1995	17.03.1998
BRN3499	115	32	Star	Star	02.01.1995	17.03.1998

- ozimá

BRN3278	329	463	Capitol	MLCH 034	03.08.1994	16.04.1998
BRN3269	30	255	Orkan	PHP 92/1-2018	19.07.1994	16.04.1998
BRN3268	24	463	Pronto	NPZ 031	03.08.1994	16.04.1998
BRN3266	345	172	ISH 93-2 *)	ISH 93-2	18.07.1994	16.04.1998

Vysvětlivka: *) Pylově sterilní hybrid. Pro pěstování se smí uvádět do oběhu jen ve směsi s odrůdou Falcon jako opylovačem v poměru 80% ISH 93-2 + 20% Falcon, s označením "sdružená odrůda" a pod názvem "Synergy"

SLUNEČNICE*Helianthus annuus L.*

HLA3649	6	493	Apetil	XF 941	27.01.1995	31.01.1998
HLA3529	329	657	Rigasol	SC 602	05.01.1995	31.01.1998
HLA3613	711	268	Sankara	NX-10326	16.01.1995	31.01.1998

SÓJA*Glycine max (L.) Merr.*

GCM3654	6	493	Feskir	9007	27.01.1995	31.01.1998
---------	---	-----	--------	------	------------	------------

OKOPANINY

BRAMBOR

Solanum tuberosum L.

SLT3350	308	508	Fambo	BOS 70-10	08.12.1994	24.02.1998
SLT3435	519		Karmela	KE 47/21	29.12.1994	24.02.1998
SLT3605	209		Krumlov	HR 26/20	13.01.1995	09.03.1998
SLT2850	44	519	Marabel	Marabel	16.01.1995	24.02.1998
SLT3616	44	519	Marena	4120/13	16.01.1995	24.02.1998
SLT3606	549	160	Merkur	Merkur	13.01.1995	24.02.1998
SLT3749	294	496	Signal	Signal	02.03.1995	24.02.1998
SLT3638	216		Vladan	VE 74/107	17.01.1995	24.02.1998

CUKROVKA

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

BTA3700	68	498	Avalon	DEL 945	07.02.1995	09.03.1998
BTA3722	447	268	Blizzard	HM 1285	13.02.1995	09.03.1998
BTA3646	46	180	Epos	STRU 1401	19.01.1995	09.03.1998
BTA3724	316	500	Lotos	MK 902	22.02.1995	09.03.1998
BTA3734	427	717	Ludo	Ludo	16.02.1995	09.03.1998
BTA3699	68	498	Scarlett	DEL 944	07.02.1995	09.03.1998
BTA3721	447	268	Tigera	HM 1284	13.02.1995	09.03.1998

ZELNINY

BROKOLICE

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

BRY4106	719	473	Emperor	Emperor	11.01.1996	02.01.1998
BRY4618	719	473	Marathon	Marathon	10.12.1996	02.01.1998
BRY4107	719	473	Senshi	Senshi	11.01.1996	02.01.1998
BRY4858	299	193	Skiff	Skiff	20.01.1997	02.01.1998

CIBULE

Allium cepa L.

ALC4268	427	510	Cesar	VDH 90035	25.03.1996	24.02.1998
ALC4968	299	193	Duetto	Duetto	09.03.1995	24.02.1998
ALC3500	320	231	Juno	Juno	02.01.1995	24.02.1998
ALC4269	427	510	Mistral	VDH 91015	25.03.1996	24.02.1998

ALC4883	140		Pompei	Pompei	20.01.1997	24.06.1998
ALC4016	278	183	Santana	BGS 65	03.01.1996	24.02.1998
ALC4214	712	713	Sweet Amber	Sweet Amber	13.02.1996	24.02.1998
ALC4215	712	713	Sweet Perfection	Sweet Perfection	13.02.1996	24.02.1998
ALC3407	140		Vigora	A3 x ALIF	23.12.1994	24.06.1998

FAZOL

Phaseolus vulgaris L.

-keříčkový:

PHV4071	299	193	Paulista	RS 1377	10.01.1996	24.02.1998
---------	-----	-----	----------	---------	------------	------------

HRÁCH DŘEŇOVÝ

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C. O. Lehm.

PSS4072	299	193	Barle	CMG 281	10.01.1996	21.01.1998
PSS3863	239		Golem	CL-261	21.11.1995	21.01.1998
PSS3862	239		Kasal	CL-231	21.11.1995	21.01.1998
PSS3582	299	193	Masterfon	RS 25509	11.01.1995	21.01.1998
PSS4278	427	510	Maxigolt	Maxigolt	07.05.1996	21.01.1998

KAPUSTA HLÁVKOVÁ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

BRS4018	278	183	Lindessa	Bejo 1567	03.01.1996	31.01.1998
BRS4019	140		Verita	NS 0495	03.01.1996	31.01.1998

KUKUŘICE CUKROVÁ

Zea mays L. convar. saccharata Koern.

ZE43532	347	136	Legend	Legend	11.01.1995	24.02.1998
---------	-----	-----	--------	--------	------------	------------

KVĚTÁK

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. Botrytis L.

BRB3583	299	193	Forrest	RS 86356	11.01.1995	16.04.1998
BRB4049	301	268	Spacestar	SG 4070	08.01.1996	16.04.1998
BRB4051	708	231	Zarka	Erfurter 1125	08.01.1996	16.04.1998
BRB5270	708	231	Zermo	Daneza 1013	23.12.1997	16.04.1998
BRB4768	708	231	Zoran	Zoran	08.01.1997	16.04.1998

MRKEV*Daucus carota L.*

DCC4572	278	183	Alamo	Alamo	17.12.1996	02.04.1998
DCC4133	301	268	Carrera	Carrera	18.01.1996	02.04.1998
DCC4052	56	510	Kardame	1.219-89	08.01.1996	02.04.1998
DCC4075	320	231	Nantura	Nantura	10.01.1996	02.04.1998
DCC4076	112	476	Nimbus	Nimbus	10.01.1996	02.04.1998
DCC4077	112	476	Nitouche	Nitouche	10.01.1996	02.04.1998
DCC2768	427	510	Presto	Presto	16.03.1993	02.04.1998
DCC2769	427	510	Primo	Primo	16.03.1993	02.04.1998
DCC4078	112	476	St. Valéry	St. Valery Improved	10.01.1996	07.08.1998
DCC4022	140		Tinga	NS 0595	03.01.1996	02.04.1998

OKURKA*Cucumis sativus L.*

-n a k l á d a č k a:

CCS4079	112	476	Bestal	Bestal	10.01.1996	31.01.1998
CCS3864	239		Charlotte	SM 5111	21.11.1995	31.01.1998
CCS4023	140		Mira	NS 0195	03.01.1996	31.01.1998
CCS3865	239		Ornello	SM 5176	21.11.1995	31.01.1998

PAPRIKA*Capsicum annum L.*

CPA4086	256		Belona	PZ-55/95	10.01.1996	31.01.1998
CPA4081	475		Cézar	L CW	10.01.1996	31.01.1998
CPA3871	56	510	Gourmet	SMQ 31/92	23.11.1995	31.01.1998
CPA3623	475		Ikaros	OL-203R x 312R	16.01.1995	31.01.1998
CPA4136	301	268	Indra	Indra	18.01.1996	31.01.1998
CPA3624	475		Isis	OL-203R x 316R	16.01.1995	10.03.1998
CPA4082	475		Italos	OL-827	10.01.1996	31.01.1998
CPA4083	475		Julus	OL-964	10.01.1996	31.01.1998
CPA3629	475		Kaliopé	OL-229R x 322R	16.01.1995	31.01.1998
CPA3627	475		Kirke	OL-229R x 307R	16.01.1995	31.01.1998
CPA3630	475		Lucifer	OL-230R x 307R	16.01.1995	31.01.1998
CPA4084	475		Orfeus	OL-951	10.01.1996	31.01.1998
CPA3341	256		Prima	SF 101	02.12.1994	31.01.1998
CPA4085	475		Saturn	OL-955	10.01.1996	31.01.1998

PÓR*Allium porrum L.*

ALP4087	320	231	Poribleu	Poribleu	10.01.1996	24.02.1998
---------	-----	-----	----------	----------	------------	------------

RAJČE*Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*

- keříčkové (determinantní):

LYC4054	708	231	Daneza Urias	Daneza Urias	08.01.1996	21.01.1998
LYC4088	299	193	Dublet	RS 872711	10.01.1996	21.01.1998
LYC3870	239		Sultán	SM-I-0V	21.11.1995	21.01.1998

ŘEDKVIČKA*Raphanus sativus L. var. sativus*

RPS4825	765	136	Bruno	Bruno	02.01.1997	07.08.1998
RPS4802	769	768	Candela di ghiaccio	Candela di Ghiaccio	31.12.1996	07.08.1998
RPS4522	140		Lada	Lada	10.12.1996	07.08.1998
RPS4801	769	768	Mezzo lungo rosso a punta bianca 3	Mezzo lungo rosso a punta bianca	31.12.1996	07.08.1998
RPS4524	140		Ria	Ria	10.12.1996	07.08.1998
RPS4800	769	768	Rosso tondo a grande punta bianca	Rosso tondo a grande punta bianca	31.12.1996	07.08.1998
RPS4525	140		Slovana	Slava	10.12.1996	07.08.1998

ŘEPA SALÁTOVÁ*Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.*

BTO4092	320	231	Bonel	Bonel	10.01.1996	10.03.1998
BTO4093	112	476	Forono	Forono	10.01.1996	10.03.1998
BTO4094	112	476	Modana	Mona	10.01.1996	29.04.1998

SALÁT HLÁVKOVÝ*Lactuca sativa L.*

LCS 4025	140		Lento	NS 0395	03.01.1996	10.03.1998
----------	-----	--	-------	---------	------------	------------

TUŘÍN*Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.*

BRA4026	140		Dalibor	NS 0795	10.01.1996	10.03.1998
---------	-----	--	---------	---------	------------	------------

ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

BRC4056	301	268	Combinor	Combinor	08.01.1996	10.03.1998
BRC4027	278	183	Drago	Bejo 1617	03.01.1996	10.03.1998
BRC4108	718	473	Elisa	Elisa	11.01.1996	10.03.1998
BRC4252	301	268	Grenadier	Grenadier	29.02.1996	10.03.1998
BRC3553	140		Hanibal	NS 0994	09.01.1995	10.03.1998
BRC3881	320	231	Marvellon	Marvellon	30.11.1995	10.03.1998
BRC3882	320	231	Octoking	Octoking	30.11.1995	10.03.1998
BRC4057	301	268	Piton	Piton	08.01.1996	10.03.1998
BRC4028	278	183	Ramada	Bejo 1559	03.01.1996	10.03.1998
BRC4097	112	476	Scanbo	Scanbo	10.01.1996	10.03.1998
BRC4098	112	476	Scandic	Scandic	10.01.1996	10.03.1998
BRC4253	301	268	Stardon	Stardon	29.02.1996	10.03.1998

ZELÍ HLÁVKOVÉ ČERVENÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

BRC4100	112	476	Holdbar Vinter Rodan	Vinter Rodan	10.01.1996	30.04.1998
BRC4030	278	183	Huzaro	Bejo 1424	03.01.1996	10.03.1998
BRC4031	278	183	Integro	Bejo 1621	03.01.1996	10.03.1998
BRC4034	140		Kalibos	NS 0295	03.01.1996	10.03.1998
BRC4099	112	476	Langedijker Sommer Laso	Sommer Laso	10.01.1996	30.04.1998
BRC4032	278	183	Lectro	Bejo 1305	03.01.1996	10.03.1998
BRC4033	278	183	Maestro	Bejo 1563	03.01.1996	10.03.1998
BRC4254	301	268	Revue	Revue	29.12.1996	10.03.1998

ZELÍ PEKINGSKÉ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

BRP4142	57	186	Brocken	Brocken	19.01.1996	02.01.1998
BRP4036	278	183	Manoko	Bejo 1682	03.01.1996	02.01.1998
BRP2771	427	510	Merkur	Merkur	16.03.1993	02.01.1998
BRP4102	112	476	Senda	Senda	10.01.1996	02.01.1998
BRP4103	320	231	Yamiko	Yamiko	10.01.1996	02.01.1998

OVOCNÉ DRUHY A RÉVA

HRUŠEŇ

Pyrus communis L.

PYR1287	231	Armida	HL-32/1-116/117	22.01.1991	16.04.1998
PYR1286	231	Elektra	HL-31/50-23	20.12.1988	16.04.1998
PYR1284	231	Isolda	HL-17/17-33	18.01.1990	16.04.1998

JABLOŇ

Malus Mill.

MAL1349	231	Deliga	TE-18 834	18.01.1990	24.02.1998
MAL1352	231	Delvit	TE-28 750	20.12.1988	04.08.1998
MAL1351	231	Domino	TE-24 490	20.12.1988	24.02.1998
MAL1792	231	Produkta	HL-75-2-7	14.05.1991	27.02.1998
- podnože					
MAL5525	231, 601	MM 106	MM 106	18.06.1998	17.08.1998

RÉVA

Vitis L.

VIT 1723	561	705	Děvín	TČ x VCB 15/4	22.01.1991	30.06.1998
VIT1722	561	705	Diamant	JB x PK 13/22	22.01.1991	30.06.1998

OKRASNÉ DRUHY

ASTRA ČÍNSKÁ

Callistephus chinensis (L.) Nees

231	Lada	LY-JE-30	08.01.1996	29.04.1998
-----	------	----------	------------	------------

JIŘINKA PROMĚNLIVÁ

Dahlia pinnata Cav.

568	Alpy	HA-96/92	13.10.1997	29.04.1998
568	Andy	HA-98/92	13.10.1997	29.04.1998
568	Aura	HA-53/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Azurit	HA-147/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Baby	HA-44/93	13.10.1997	29.04.1998
568	Dyje	HA-126/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Heda	HA-31/94	13.10.1997	29.04.1998

568	Hydra	HA-120/89	13.10.1997	29.04.1998
568	Indigo	HA-58/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Ines	HA-95/94	13.10.1997	29.04.1998
568	Léto	HA-224/92	13.10.1997	29.04.1998
568	Luna	HA-27/92	13.10.1997	29.04.1998
568	Nella	HA-219/94	13.10.1997	29.04.1998
568	Nina	HA-221/94	13.10.1997	29.04.1998
568	Reklama	HA-123/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Sandra	HA-161/94	13.10.1997	29.04.1998
568	Sára	HA-213/94	13.10.1997	29.04.1998
568	Symfonia	HA-60/91	13.10.1997	29.04.1998
568	Tatry	HA-7/92	13.10.1997	29.04.1998
568	Vanda	HA-1/94	13.10.1997	29.04.1998

JONÁTKA AFRICKÁ (KAPSKÁ FIALKA)

Saintpaulia ionanta H. Wendl.

231	Maria	HN-B/2	05.01.1995	29.04.1998
-----	-------	--------	------------	------------

MEČÍK

Gladiolus L.

568	Salome	HA-99/87	24.11.1995	29.04.1998
568	Samba	HA-389/90	13.10.1997	29.04.1998

PELARGONIE PÁSKATÁ

Pelargonium-Zonale-Hybridae

242	Helena	VÚOZ-241/2	14.12.1995	29.04.1998
242	Marie	VÚOZ-111/1	14.12.1995	29.04.1998
242	Pavla	VÚOZ-200/2	14.12.1995	29.04.1998

SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ

Carthamus tinctorius L. (partim)

169	Vierka	BRD-10-CT	18.09.1995	29.04.1998
-----	--------	-----------	------------	------------

TULIPÁN

Tulipa L.

242, 568	Aleko	VÚOZ-HA-27/76/83	10.01.1996	29.04.1998
242, 568	Labakan	VÚOZ-HA-B 24/72	10.01.1996	29.04.1998

JMÉNA A ADRESY UDRŽOVATELŮ ODRŮD, ŽADATELŮ A ZMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

Kód:	Jméno:	Adresa:
6	Pioneer Hi-Bred International Inc.	Box 316, 6800 Pioneer Parkway, Johnston, Iowa 50131, USA
24	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	Hohenlieth, 24363 Holtsee, SRN
25	Deutsche Saatveredelung Lippstadt- Breimen GmbH	Postfach 1407, 59524 Lippstadt, SRN
30	P. H. Petersen Saatzucht	Postfach 6, 24976 Langballig, SRN
31	F. von Lochow-Petkus GmbH	Postfach 1197, 29296 Bergen 1, SRN
32	DLF TRIFOLIUM ČR, spol. s r.o.	742 47 Hladké Životice
44	Kartoffelzucht Böhlin KG	Postfach 1380, 21303 Lüneburg, SRN
46	Fr. Strube Saatzucht KG Sölingen	Postfach 1353, 38358 Schöningen, SRN
56	Saatzucht Quedlinburg GmbH	Postfach 13, 06472 Quedlinburg, SRN
57	Rijk Zwaan Samenzucht und Samenhandlung GmbH	Werler Str. 1, 59514 Welver, SRN
66	W. von Borries - Eckendorf	Postfach 1151, 33814 Leopoldshöhe 3, SRN
68	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	Postfach 1294, 29297 Bergen, SRN
69	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG	Postfach 1463, 37555 Einbeck, SRN
77	Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH	Hauptstr. 1, 38895 Bohnshausen, SRN
112	Daehnfeldt A/S	Postbox 185, 5100 Odense C, Dánsko
115	DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling	Højerupvej 31, Boelshøj, 4660 Store-Heddinge, Dánsko
124	Agrofinal spol. s r. o.	Jana Masaryka 51, 120 00 Praha 2
136	BOHEMIASEED, spol. s r. o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
140	MORAVOSEED spol. s r. o.	692 01 Mikulov - Mušlov
147	Oseva UNI, a.s.	Na Bílé 1231, 565 14 Choceln
158	OSEVA PRO spol. s r. o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
160	OSEVA AGRO Brno, spol. s r. o.	Přizová 8-10, 657 92 Brno
169	Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta zahradnická	691 44 Lednice
171	AGROGEN, spol. s r. o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
172	SELGEN a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
180	STRUBE-DIECKMANN ČR, spol. s r. o.	Ve Starém Lobečku 9, 278 01 Kralupy nad Vltavou
183	BEJO BOHEMIA, spol. s r. o.	Podůlšany 49, 533 44 Staré Ždánice
186	Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc., Služby pro zemědělství	Stochovská 4, 161 00 Praha 6
193	Ing. Milan Říha	Nuselská 42, 140 00 Praha 4
196	CEZEA - Šlechtitelská stanice, a. s.	696 14 Čejč
201	Šlechtitelská stanice Hladké Životice s.r.o.	742 47 Hladké Životice

202	Plant Select, spol. s r. o.	Hrubčice, 798 21 Bedihošť
209	Selekta Pacov, a. s.	Starodvorská 352, 395 01 Pacov
216	Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a. s.	341 83 Velhartice
223	HYBRITECH, a. s.	Havlíčková 2787, 767 41 Kroměříž
231	Sempra Praha, a. s.	U topíren 2, 170 41 Praha 7
239	SEMO s. r. o.	Smržice 414, 798 17 Smržice
242	Výzkumný ústav okrasného zahradnictví	252 43 Průhonice u Prahy
255	Ing. Marian Špunar	Dubová 17, 637 00 Brno - Jundrov
256	SEVA-FLORA spol. s r. o.	Mikulovská 366, 691 42 Valtice
268	Novartis Seeds, spol. s r. o.	Semčice 137, 294 46 Semčice
271	Selekta, a. s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
278	BEJO Zaden B.V.	P.O.Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemsko
292	Cebeco Zaden B.V.	P.O.Box 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemsko
294	Agrico Holland	P.O.Box 70, Emmeloord 8300AB, Nizozemsko
299	Royal Sluis B.V.	P.O.Box 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
300	Rossen Seeds B.V.	P.O.Box 73, 1608 ZA Wijdenes, Nizozemsko
301	Novartis Seeds B.V. Vegetables & Flowers	P.O.Box 26, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
302	Mommersteeg International B.V.	P.O.Box 1, 5250 AA Vlijmen, Nizozemsko
306	Zeldër B. V.	P.O.Box 26, 6590 AA Gennep, Nizozemsko
308	Meijer Seedpotatoes and Research B.V.	P.O.Box 1, 4416 ZG Kruiningen, Nizozemsko
313	Rijk Zwaan B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemsko
316	Kuhn & Co. International B. V.	Post Box 99, 5250 AB Vlijmen, Nizozemsko
320	Nickerson Zwaan B.V.	Postbus 19, 2990 AA Barendrecht, Nizozemsko
329	Cargill Genetique Europe snc	B.P. 21, 40305 Peyrehorade Cédex, Francie
330	PAU SEMENCES S.A.	Avenue Gaston Phoebus, 64230 Lescar, Francie
339	Rustica Prograin Génétique	Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, Francie
345	SERASEM	1012 rue Roger-Lecerf, 59840 Prêmesques, Francie
347	Clause Semences	24, boulevard Pierre Brossolette, 91221 Brétigny sur Orge Cédex, Francie
357	NICKERSON S. A.	Z.I. Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, Francie
362	LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S. A.	B. P. 115, 63203 Riom Cédex, Francie
405	I.H.A.R. Radzików	05-870 Blonie, Polsko
411	Probstdorfer Saatzucht GmbH	Parkring 12, 1011 Wien, Rakousko
427	ADVANTA B. V.	P.O.Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
447	Novartis Seeds AB	Box 302, 261 23 Landskrona, Švédsko
463	Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7

464	NOVUM SEEDS, s. r. o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
473	REPROSAM, s. r. o.	Revoluční 13, 110 00 Praha 1
474	ISTROPOL Solary a. s., Šľachtitelský a semenársky podnik	930 13 Horné Mýto č. 267, Slovenská republika
475	LIBERA	Vrbka 154, 725 26 Ostrava - Krásné Pole
476	AGROTRANS Pardubice spol. s r.o.	Rokytno 134, 533 04 Sezemice
478	Ing. Václav Staněk	Zámecká 1, 664 41 Troubsko
493	Pioneer Saaten GmbH, org. složka	Jana Opletala 1279, 690 02 Břevclav
496	Agrico Holland, organizační jednotka	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
497	Barenbrug Holland B. V.	Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout, Nizozemsko
498	Ing. Josef Vrabec	Kotorská 1578/36, 140 00 Praha 4
500	ŠAATBAU LINZ ČR, spol. s r. o.	Zdětín 31, 294 71 Benátky nad Jizerou
505	Enza Zaden B.V.	Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
508	Dobřanský	Porubská 673, 708 00 Ostrava 4
510	Ing. Karel Skřivánek	Pražská 895, 289 12 Sadská
511	Výzkumný ústav pícninářský Troubsko, spol. s r. o.	Zahradní 1, 664 41 Troubsko
519	SATIVA Keřkov a. s.	Dobrovského 2366, 580 03 Havlíčkův Brod
528	Saatzucht J. Breun GdB.R	Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, SRN
544	TAGRO Červený Dvůr spol. s r. o.	Červený Dvůr 112, 391 56 Tábor
549	N.Ö. Saatbaugenossenschaft reg. Gen.m.b.H.	Meires 25, 3841 Windigsteig, Rakousko
561	Komplexný výskumný ústav vinohradnický a vinařský	Matúškova 25, 813 11 Bratislava, Slovenská republika
568	BOHEMIA BULBS, Šlechtitelská stanice	538 03 Heřmanův Městec
601	Sempra Litoměřice a.s., ŠS Těchobuzice	411 42 Ploskovice
606	Dekalb Europa GmbH	Obere Hauptstrasse 27, 7100 Neusiedl am See, Rakousko
636	Cebeco Seeds spol. s r. o.	Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 14
645	Ing. Jaroslava Šácká	Dyjákovčičky 92, 671 23 Chvalovice
657	Ing. Peter Kováčik	Pod Fialkou 2734/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
662	RAILA IMPEX, spol. s r. o.	Na Bílé 1231, 565 01 Chocel
671	Josef Vondrys - AGRIS-LINK	Továrni 1, 370 01 České Budějovice
705	Šlechtitelská stanice vinařská	696 11 Mutěnice
708	Larsen Seeds	Sandagervej 12, Odense NO, 5240, Dánsko
710	VANDERHAVE GRASSES B. V.	P.O.Box 127, 5250 AC Vlijmen, Nizozemsko
711	Novartis Seeds SA	12 chemin de l'Hobit, 31790 Saint Sauveur, Francie
712	Crookham Company	P.O.Box 520, Caldwell ID 83606-0520, USA
713	MORAVA, Družstvo pěstitelů ovoce a zeleniny	Valtická, 691 44 Lednice na Moravě
717	Ing. Markéta Majorová	Boženy Němcové 752, 584 01 Ledec nad Sázavou

718	Sakata Seed Europe B.V.	Kruizemuntweg 27, 1435 DD Rijsenhout, Nizozemsko
719	Sakata Seed Corporation	P.O.Box 20, Aoba, 2-7-1, Nakamachidai, Tsuzuki-Ku Yokohama, Japonsko
765	Saatzucht Aschersleben	Albert-Drosihn-Strasse 9, 06449 Aschersleben, SRN
768	Bohumil Nesměrāk	Oblá 11, 634 00 Brno
769	N. SEMENCOOP soc. Coop. a r.l.	Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena (Fo), Itálie

Popisy odrůd

registrovaných podle § 11 zákona č. 92/1996 Sb. v období
od 25. listopadu 1997 do 20. srpna 1998

OBILNINY

JEČMEN JARNÍ

Hordeum vulgare L. sensu lato

Heris

Nesladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké až velké.

Zdravotní stav velmi dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním vyšší (obsahuje gen odolnosti Mlo), proti napadení rzi ječnou střední až vyšší a proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy ve všech výrobních oblastech vyšší.

Sladařská jakost nevyhovující. Výtěžnost předního zrna vysoká.

Madonna

Sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké až menší.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední (obsahuje geny odolnosti Mlo+U), proti napadení rzi ječnou střední a proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední až nižší.

Výnosy ve všech výrobních oblastech vyšší.

Sladařská jakost výběrová (bodové hodnocení 7). Výtěžnost předního zrna vysoká.

Nordus

Sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním vyšší (obsahuje gen odolnosti Mlo), proti napadení rzi ječnou střední až nižší a proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy ve všech výrobních oblastech s výjimkou kukuričné vyšší. Ve výrobní oblasti kukuričné výnos střední.

Sladařská jakost výběrová (bodové hodnocení 9). Výtěžnost předního zrna vysoká.

Prosa

Nesladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny nízké až středně vysoké. Odolnost proti poléhání nižší. Zrno středně velké až velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední až vyšší (obsahuje geny odolnosti We+U), proti napadení rzi ječnou a hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy ve všech výrobních oblastech vyšší.

Sladařská jakost nevyhovující. Výtěžnost předního zrna velmi vysoká.

KUKUŘICE

Zea mays L.

Audis

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (FAO cca 250).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazený středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj pomalý.

Výnosy celkové suché hmoty vyšší, podíl suché hmoty palic dobrý.

Určen pro pěstování na siláž v teplejší bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti.

Banguy

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (FAO cca 270).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny nízko až středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj pomalý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské a kukuričné výrobní oblasti.

Evelina

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (FAO cca 390).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn velký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Počáteční vývoj pomalý.

Výnosy zrna vyšší.

Určen pro pěstování na zrna v kukuričné výrobní oblasti.

Felicia

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (FAO cca 270).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuričné výrobní oblasti.

Flavius (syn.: Bosco)

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (FAO cca 260).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn velký, typ zrna mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuričné výrobní oblasti.

LG 2243

Třiliniiový (Tc), raný hybrid (FAO cca 240).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny nízko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vyšší, podíl suché hmoty palic dobrý.

Určen pro pěstování na siláž v teplejší bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti.

Manatan

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (FAO cca 230).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské výrobní oblasti.

Marquis

Třiliniiový (Tc), velmi raný hybrid (FAO cca 220).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vysoké, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské výrobní oblasti.

Matilda

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (FAO cca 240).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vyšší, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v teplejší bramborářské, obilnářské a řepařské výrobní oblasti.

Notoa

Třiliniiový (Tc), středně raný hybrid (FAO cca 340).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn velký; typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic vysoký; při pěstování na zrna výnosy vyšší.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuričné výrobní oblasti a na zrna v kukuričné a teplejší řepařské

výrobní oblasti.

Santiago

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (FAO cca 260).

Rostliny nízké až středně vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy zrna střední, hmotnost zrna vysoká.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské výrobní oblasti.

Scarlet

Třiliniiový (Tc), velmi raný hybrid (FAO cca 210).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny nízké až středně vysoko, počet řad zrn velký až velmi velký, typ zrna mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vysoké, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v bramborářské, obilnářské a chladnější řepařské výrobní oblasti.

Sesver

Třiliniiový (Tc), středně raný hybrid (FAO cca 280).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy celkové suché hmoty vyšší, podíl suché hmoty palic dobrý.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Virginia

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (FAO cca 280).

Rostliny střední až vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn velký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnosy celkové suché hmoty vysoké, podíl suché hmoty palic dobrý; při pěstování na zrna výnosy vyšší.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti a na zrna v kukuřičné a teplejší řepařské výrobní oblasti.

OVES SETÝ

Avena sativa L.

Izak

Bezpluchá, středně raná odrůda.

Rostliny nižší až středně vysoké, odolnost proti poléhání dobrá.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí ovesnou a hnědou skvrnitostí střední.

Výnosy vysoké.

Technologická jakost dobrá. Odrůda vhodná pro potravinářské i krmné účely. Obsah pevných pluch střední, hmotnost tisíce zrn střední. Obsah hrubých bílkovin střední až vyšší, obsah tuku vyšší, obsah vlákniny nízký.

Neklan

Pluchatá, středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní a rzí ovesnou vyšší, proti napadení hnědou skvrnitostí střední.

Výnosy vyšší.

Technologická jakost dobrá. Odrůda v horších pěstebních podmínkách dosahuje velmi dobrých výnosů „ovesné rýže“ (obilky po vyloupání). Vhodná k výrobě ovesných vloček. Pluchatost střední. Hmotnost tisíce zrn střední až vyšší. Obsah hrubých bílkovin střední.

PŠENICE SETÁ

- j a r n í

Aranka

Pekařská poloraná až polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední až vyšší. Zrno středně velké až velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý až velmi dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu střední až vyšší, proti napadení braničnatkami na listu a v klasu střední a proti napadení rzi pšeničnou střední až vyšší. Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rzi plevovou vyšší a proti napadení rzi travní střední.

Výnosy vyšší.

Pekařská jakost v kategorii A – kvalitní pšenice. Objem pečiva vysoký, hodnota SDS-testu velmi vysoká, obsah N-látek vysoký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Leguan

Pekařská poloraná až polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední až nižší. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu střední až vyšší, proti napadení braničnatkami na listu a v klasu střední a proti napadení rzi pšeničnou střední až nižší.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rzi plevovou vyšší a proti napadení rzi travní nižší.

Výnosy vyšší.

Pekařská jakost v kategorii B – chlebová pšenice. Objem pečiva nízký, hodnota SDS-testu vysoká, obsah N-látek střední, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

- o z í m á

Contra

Polopozdní odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování nižší, odolnost proti poléhání střední. Zrno menší, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzi pšeničnou střední až vyšší, proti napadení padlím travním na listu a v klasu a braničnatkami na listu a v klasu střední a odolnost proti běloklasosti rovněž střední.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rzi plevovou vyšší, proti napadení rzi travní střední až nižší.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vyšší.

Pekařská jakost v kategorii C – nevhodná. Objem pečiva nízký, hodnota SDS-testu velmi nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky nízká, číslo poklesu velmi vysoké.

Elpa

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nižší až středně vysoké, odolnost proti vyzimování vyhovující, odolnost proti poléhání střední. Zrno velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu, braničnatkami na listu a v klasu a rzi pšeničnou střední, odolnost proti běloklasosti rovněž střední.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rzi plevovou vyšší a odolnost proti napadení rzi travní nižší.

Výnosy v oblasti řepařské, obilnářské a bramborářské vyšší.

Pekařská jakost v kategorii B – chlebová pšenice. Objem pečiva nízký, hodnota SDS-testu vysoká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Nela

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování vyhovující, odolnost proti poléhání střední až vyšší. Zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu a proti braničnatkám v klasu střední, proti napadení braničnatkami na listu střední až nižší, proti běloklasosti střední a proti napadení rzi pšeničnou nižší.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rzi plevovou vyšší, proti napadení rzi travní nižší.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské a obilnářské vyšší, ve výrobní oblasti bramborářské střední.

Pekařská jakost v kategorii A – kvalitní pšenice. Objem pečiva vysoký, hodnota SDS-testu střední, obsah N-

látek střední, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Solara

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování vyhovující, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav - dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu a v klasu, braničnatkami na listu a v klasu, rží pšeničnou střední, odolnost proti běloklasosti rovněž střední.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rží plevovou vyšší a proti napadení rží travní střední.

Výnosy ve výrobní oblasti kukuřičné vyšší, v teplejší řepařské oblasti střední.

Pekařská jakost v kategorii B - chlebová pšenice. Objem pečiva střední, hodnota SDS-testu nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky nízká, číslo poklesu velmi vysoké.

Tower

Polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti vyzimování vyhovující, odolnost proti poléhání střední až nižší. Zrno menší, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav - dobrý. Odolnost proti napadení klasu padlím travním a braničnatkami střední až vyšší, proti napadení padlím travním na listu, braničnatkami na listu a rží pšeničnou střední a odolnost proti běloklasosti rovněž střední.

Dle provokačních testů má odolnost proti napadení rží plevovou vyšší, proti napadení rží travní střední.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vyšší.

Pekařská jakost v kategorii C - nevhodná. Objem pečiva střední, hodnota SDS-testu velmi nízká, obsah N-látek střední, vaznost mouky vysoká, číslo poklesu velmi vysoké.

TRITIKALE

x Triticosecale Wittm.

- o z i m é

Modus

Polopozdní zrnová odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední, odolnost proti vyzimování velmi dobrá.

Zdravotní stav velmi dobrý. Odolnost proti napadení braničnatkou plevovou, rží žitnou a plísní sněžnou střední až vyšší.

Výnosy, zejména v podmínkách s nižší půdní úrodností, vyšší.

Hmotností tisíce zrn střední, objemová hmotnost střední. Obsah hrubých bílkovin nižší, obsah lysinu střední.

TRÁVY

JÍLEK VYTRVALÝ

Lolium perenne L.

Barištra

Tetraploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rží travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitého roku.

Bravo

Diploidní, raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rží travní dobrá, proti napadení plísní

sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Calibra

Tetraploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké,

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Canasta

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Vzrůst v době metání středně vysoký.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Castillo

Tetraploidní, velmi raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Jantar

Tetraploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzi travní střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Livree

Diploidní, středně pozdní až pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Madera

Tetraploidní, pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Magyar

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Montagne

Tetraploidní, pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda picninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitého roku.

Pimpernel

Diploidní, raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda picninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitého roku.

Sirius

Tetraploidní, pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda picninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitého roku.

Talon

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí travní dobrá, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda picninářsky výnosná, s dobrou vytrvalostí do třetího užitého roku.

KOSTŘAVA ČERVENÁ

Festuca rubra L. sensu lato

Barborka

Středně raná, trsnatá trávníková odrůda.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, rzí travní a listovými skvrnitostmi dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

Cindy

Středně pozdní až pozdní, výběžkatá trávníková odrůda.

Rostliny středně vysoké, barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou a padlím trávním dobrá, proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí travní střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům střední.

Vhodný komponent do směsí pro okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

Elanor

Velmi pozdní, výběžkatá trávníková odrůda.

Rostliny nižší až středně vysoké, barva listu tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní a padlím trávním dobrá, proti napadení listovými skvrnitostmi a plísní sněžnou střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům střední až dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

Suzette

Středně pozdní až pozdní, krátce výběžkatá trávníková odrůda.

Rostliny nižší až středně vysoké, barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním a rží travní dobrá, proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním příuškům střední až dobrá. Vhodný komponent do směsí pro okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

Tamara

Středně pozdní až pozdní, trsnatá trávníková odrůda.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním a rží travní dobrá, proti napadení plísni sněžnou střední, odolnost proti listovým skvrnitostem střední až nižší. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním příuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro okrasné trávníky i pro ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

KOSTŘAVA LUČNÍ

Festuca pratensis Huds.

Bartran

Diploidní, středně raná odrůda pro luční využití.

Rostliny v době metání středně vysoké. Jarní růst středně rychlý, metání intenzivní. Odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední. Odolnost proti napadení rží travní dobrá.

Po první seči dobře obrůstá. Picninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Laura

Diploidní, středně raná odrůda pro luční využití.

Rostliny v době metání středně vysoké. Jarní růst rychlý, metání intenzivní. Odolnost proti poléhání dobrá.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísni sněžnou, listovými skvrnitostmi a rží travní střední až dobrá.

Po první seči dobře obrůstá. Picninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

KOSTŘAVA OVČÍ

Festuca ovina L. *sensu lato*

Pamela

Hexaploidní, velmi raná až raná trávníková odrůda.

Barva listu tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísni sněžnou, rží travní a padlím travním dobrá, proti napadení listovými skvrnitostmi střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním příuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro intenzivně ošetřované okrasné trávníky i parkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

KOSTŘAVA RÁKOSOVITÁ

Festuca arundinacea Schreb.

Asterix

Diploidní, středně raná trávníková odrůda.

Barva listu tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísni sněžnou, listovými skvrnitostmi a rží travní dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním příuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky, výběhy, dostihové dráhy i pro trávníkové plochy běžné a parkové zeleně. Jemnost trávníku střední. Intenzivním kosením lze dosáhnout jeho vysoké hustoty.

Cochise

Hexaploidní, středně raná trávníková odrůda.

Barva listu tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní dobrá, odolnost proti napadení plísní sněžnou střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá. Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky, výběhy, dostihové dráhy a pro trávníkové plochy běžné a parkové zeleně. Jemnost trávníku nižší. Intenzivním kosením lze dosáhnout jeho vysoké hustoty.

LIPNICE LUČNÍ

Poa pratensis L.

Andante

Středně raná trávníková odrůda.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou dobrá, proti napadení listovými skvrnitostmi a rzi travní střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně. Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Barcelona

Pozdní trávníková odrůda.

Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům střední.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní a ostatní rekreační trávníky. Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Baron

Pozdní trávníková odrůda.

Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní a ostatní rekreační trávníky. Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Conni

Pozdní trávníková odrůda.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní a ostatní rekreační trávníky. Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Fortuna

Pozdní trávníková odrůda.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou dobrá. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Orfeo

Středně raná až pozdní trávníková odrůda s dobrou zimovzdorností.

Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolná proti napadení plísní sněžnou. Dobře odolává letním přísuškům.

Vytváří pevný dm. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

MEDYNĚK VLNATÝ

Holcus lanatus L.

Hola

Středně raná travníková odrůda. s dobrou zimovzdorností.

Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním dobrá, proti napadení plísní sněžnou, rzí travní a listovými skvrnitostmi střední. Zimovzdornost dobrá. Odolnost proti letním přísuškům dobrá.

Nároky na stanoviště a výživu nízké. Vhodná pro rychlé ozelenění a revitalizaci devastovaných ploch (haldy, výsypky, rekultivace) a do extenzivně ošetřovaných travníků.

SRHA ASCHERSONOVA

Dactylis aschersoniana Graebn.

Tosca

Diploidní, středně pozdní až pozdní odrůda pro pícní využití.

Barva listu světle až středně zelená, obsah křemíku v trichomech malý. Jarní růst středně rychlý.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, rzí travní a listovými skvrnitostmi dobrá.

Pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí. Uplatní se v pastevních porostech ve středních polohách.

SVEŘEP SAMUŽNÍKOVITÝ

Bromus catharticus Vahl

Tacit

Středně pozdní až pozdní odrůda pro pícní využití.

Barva listu středně zelená. Jarní růst rychlý.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, rzí travní a listovými skvrnitostmi dobrá.

Pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí. Uplatní se v lučních porostech či krátkodobých travních porostech na orné půdě. Nový druh pro obohacení sortimentu.

LUSKOVINY

CIZRNA BERANÍ

Cicer arietinum L.

Irenka

Raná až středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, vzpřímené, silně větví. Barva květu purpurově růžová. Barva semene červenavě bílá, semeno kulaté, hmotnost tisíce semen nízká.

Výnos semene střední.

Vhodná do hlinitopísčitých až písčitých sušších půd s jižní expozicí, především kukuričné výrobní oblasti.

Výsevek 80-120 kg/ha, řádky 30-50 cm, výsev do hloubky 4-6 cm.

První česká odrůda cizrny beraní (typ *desi*), která je významnou zrnovou luskovinou subtropických a tropických oblastí, široce využívanou v tamní kuchyni pro své dietetické vlastnosti (vařená, pražená, příp. nakládaná semena, mouka).

PELUŠKA

Pisum sativum L. (partim)

- o z i m á

Arkta

Odrůda pícního typu.

Rostliny vysoké až velmi vysoké, normálního listového typu. Odolnost proti poléhání před sklizní dobrá.

Počet květů na nod dva až tři (trojkvětost je významnou vlastností odrůdy). Hmotnost tisíce semen velmi malá (105 g).

Zdravotní stav dobrý s výjimkou citlivosti na virové žloutnutí a choroby Ascochyta-komplexu.

Výnosy zelené hmoty a sena velmi vysoké, výnosy semene nízké.

Pícní zralost nastupuje při podzimním výsevu o 10-12 dní dříve. Obsah N-látek vysoký (+6% oproti jarním odrůdám).

JETELOVINY

JETEL LUČNÍ

Trifolium pratense L.

Amos

Tetraploidní, středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti padlí rdesnovému střední až vyšší.

Rychlost počátečního vývoje střední až vysoká, rychlost obrůstání po sečích střední.

Odrůda pícninářsky výnosná, zejména výnosy zelené hmoty v sušších podmínkách vyšší. Vytrvalost do druhého užitkového roku dobrá.

Cyklon

Tetraploidní, raná až středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti rakovině jetele a virózám vyšší.

Rychlost počátečního vývoje vysoká, rychlost obrůstání po sečích střední až vyšší.

Odrůda pícninářsky výnosná, výnosy suché hmoty vyšší. Vytrvalost do druhého užitkového roku velmi dobrá.

Dolly

Tetraploidní, středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý.

Rychlost počátečního vývoje střední až vysoká, rychlost obrůstání po sečích střední.

Odrůda pícninářsky výnosná, zejména výnosy zelené hmoty v první seči vyšší. Vytrvalost do druhého užitkového roku dobrá.

TOLICE DĚTELOVÁ

Medicago lupulina L.

Ekola

Raná až středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, barva květu žlutá.

Nenáročná na půdní a klimatické podmínky. Vhodná ke krmení, na zelené hnojení a jako protierozní kultura. Rozšiřuje druhový sortiment jetelelovin.

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY

LEN

Linum usitatissimum L.

Escalina

Modrokvětá odrůda přadného lnu.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení pozdní, délka vegetační doby střední.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Fusarium* ssp. i *Phoma* ex. střední.

Výnosy stonku i semene na úrovni ostatních odrůd.

Podíl vlákniny ve stoncích velmi vysoký, vlákno dobré kvality. Vysoké výnosy vlákniny ve všech lnářských oblastech.

Jordán

Modrokvětá odrůda předního lnu.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení poloraný až polopozdní, délka vegetační doby střední.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Fusarium* ssp. i *Phoma* ex. střední.

Výnosy stonku i semene na úrovni ostatních odrůd.

Podíl vlákna ve stoncích velmi vysoký, vlákno dobré kvality. Vysoké výnosy vlákna ve všech lnářských oblastech.

MÁK

Papaver somniferum L.

Przemko

Středně raná modrosemenná odrůda s minimálním obsahem morfinu v makovině.

Rostliny středního vzrůstu. Odolnost proti poléhání střední. Výskyt hleďáků nízký.

Zdravotní stav průměrný, vyšší výskyt helmintosporiázy na listech.

Výnosy semene nižší.

Nový typ odrůdy, u níž není nebezpečí zneužití pro ilegální výrobu drog.

ŘEPKA

Brassica napus L. (partim)

- j a r n í

Lambada

Polopozdní až pozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny vyššího vzrůstu, odolnost proti poléhání střední.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní s mírně zvýšeným podílem kyseliny olejové.

Star

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu, odolnost proti poléhání nižší.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

- o z í m á

Capitol

Pozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního až vyššího vzrůstu. Regenerace rostlin po zimě rychlá. Odolnost proti vyzimování dobrá, proti poléhání střední.

Dobré a vyrovnané výnosy semene ve všech oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni střední až vyšší, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Orkan

Pozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu, odolnost proti vyzimování a proti poléhání střední.

Vyrovnané výnosy semene ve všech oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni střední až vyšší, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Pronto

Středně raný hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu. Odolnost proti vyzimování dobrá. Jarní regenerace rostlin rychlá. Odolnost proti poléhání střední.

Vysoké výnosy semene ve všech oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

ISH 93-2

Pylově sterilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Pro pěstování se smí uvádět do oběhu jen ve směsi s odrůdou Falcon jako opylovačem, v poměru 80 % ISH 93-2 + 20 % Falcon, s označením „sdružená odrůda“ a pod názvem „Synergy“.

Rostliny středního vzrůstu. Odolnost proti vyzimování a proti poléhání střední.

Vysoké výnosy semene v teplejší oblasti pěstování.

Obsah oleje v semeni vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

SLUNEČNICE

Helianthus annuus L.

Apetil

Dvouliniový (Sc) středně raný hybrid.

Rostliny vysoké, úbor středně velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Hmotnost tisíce nažek vysoká (přesahuje 100 g), slupkatost střední. Olejnatost nízká (do 30%).

Výnos nažek ve srovnání s olejnatými hybridy nižší.

Vhodný pouze do kukuřičné výrobní oblasti, citlivý na sucho. Nažky určeny pro zlepšení pekařských výrobků, k přímému konzumu a jako krmivo pro chované ptactvo.

Rigasol

Dvouliniový (Sc) raný hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, úbor středně velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Jazykové květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky středně velké až velké, podlouhle vejčitého tvaru, černé barvy s šedivým okrajovým a bočním proužkováním. Olejnatost střední až vyšší.

Zdravotní stav dobrý.

Výnos nažek vysoký a stabilní.

Vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice.

Sankara

Dvouliniový (Sc) raný hybrid.

Rostliny vysoké, úbor středně velký, v plné zralosti polopřevíslý. Jazykové květy žluté. Nažky malé až středně velké, podlouhle vejčitého tvaru černé barvy s šedivým okrajovým a bočním proužkováním. Olejnatost vyšší.

Zdravotní stav dobrý. Výskyt *Sclerotinia sclerotiorum* nízký. Odolnost proti napadení *Botrytis cinerea* střední.

Výnos nažek vysoký a stabilní.

Vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice.

SÓJA

Glycine max (L.) Merr.

Feskir

Raná indeterminantní odrůda.

Rostliny středně vysoké, první lusk nasazen výše. Odolnost proti poléhání a proti pukání lusků dobrá.

Velikost zrna střední, barva zrna žlutá. Obsah tuku v sušině standardní.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti bakteriózám střední.

Výnos semene střední, stabilní.

Obsah hrubých bílkovin střední až vyšší.

OKOPANINY

BRAMBOR

Solanum tuberosum L.

Fambo

Raná až velmi raná odrůda pro zpracování na hranolky.

Počáteční růst natě a nárůst hlíz rychlé, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy dlouze oválné, větší, očka mělká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti rakovině brambor rasy 1 rezistentní, proti virovým chorobám středně odolná, proti plísni bramborové méně odolná, odolnost proti obecné strupovitosti vyšší.

Výnosy hlíz nižší.

Významná především jako surovina k výrobě hranolků v letním až podzimním období.

Vhodná pro pěstování v teplejší i chladnější pěstelské oblasti.

Karmela

Velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ BC-C.

Počáteční růst natě velmi rychlý, nárůst hlíz rychlý, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy krátce oválné, větší, očka mělká až středně hluboká, slupka žlutá, dužnina tmavě žlutá. Vařené hlízy při předčasných sklizních pevné, příjemně vlhké, po dozrání moučnaté.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti rakovině brambor rasy 1 rezistentní, proti virovým chorobám dosti odolná, proti plísni bramborové a obecné strupovitosti středně odolná.

Výnosy hlíz v pozdějších termínech předčasných sklizní a po dozrání natě vyšší.

Vhodná pro pěstování zejména v ranobramborářské pěstební oblasti.

Krumlov

Polopozdní až pozdní odrůda pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě a nárůst hlíz středně rychlé, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy krátce oválné, větší, očka mělká, slupka červená, středně hladká až hrubá, dužnina krémová.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k rakovině brambor rasy 1 silně náchylná, proti virovým chorobám a plísni bramborové dosti odolná, proti obecné strupovitosti méně odolná.

Výnosy hlíz vyšší, škrobnatost vysoká, výnos škrobu vysoký.

Marabel

Raná odrůda pro přímý konzum a tržní úpravu loupáním, varný typ BA-B.

Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz velmi rychlý, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy oválné, větší, očka mělká, slupka žlutá, dužnina tmavě žlutá. Vařené hlízy dosti pevné, netmavou.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k rakovině brambor rasy 1 silně náchylná, proti virovým chorobám dosti odolná, proti plísni bramborové středně až méně odolná, středně odolná proti obecné strupovitosti.

Výnosy hlíz vyšší.

Marena

Polopozdní až pozdní odrůda pro přímý konzum a tržní úpravu loupáním, varný typ B.

Počáteční růst natě středně rychlý, nárůst hlíz pomalý, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy krátce oválné, větší, očka mělká, slupka a dužnina žluté. Vařené hlízy dosti pevné, netmavou.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k rakovině brambor rasy 1 silně náchylná, proti virovým chorobám a plísni bramborové dosti odolná, proti obecné strupovitosti středně odolná.

Výnosy hlíz vysoké.

Merkur

Pozdní odrůda pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz pomalý, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka středně hluboká, slupka žlutá, dužnina bílá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k rakovině brambor rasy 1 silně náchylná, proti virovým chorobám a plísni bramborové dosti odolná, proti obecné strupovitosti méně odolná.

Výnosy hlíz vyšší, škrobnatost vyšší až vysoká, výnos škrobu vysoký.

Signal

Polopozdní až pozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ BC.

Počáteční růst natě a nárůst hlíz rychlé, počet hlíz pod trsem střední až nižší. Hlízy krátce oválné, větší, očka středně hluboká, slupka žlutá, hladká až středně hrubá, dužnina žlutá. Struktura vařených hlíz hrubší, dosti tmavou.

Proti napadení hádětkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k rakovině brambor rasy 1 slabě náchylná (s polní rezistencí), proti virovým chorobám a plísní bramborové dosti odolná, proti obecné strupovitosti méně odolná.

Výnosy hlíz vysoké.

Vladan

Poloraná odrůda pro zpracování na smažené výrobky a pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka mělká až středně hluboká, slupka a dužnina žluté.

K napadení hádětkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti rakovině brambor rasy 1 rezistentní, proti Y-viru dosti odolná, proti plísní bramborové a obecné strupovitosti středně odolná.

Výnosy hlíz nižší, škrobnatost vyšší, výnos škrobu vyšší.

Velmi dobrá kvalita lupínků.

CUKROVKA

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Avalon

Triploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen klínový, rýha rovná a mělká. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední až nízká, tolerance k cercosporě střední.

Výnos kořene vysoký, cukernatost střední, výnos rafinády vysoký, výtěžnost rafinády střední. Obsah melasotvorných látek střední až nízký.

Blizzard

Diploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen klínový až kuželovitý, rýha rovná a mělká. Sklizeň velmi raná.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední až vysoká, tolerance k cercosporě střední až vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost střední až vysoká, výnos a výtěžnost rafinády střední až vysoké. Obsah melasotvorných látek střední.

Epos

Triploidní odrůda normálního až výnosového typu.

Kořen kuželovitý, rýha rovná, mělká až rozptýlená. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední až vysoká, tolerance k cercosporě střední až vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost střední, výnos a výtěžnost rafinády střední až vysoké. Obsah melasotvorných látek nízký.

Lotos

Triploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen kuželovitý, rýha rovná, střední až mělká. Sklizeň ranější až středně raná.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední až vysoká, tolerance k cercosporě střední až vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost střední až vysoká, výnos rafinády vysoký, výtěžnost rafinády střední až vysoká. Obsah melasotvorných látek nízký až velmi nízký.

Ludo

Triploidní odrůda normálního až výnosového typu.

Kořen kuželovitý zúžený, rýha spirálová, středně hluboká.

Odolnost proti vybíhání a padlí středně vysoká až vysoká, tolerance k cercosporě středně vysoká až vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost střední, výnos rafinády střední až vysoký, výtěžnost rafinády střední. Obsah melasotvorných látek střední až nízký.

Scarlett

Triploidní odrůda normálního až výnosového typu.

Kořen kuželovitý, rýha rovná, středně hluboká až hluboká. Sklizeň středně raná až středně pozdní.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední až vysoká, tolerance k cercosporě střední až vysoká.

Výnos kořene vysoký, cukernatost nízká až střední, výnos rafinády vysoký, výtěžnost rafinády nízká až střední. Obsah melasotvorných látek nízký až střední.

Tigera

Diploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen kuželovitý, rýha rovná, středně hluboká až hluboká.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím střední, tolerance k cercosporě střední.

Výnos kořene střední až vysoký, cukernatost střední až vyšší, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády střední až vysoká. Obsah melasotvorných látek nízký až velmi nízký.

ZELENINY

BROKOLICE

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Emperor

Ráný hybrid.

Rostliny středně vysoké, převážně s jedním a jen ojediněle s více stonky. Listy středně šedo zelené, středně až silně ojíněné. Růžice velká, středně pevná, středně zelená, příčně eliptického až široce eliptického tvaru s krátkým větvením na bázi, se střední hrboovitostí a střední až hrubou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je středně vysoký.

Odolnost proti vybíhání do květu střední.

Marathon

Polopozdní hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, s jedním a jen ojediněle s více stonky. Listy středně až tmavě šedo zelené, silně ojíněné. Růžice středně velká, pevná, středně šedo zelená až modrozelená se slabým náznakem antokyanového zbarvení, příčně široce eliptického tvaru s krátkým až středně dlouhým větvením, se střední hrboovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je vysoký.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

Senshi

Polopozdní hybrid.

Rostliny středně vysoké, převážně s jedním stonkem a jen ojediněle s více stonky. Listy tmavě modrozelené, silně ojíněné. Růžice středně velká, středně pevná až pevná, středně modrozelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým až středním větvením na bázi, se střední hrboovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Jen slabě tvoří sekundární růžice.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká, dlouho si ponechává dobrou kvalitu růžice.

Skiff

Pozdní hybrid.

Rostliny středně vysoké, převážně s jedním stonkem. Listy středně až tmavě šedo zelené s modrozeleným nádechem. Růžice malá až středně velká, pevná, středně šedo zelená až modrozelená příčně široce eliptického až eliptického tvaru s jemnou hrboovitostí a střední zrnitostí povrchu s krátkým až středním větvením na bázi. Spontánně netvoří sekundární růžice.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

CIBULE

Allium cepa L.

Cesar

Polopozdní hybrid dlouhodobního typu určený pro jarní výsevy.

Listy polovzpřímené, tmavě zelené, středně ojíněné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých suknic hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost suknic střední, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny nízký až střední, skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu průměrná - doporučená doba vyskladnění prosinec.

Odolnost proti napadení plísni cibulovou střední až vysoká.

Duetto

Poloraný hybrid dlouhodobního typu určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené, tmavozelené, středně ojíněné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých suknic hnědá s bronzovým odstínem, přiléhavost suknic silná, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny nízký, skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu omezená - doporučená doba vyskladnění přibližně dva měsíce po sklizni.

Odolnost proti napadení plísni cibulovou střední.

Juno

Raný až poloraný hybrid krátkodenního typu určený pro letní výsevy a přezimování.

Listy polovzpřímené, tmavozelené, středně ojínné. Cibule střední až velká, široce vejčitého, barva horních suchých sukní hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní střední, dužnina bílá, středně pevná.

Přezimování rostlin velmi dobré.

Mistral

Polopozdní až pozdní hybrid dlouhodenního typu určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny nízký až střední, skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu dobrá - doporučená doba vyskladnění únor.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou střední až vysoká.

Pompei

Raná odrůda dlouhodenního typu určená pro jarní výsevy.

Listy polovzpřímené, světle zelené, středně ojínné. Cibule malá, plošekulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní bílá, suknice velmi tenké, slabě přiléhající, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny nízký. Odrůda neskladovatelná, vhodná především pro průmyslové zpracování sterilováním. Pro konzervování celých cibulí se doporučuje zahuštěním výsevního sponu redukovat velikost cibulí.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou střední.

Santana

Poloraný hybrid dlouhodenního typu určený pro jarní výsevy.

Listy vzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, barva horních suchých sukní hnědá s bronzovým nádechem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny střední, skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu dobrá - doporučená doba vyskladnění únor.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou vysoká.

Sweet Amber

Pozdní dlouhodenní hybrid sladkého španělského typu určený pro jarní výsevy.

Listy polovzpřímené, světle zelené, slabě ojínné. Cibule velká, široce eliptického tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní střední, dužnina bílá, slabě až středně pevná.

Obsah sušiny nízký, odrůda není vhodná na skladování - doporučená doba vyskladnění do dvou měsíců po sklizni.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou nízká, odrůda vyžaduje intenzivní preventivní chemickou ochranu.

V klimatických podmínkách České republiky odrůda vysoce náchylná na vybíhání. V závislosti na průběhu počasí a lokalitě se podíl vyběhlých cibulí v průběhu dvouletého zkušebního cyklu pohyboval od 2 do 37 %.

Sweet Perfection

Pozdní dlouhodenní hybrid sladkého španělského typu určený pro jarní výsevy.

Listy polovzpřímené, světle zelené, slabě ojínné. Cibule velká, široce eliptického tvaru, základní barva horních suchých sukní žlutá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní slabá až střední, dužnina bílá, slabě až středně pevná.

Obsah sušiny nízký, odrůda není vhodná na skladování - doporučená doba vyskladnění do dvou měsíců po sklizni.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou nízká až střední, odrůda vyžaduje intenzivní preventivní chemickou ochranu.

V klimatických podmínkách České republiky odrůda náchylná na vybíhání. V závislosti na průběhu počasí a lokalitě se podíl vyběhlých cibulí v průběhu dvouletého zkušebního cyklu pohyboval od 2 do 28 %.

Vigora

Poloraný, hybrid dlouhodobního typu určený pro jarní výsevy.

Listy polovzpřímené, tmavozelené, středně až silně ojínené. Cibule středně velká, široce vejčitého tvaru, barva horních suchých suknic hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost suknic střední, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny střední, skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu dobrá - doporučená doba vyskladnění únor.

Odolnost proti napadení plísní cibulovou dobrá.

FAZOL

Phaseolus vulgaris L.

- keříčkový:

Paulista

Poloraná odrůda.

Rostliny vzpřímené, středně vysoké. Lusk v technologické zralosti středně až tmavě zelený, mírně zakřivený, středně dlouhý, úzký, na průřezu kruhovitý, na povrchu hladký, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, hmotnost tisíce semen nízká.

Odrůda vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu nebo konzervování lusků v zelené (technologické) zralosti.

HRÁCH DŘEŇOVÝ

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C. O. Lehm.

Barle

Polopozdní odrůda s redukovanou listovou plochou (semi-leafless typ).

Lodyha krátká, fasciovaná. Lusk rovný, středně dlouhý, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, velké (62% zrn v kategorii 9-10 mm). Hmotnost tisíce semen střední.

Golem

Velmi raná odrůda.

Lodyha krátká až středně dlouhá. Lusk rovný až slabě prohnutý, krátký až středně dlouhý, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, velmi velké (51% zrn v kategorii nad 10 mm). Hmotnost tisíce semen střední.

Kasal

Polopozdní odrůda.

Lodyha krátká až střední. Lusk slabě až středně prohnutý, krátký, úzký, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, malé až středně velké (48% zrn v kategorii 8-9 mm, 31% zrn v kategorii 9-10 mm). Hmotnost tisíce semen velmi nízká až nízká.

Masterfon

Velmi raná až raná odrůda.

Lodyha velmi krátká až krátká. Lusk rovný, krátký až středně dlouhý, středně široký, ostře ukončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, středně velké až velké (35% zrn v kategorii 8-9 mm, 41% zrn v kategorii 9-10 mm). Hmotnost tisíce semen nízká až střední.

Maxigolt.

Polopozdní odrůda.

Lodyha středně dlouhá. Lusk rovný až slabě prohnutý, středně dlouhý až dlouhý, široký, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, velmi velké (76% zrn v kategorii nad 10 mm). Hmotnost tisíce semen vysoká.

Odrůda dozrává postupně, nedoporučuje se proto jednorázová mechanizovaná sklizeň. Vhodná především pro drobné pěstitele a zásobení trhu čerstvými lusky.

KAPUSTA HLÁVKOVÁ

Brassica oleracea L. *convar. capitata* (L.) Alef. *var. sabauda* L.

Lindessa

Pozdní hybrid pro přímou spotřebu a skladování.

Rostliny středně vysoké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy slabě až středně zkadeřené, středně až silně ojínené, šedozelené se slabě zvlněným okrajem. Hlávky pevné, husté, středně velké, ploše kulovité až ploché, zelené s šedozeleným nádechem, uvnitř se žlutavým po obvodě zelenavým zbarvením a dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení rostlin vysoká.

Verita

Polopozdní hybrid pro přímou spotřebu, krátkodobé skladování a průmyslové zpracování.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středním až krátkým vnějším košťálem. Listy středně zkadeřené, slabě až středně ojínené, světle až středně zelené se středně zvlněným okrajem. Hlávky pevné, středně husté až husté, středně velké až velké, převážně kulovité, světle zelené, uvnitř se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení rostlin vysoká.

KUKUŘICE CUKROVÁ

Zea mays L. *convar. saccharata* Koern.

Legend

Velmi raný až raný dvouliniový hybrid.

Rostliny středně vysoké, výška nasazení horní palice střední. Délka palice střední (cca 17 cm), průměr střední až velký (cca 5 cm), tvar kónický, počet řad zrn střední (cca 16). Typ zrna cukrový, barva korunky zrna žlutobílá.

Výtěžnost zrna v technologické zralosti 61,2 %.

KVĚTÁK

Brassica oleracea L. *convar. botrytis* (L.) Alef. *var. botrytis* L.

Forrest

Pozdní hybrid pro podzimní sklizeň, vhodný k přímé spotřebě a mrazírenskému i průmyslovému zpracování.

Rostliny vysoké. Listy velké, vzpřímené, eliptické, středně zelené, středně ojínené se střední bublinatostí. Růžice dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bělavé barvy s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá, jemně až středně zrnitá.

Odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí.

Spacestar

Poloraný hybrid pro letní a podzimní sklizeň, vhodný k přímé spotřebě a mrazírenskému i průmyslovému zpracování.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, široce eliptické, středně až tmavě šedozelené a středně ojínené se slabou bublinatostí. Růžice dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná a těžká, bělavé barvy, středně až hrubě hrbolovitá a středně zrnitá.

Odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí.

Zarka

Raný hybrid pro jarní a letní sklizeň k přímé spotřebě.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, polovzpřímené, eliptické až široce eliptické, středně až tmavě šedozelené s modrozeleným nádechem, středním až silným ojíněním a slabou až střední bublinatostí. Dlouhý řapík. Růžice částečně krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavé barvy s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Odolný proti fialovění, prorůstání, avšak někdy slabě až středně mechovatí, zřídka se vyskytují růžice i žlutozelené barvy.

Zermo

Poloraný hybrid pro jarní a letní, případně i časné podzimní sklizně, vhodný k přímé spotřebě i průmyslovému zpracování.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, polovzpřímené, eliptické, šedozelené barvy se středním až silným ožiněním a slabou až střední bublinatostí. Růžice částečně krytá, středně velká, příčně eliptická středně klenutá, pevná, bělavé barvy, jemně až středně hrbolovitá a jemně zrnitá.

Odolný proti fialovění, prorůstání, mechovatění a žloutnutí.

Zoran

Raný až poloraný hybrid pro jarní a letní sklizně k přímé spotřebě.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy malé až středně velké, polovzpřímené, eliptické až široce eliptické, světle šedozelené barvy se středním ožiněním a slabou bublinatostí. Růžice částečně krytá, malá až středně velká, příčně eliptická, slabě klenutá, pevná, bělavé barvy, středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Odolný proti fialovění, prorůstání, mechovatění a žloutnutí.

MRKEV

Daucus carota L.

Alamo

Raný až poloraný hybrid typu Nantes pro letní až podzimní sklizně, vhodný ke svazkování i jako letní mytá mrkev bez natě.

Listy středně dlouhé, polovzpřímené, středně zelené a středně členité. Kořen dlouhý, úzký až středně široký, dlouze válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Barva pokožky středně červená, v korové části středně až tmavě červená, barva dřevě (srdéčka) stejná jako korové části. Hlava na povrchu i uvnitř slabě zelená.

Obsah sušiny i karotenu nízký.

Carrera

Pozdní hybrid typu Flakker pro podzimní sklizně vhodný především pro průmyslové zpracování a dlouhodobé skladování.

Listy dlouhé, středně až tmavě zelené a středně členité. Kořen dlouhý, převážně válcovitého tvaru s plochou hlavou, tupě špičatým zakončením a hladkým nebo jen slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení je středně oranžové, intenzita barvy dřevě je stejná jako korové části. Hlava nezelená na povrchu ani uvnitř.

Obsah karotenu a sušiny střední až vysoký.

Kardame

Pozdní až velmi pozdní hybrid typu Berlikum, vhodný pro přímou spotřebu, průmyslové zpracování i dlouhodobé skladování.

Listy dlouhé, široce nasazené na kořenu, středně až tmavě zelené a středně až jemně členité. Kořen dlouhý, kuželovitého tvaru s plochou hlavou, převážně tupě špičatým zakončením a hladkým až slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně až tmavě oranžové, dřevě je zpravidla tmavší než korová část. Hlava ojediněle nepatrně zelená na povrchu i uvnitř.

Obsah sušiny střední až vysoký, karotenu střední.

Nantura

Raný hybrid typu Nantes, vhodný pro přímou spotřebu, svazkování a z pozdních výsevů i ke skladování.

Listy středně dlouhé, středně zelené a jemně členité. Kořen středně dlouhý, válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou s převážně tupým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně oranžové, dřevě má stejnou intenzitu zbarvení jako korová část. Hlava nezelená na povrchu ani uvnitř.

Nimbus

Poloraný hybrid typu Nantes, vhodný z letních sklizní pro přímou spotřebu, z podzimních sklizní i ke skladování.

Listy středně dlouhé, mladší světle zelené, starší středně zelené a jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý až dlouhý, válcovitého tvaru se zakulacenou až kónickou hlavou, převážně tupým

zakončením a slabě až středně rýhovaným povrchem. Pokožka tmavě oranžová, korová část a dřeň středně až tmavě oranžové, dřeň má stejnou intenzitu zbarvení jako korová část. Hlava na povrchu nezelená a uvnitř zelená jen velmi slabě.

Obsah sušiny střední, karotenu nízký.

Nitouche

Poloraný hybrid typu Nantes pro přímou spotřebu v létě i na podzim.

Listy středně dlouhé, středně zelené, jemně členité a úzce nasazené na kořeni. Kořen středně dlouhý, válcovitého tvaru se zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky středně oranžové, korové části i dužniny středně až tmavě oranžové, dřeň stejná nebo i tmavší. Hlava ojediněle velmi slabě zelená na povrchu, ale ne uvnitř.

Obsah sušiny střední až vysoký, karotenu nízký.

Presto

Poloraný hybrid typu Nantes pro přímou spotřebu z letních sklizní a z nejranějších výsevů i pro svazkování.

Listy středně dlouhé, středně zelené a jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý, válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, převážně tupým zakončením a hladkým nebo jen velmi slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně oranžové, dřeň světlejší než korová část.

Hlava ojediněle velmi slabě zelená na povrchu a slabě až středně zelená uvnitř. Dobrá odolnost proti lámání a praskání kořenů.

Obsah sušiny i karotenu nízký.

Primo

Poloraný hybrid typu Nantes pro přímou spotřebu z letních sklizní a z nejranějších výsevů i pro svazkování.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně dlouhé, středně až tmavě zelené a jemně členité. Kořen středně dlouhý, válcovitého tvaru se zakulacenou hlavou, s tupě špičatým zakončením a hladkým nebo velmi slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně oranžové, intenzita barvy dřeně stejná jako korové části. Hlava ojediněle slabě zelená na povrchu a slabě až středně uvnitř.

Obsah sušiny střední, karotenu nízký.

St. Valéry

Pozdní odrůda typu James Scarlet, určená zejména na průmyslové zpracování (fezy), vhodná i k přímé spotřebě.

Listy dlouhé, středně až široce nasazené na kořenu, středně až tmavě zelené a jemně členité. Kořen dlouhý až velmi dlouhý, kuželovitého tvaru s plochou až slabě zakulacenou hlavou, špičatým zakončením a slabě až středně rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně až tmavě oranžové, intenzita barvy dřeně stejná jako korové části. Hlava nezelená na povrchu ani uvnitř.

Obsah sušiny i karotenu vysoký.

Tinga

Pozdní odrůda typu Flakker, vhodná pro přímou spotřebu, průmyslové zpracování i dlouhodobé skladování.

Listy dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořen středně dlouhý až dlouhý, převážně trojúhelníkového tvaru s plochou až mírně zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a hladkým povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně až tmavě oranžové, dřeň tmavší.

Hlava jen ojediněle nepatrně zelená na povrchu, netrpí však vnitřním zelenáním.

Obsah sušiny i karotenu střední.

OKURKA

Cucumis sativus L.

- n a k l á d a č k a:

Bestal

Pozdní partenokarpický hybrid.

Rostliny středně vzrůstné. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu velmi malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísní okurkovou velmi nízká.

Charlotte

Raný až poloraný hybrid.

Rostliny slabě vzrůstné. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísní okurkovou vysoká.

Mira

Pozdní hybrid.

Rostliny středně až silně vzrůstné. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu velmi malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísní okurkovou velmi vysoká.

Ornello

Poloraný hybrid.

Rostliny středně vzrůstné. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísní okurkovou vysoká.

PAPRIKA

Capiscum annuum L.

Belona

Poloraná odrůda vhodná pro polní pěstování.

Plod středně lesklý, hladký, středně dlouhý až dlouhý, průměr plodu střední, převládající tvar na podélném řezu trojúhelníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí nazelenalé bílá, ve zralosti středně červená. Chut' sladká.

Cézar

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách a v nejteplejších podmínkách kukuřičné oblasti i na poli.

Plod středně lesklý, hladký, krátký, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí tmavě zelená, ve zralosti tmavě červená. Chut' sladká.

Gourmet

Poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod středně lesklý, hladký, krátký až středně dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká až středně hluboká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí středně zelená, ve zralosti oranžová. Chut' sladká.

Ikaros

Poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod středně lesklý, hladký, středně dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu lichoběžníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí středně zelená, ve zralosti červená. Chut' sladká.

Odrůda rezistentní proti napadení virem tabákové mozaiky patotypu P₀.

Indra

Polopozdní hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, hladký, středně dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu obdélníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí tmavě zelená, ve zralosti červená. Chut' sladká.

Isis

Poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, slabě zvrásněný, dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu lichoběžníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí středně až

tmavě zelená, ve zralosti červená. Chut' sladká.

Odrůda rezistentní proti napadení virem tabákové mozaiky patotypu P₀.

Italos

Raná odrůda vhodná pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, na povrchu slabě drsný, v bazální části zvrásněný, středně dlouhý, průměr plodu malý, převládající tvar na podélném řezu tvar rohu, bez stopečné jamky, oplodí slabé. Barva plodu před zralostí středně až světle zelená, ve zralosti oranžová. Chut' sladká.

Julus

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, silně zvrásněný, na bazální části středně až silně zvlněný, dlouhý až velmi dlouhý, průměr plodu malý až střední, převládající tvar na podélném řezu úzce trojúhelníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí slabé. Barva plodu před zralostí světle zelená, ve zralosti tmavě červená. Chut' sladká. Odrůda rezistentní proti napadení virem tabákové mozaiky patotypu P₀.

Kaliopé

Poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod středně lesklý, slabě zvrásněný, středně dlouhý, průměr plodu malý až střední, převládající tvar na podélném řezu trojúhelníkovitý, stopečná jamka středně hluboká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí světle zelená, ve zralosti tmavě červená. Chut' sladká.

Odrůda rezistentní proti napadení virem tabákové mozaiky patotypu P₀.

Kirke

Raný až poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod středně lesklý, slabě zvrásněný, středně dlouhý až dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu lichoběžníkovitý, stopečná jamka středně hluboká, oplodí středně silné. Barva plodu před zralostí světle zelená, ve zralosti tmavě červená. Chut' sladká.

Odrůda rezistentní proti napadení virem tabákové mozaiky patotypu P₀.

Lucifer

Raný až poloraný hybrid vhodný pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod středně lesklý, hladký, středně dlouhý, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu lichoběžníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí slabé až středně silné. Barva plodu před zralostí tmavě zelená, ve zralosti středně červená. Chut' sladká.

Orfeus

Raná až poloraná odrůda vhodná pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, silně zvrásněný, na bázi středně až silně zvlněný, velmi dlouhý, průměr plodu malý, převládající tvar na podélném řezu úzce trojúhelníkovitý, stopečná jamka mělká, oplodí slabé. Barva plodu před zralostí světle zelená, ve zralosti středně červená. Chut' sladká.

Prima

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách a v nejteplejších podmínkách kukuřičné oblasti i na poli. Plod lesklý, hladký, krátký, průměr plodu velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká, oplodí silné. Barva plodu před zralostí středně až tmavě zelená, ve zralosti červená. Chut' sladká.

Odrůda citlivě reaguje na teplotní a srážkové výkyvy zkracováním a žebernatěním plodů.

Saturn

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování ve vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Plod lesklý, slabě zvrásněný, na bázi středně zvlněný, dlouhý, průměr plodu malý, převládající tvar na podélném řezu úzce trojúhelníkovitý, bez stopečné jamky, oplodí slabé. Barva plodu před zralostí slabě nažloutlá, ve zralosti středně až tmavě červená. Chut' sladká.

PÓR

Allium porrum L.

Poribleu

Poloraná odrůda vhodná pro podzimní sklizeň.

Rostlina středně dlouhá. Listy polovzpřímené, modrozelené, středně až silně ojínné. Lodyha středně dlouhá, průměr lodyhy malý až střední, se slabým zesílením do cibule.

RAJČE

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

-keříčkové (determinantní):

Daneza Urias

Velmi pozdní hybrid určený pro ruční sklizeň s využitím plodů především pro přímý konzum.

Květenství jednoduché i složené. Plod velký, na podélném řezu převážně slabě zploštělého tvaru, na apikálním konci plochý se středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, slabě žebernatý, více než čtyřkomorový, před zralostí světle zelený bez žíhání, ve zralosti červený, dělivé pletivo ve stopce přítomné.

Vzhledem k dlouhé době vegetace v klimatických podmínkách České republiky vhodný k pěstování v rychlímáči; v polních podmínkách jen v nejteplejších částech kukuřičné oblasti.

Dublet

Pozdní hybrid vhodný pro polní pěstování a jednorázovou mechanizovanou sklizeň, především pro konzervářské zpracování, ale i přímý konzum.

Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký, převážně opakvejčitěho tvaru na podélném řezu, na apikálním konci zahrocený, u stopky hladký až slabě žebernatý, tří- až čtyřkomorový, před zralostí světle zelený bez žíhání, ve zralosti červený.

Sultán

Poloraná odrůda vhodná pro polní pěstování a jednorázovou mechanizovanou sklizeň, především pro konzervářské zpracování, ale i přímý konzum.

Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký, převážně válcovitěho tvaru na podélném řezu, na apikálním konci plochý, u stopky hladký, dvou- až tříkomorový, před zralostí světle až středně zelený bez žíhání, ve zralosti červený.

ŘEDKVIČKA

Raphanus sativus L. var. sativus

Bruno

Raný hybrid pro rychlení a jarní i podzimní polní pěstování.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy polovzpřímené, vejčitěho tvaru, středně zelené se středně laločnatým okrajem. Bulvičky středně velké až velké, převážně kulovité na bázi zakulacené, tmavě červené s matně bílou kompaktní dužninou.

Nárůst bulviček rychlý. Pro zachování kvality bulviček vyžaduje včasnou sklizeň.

Odolnost proti praskání bulviček vysoká, proti houbovatění bulviček po dosažení optimální sklizňové zralosti střední. Odolnost proti vybíhání do květu střední.

Candela di ghiaccio

Poloraná odrůda typu rampouch pro jarní i podzimní polní pěstování.

Rostliny vysoké. Listy vzpřímené až polovzpřímené, vejčitěho až široce vejčitěho tvaru se středně zelenou barvou a slabě laločnatým okrajem. Bulvičky dlouhé, bílé, hladké, rampouchovitěho tvaru s ojedinělým zelenáním hlavy na povrchu i na řezu. Dužnina matně bílá, kompaktní.

Po dosažení optimální sklizňové zralosti středně rychle houbovatí.

Odolnost proti vybíhání do květu střední.

Lada

Poloraná odrůda vhodná pro jarní až časně letní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy polovzpřímené, vejčitého tvaru, světle až středně zelené se slabě až středně laločnatým okrajem. Bulvičky velké, kulovité na bázi zakulacené, červené s matně bílou až narůžovělou kompaktní dužninou.

Odolnost proti vyšeptávání, houbovatení a praskání bulviček vysoká, proti vybíhání do květu středně vysoká až vysoká.

Mezzo lungo rosso punta bianca 3

Raná odrůda pro polní pěstování.

Rostliny vysoké. Listy polovzpřímené, široce vejčité, středně zelené se středně až silně laločnatým okrajem. Bulvičky úzké až středně široké, dlouze válcovitého tvaru, na bázi zakulacené až tupě špičaté, červené s bílou špičkou malého rozsahu. Dužnina matně bílá, v době optimální zralosti kompaktní, při přezrávání středně rychle houbovatí.

Odolnost proti vybíhání do květu středně vysoká až vysoká a proti praskání bulviček vysoká.

Ria

Velmi raná až raná odrůda pro rychlení v nevytápěných rychlínách a rané polní pěstování.

Rostliny středně vysoké. Listy vzpřímené, úzce vejčité, středně zelené se slabě laločnatým okrajem. Bulvičky středně velké, převážně kulovité, na bázi zakulacené, červené s matně bílou až narůžovělou kompaktní dužninou. Při přezrávání poměrně rychle houbovatí.

Odolnost proti vybíhání do květu střední a proti praskání bulviček vysoká.

Rosso tondo a grande punta bianca

Poloraná odrůda pro polní pěstování.

Rostliny vysoké. Listy polovzpřímené, vejčité, široce nasazené na kořenu, světle až středně zelené se silně laločnatým okrajem. Bulvičky velké až velmi velké, převážně kulaté, na bázi zakulacené, ale i tupě špičaté, červenorůžové s bílou špičkou, která je někdy rozšířena až na 75 % povrchu. Přechod barev rozmytý. Chutí připomíná vodnici. Dužnina matně bílá, v době optimální zralosti kompaktní, při přezrávání rychle houbovatí a vytváří se i dutiny.

Odolnost proti vybíhání do květu střední až vysoká a proti praskání bulviček vysoká.

Slovana

Raná odrůda pro rychlení v nevytápěných rychlínách a rané polní pěstování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, vejčité, světle zelené se slabě až středně laločnatým okrajem. Bulvičky tenké, dlouze válcovitého tvaru na bázi převážně zakulacené, červené s bílou špičkou malého až středního rozsahu. Dužnina matně bílá v době optimální zralosti kompaktní, při přezrávání středně rychle houbovatí.

Odolnost proti vybíhání do květu střední a proti praskání bulviček vysoká.

ŘEPA SALÁTOVÁ

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Bonel

Víceklíčková poloraná odrůda typu Detroit pro letní až podzimní sklizně, vhodná k přímé spotřebě, průmyslovému zpracování i skladování.

Chrást nízký až středně vysoký, listová čepel středně velká, tmavě zelená až zelenočervená, řapíky středně dlouhé, červené. Bulva kulovitá s plochým zakončením, karmínově červenou až hnědavou barvou, hladkou pokožkou, slabou až střední korkovitostí. Barva dužniny karmínově červená, kroužky stejné nebo tmavší barvy, vláknitost po vaření střední.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

Forono

Víceklíčková poloraná odrůda pro letní až podzimní sklizně, vhodná k přímé spotřebě, průmyslovému zpracování i skladování.

Chrást středně vysoký, listová čepel středně velká, tmavě zelená až zelenočervená, řapíky středně dlouhé, červené. Bulva dlouze válcovitá se zakulaceným zakončením, karmínově červenou hladkou pokožkou, bez nebo s velmi slabou korkovitostí. Dužnina intenzivně purpurově vybarvená, kroužky stejné barvy, vláknitost po uvaření slabá až střední.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

Modana

Jednoklíčková poloraná odrůda typu Detroit pro letní až podzimní sklizně, vhodná k přímé spotřebě, průmyslovému zpracování i skladování.

Chrást středně vysoký, listová čepel velká, zelenočervená až tmavě zelená, řapíky dlouhé, oranžové až červené. Bulva kulovitá s plochým až zakulaceným zakončením a karmínově červenou barvou, hladkou pokožkou, ojediněle s nepatrnou až střední korkovitostí. Dužnina červeně vybarvená, kroužky světlejší nebo stejné barvy, vláknitost po vaření střední. Bulvy méně vyrovnané ve tvaru a zakončení báze. Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

SALÁT HLÁVKOVÝ

Lactuca sativa L.

Lento

Poloraná odrůda máslového typu pro jarní, letní a podzimní polní pěstování.

Listy polovzpřímené, světle zelené bez antokyanu, se slabší až střední tloušťkou, slabým až středním leskem, slabou až střední bublinatostí. Hlávka středně velká, uzavřená, pevná, středně hustá až hustá, okrouhlá až ploše kulovitá, středně překrytá listy.

V podmínkách dlouhého dne jen ojediněle a pozvolna vybíhá do květu.

TUŘÍN

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rehb.

Dalibor

Odrůda k podzimní sklizni vhodná pro přímý konzum i skladování.

List středně až tmavě zelený, laločnatý. Bulva kulatá až mírně ploše kulovitá, pokožka červenofialová na bázi se smetanově bílou až lehce nažloutlou špičkou.

Hlava nezelená. Dužnina kompaktní, žlutě zbarvená.

Odolnost proti vybíhání do květu vysoká.

ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Combinor

Raný až poloraný hybrid pro jarní až letní sklizně k přímé spotřebě.

Rostliny nízké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy malé, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě zelené, velmi slabě bublinaté, středně až silně ojiněné. Hlávka malá, plochá až ploše kulovitá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek vysoká.

Drago

Polopozdní hybrid pro pozdní letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě a skladování.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně zelené, velmi slabě bublinaté a středně ojiněné. Hlávka středně velká, okrouhlá až obvejčitá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek vysoká.

Elisa

Velmi raný hybrid pro jarní sklizeň k přímé spotřebě.

Rostliny velmi nízké až nízké s krátkým vnějším košťálem. Listy malé, polovzpřímené až vodorovné, středně zelené, slabě bublinaté a středně ojiněné. Hlávka malá, okrouhlá, středně hustá, uzavřená, světle zelená, uvnitř žlutavá a na obvodu zelenavá s krátkým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek při přezrání střední.

Grenadier

Raný až poloraný hybrid pro jarní až letní sklizeň k přímému zásobování trhu, zejména výrobě salátů.

Rostliny nízké až středně vysoké s krátkým až středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně šedozelené, slabě až středně bublinaté a středně ojínné. Hlávka malá až středně velká, okrouhlá, středně hustá až hustá, křehká, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním koštěm. Odolnost proti praskání hlávek při přežrání nízká.

Hanibal

Raný až poloraný hybrid pro letní sklizně k přímému zásobování trhu, zejména k výrobě salátů. Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené až vodorovné, světle až středně zelené se šedozeleným nádechem, slabě až středně bublinaté a středně ojínné. Hlávka středně velká, plochá až ploše kulovitá s mírnou špičkou, volná až středně hustá, křehká, uzavřená, světle zelená, uvnitř žlutavá a po obvodu bělavá se dlouhým vnitřním koštěm. Náchylný k napadení škůdci. Odolnost proti praskání hlávek při přežrání nízká.

Marvellon

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, výrobě salátů a kruhárenskému zpracování. Rostliny vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené, světle až středně zelené, středně až silně bublinaté a slabě ojínné. Hlávka středně velká, okrouhlá, hustá a křehká, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm. Náchylný k napadení květilkou. Stabilita koštělu dobrá, ale v období plné zralosti se mírně vyklání.

Octoking

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu a kruhárenskému zpracování. Rostliny vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy velké, polovzpřímené, světle až středně zelené, silně bublinaté se slabým ojínním. Hlávka velká, ploše kulovitá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá a na obvodu bělavá s krátkým až středně dlouhým koštěm. Stabilita koštělu dobrá, ale v období plné zralosti se mírně vyklání.

Piton

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu a kruhárenskému zpracování. Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy velké, polovzpřímené, středně šedozelené barvy s modrozeleným nádechem, středně bublinaté se středním až silným ojínním. Hlávka velká, okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním koštěm. Stabilita koštělu velmi dobrá.

Ramada

Polopozdní hybrid pro letní až podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, krátkodobému skladování a kruhárenskému zpracování. Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené šedozelené s modrozeleným nádechem, slabě bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka středně velká, ploše kulovitá až okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená až žlutozelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým koštěm. Stabilita koštělu velmi dobrá.

Scanbo

Pozdní až velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, skladování a kruhárenskému zpracování. Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým až dlouhým a silným vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené u báze až vodorovné, tmavě zelené s šedozeleným nádechem, středně až slabě bublinaté a silně ojínné. Hlávka velká, široce obvejčitá, hustá až velmi hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř zelenavá se středně dlouhým vnitřním koštěm. Stabilita koštělu velmi dobrá.

Scandic

Pozdní až velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, skladování a

kruhárenskému zpracování.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně dlouhým až dlouhým a silným vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené u báze až vodorovné, tmavě zelené s modrozeleným nádechem, slabě bublinaté a silně ojínené. Hlávka velká, široce obvejčitá, hustá až velmi hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř zelenavá se středně dlouhým vnitřním koštěm.
Stabilita koštělu velmi dobrá.

Stardon

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, kruhárenskému zpracování a skladování.

Rostliny vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy velké polovzpřímené, světle zelené s šedozeleným nádechem, slabě bublinaté a středně až silně ojínené. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle zelená, uvnitř žlutavá se středně dlouhým vnitřním koštěm.
Stabilita koštělu velmi dobrá.

ZELÍ HLÁVKOVÉ ČERVENÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Holdbar Vinter Rodan

Pozdní odrůda pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, kruhárenskému zpracování a dlouhodobému skladování.

Rostliny střední až vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, světle až středně fialové se středně intenzivním zeleným nádechem, slabou až střední bublinatostí a středním až silným ojínením. Hlávka malá až středně velká, široce vejčitá, uzavřená, středně až tmavě fialová vně i uvnitř, pevná, hustá s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Huzaro

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě i dlouhodobému skladování.

Rostliny vysoké se středně dlouhým až dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké až velké, polovzpřímené až vzpřímené, světle až středně fialové se slabým až středním zeleným nádechem, velmi slabou bublinatostí, středně zvlněným okrajem čepele a silným ojínením. Hlávka středně velká, široce eliptická až obvejčitá, uzavřená, tmavě fialová vně i uvnitř, pevná, středně hustá až hustá, s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Stabilita koštělu velmi dobrá.

Integro

Poloraný hybrid pro letní sklizně, k přímému zásobování trhu a z pozdních výsad i ke skladování.

Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené, tmavě fialové se středně intenzivním zeleným nádechem, slabou bublinatostí a středním ojínením. Hlávka malá až středně velká, široce eliptická, vně středně fialová a uvnitř tmavá, pevná, hustá s krátkým vnitřním koštěm.

Stabilita koštělu velmi dobrá.

Kalibos

Pozdní odrůda pro podzimní sklizně na přímý konzum (zejména výrobu salátů), krouhání a krátkodobé skladování.

Rostliny vysoké s dlouhým a tlustým vnějším koštěm. Listy velké, polovzpřímené a u báze vodorovné, středně až tmavě zelenofialové, středně bublinaté s velmi velkou velikostí bublin a slabým ojínením. Hlávka vysoká, špičatě vejčitého tvaru, uzavřená, středně fialová vně i uvnitř, křehká, středně hustá s krátkým vnitřním koštěm.

Náchylná k napadení škůdci.

Stabilita koštělu velmi dobrá.

Langedijker Sommer Lasso

Poloraná odrůda pro letní sklizně k přímému zásobování trhu a případně ke kruhárenskému zpracování.

Rostliny středně vysoké s krátkým až středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě fialové barvy se středně intenzivním zeleným nádechem, slabou

bublinatostí a středním ojíněním. Hlávka malá až středně velká, okrouhlá, uzavřená, středně až tmavě fialová, uvnitř světle až středně fialová, pevná, středně hustá, s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštělem.

Lectro

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímému zásobování trhu, dlouhodobému skladování a z řidších výsadb i ke krouhání.

Rostliny vysoké se středně dlouhým až dlouhým vnějším koštělem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, u báze až vodorovné, světle až středně fialové barvy s intenzivním zeleným nádechem, slabou až střední bublinatostí a středním ojíněním. Hlávka středně velká, široce eliptická, středně až tmavě fialová vně i uvnitř, pevná, hustá se středně dlouhým vnitřním koštělem. Stabilita koštělu velmi dobrá.

Maestro

Poloraný hybrid pro letní sklizně k přímému zásobování trhu a z pozdních výsadb i ke skladování. Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším koštělem. Listy středně velké, polovzpřímené, tmavě fialové barvy se středně intenzivním zeleným nádechem, velmi slabou bublinatostí a středním ojíněním. Hlávka malá až středně velká, široce eliptická, tmavě fialová vně i uvnitř, pevná, hustá se středně dlouhým až dlouhým vnitřním koštělem.

Revue

Raný hybrid pro jarní a letní sklizně k přímému zásobování trhu.

Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším koštělem. Listy středně velké, polovzpřímené, tmavě fialové se středně intenzivním zeleným nádechem, velmi slabou bublinatostí, středně až silně zvlněným okrajem čepele a středním až silným ojíněním. Hlávka malá až středně velká, široce eliptická až obvejčitá, uzavřená, tmavě fialová vně i uvnitř, pevná, středně hustá až hustá, s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštělem.

ZELÍ PEKINGSKÉ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Brocken

Poloraný hybrid pro podzimní sklizeň, k přímé spotřebě i delšímu skladování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, velké, středně zelené, středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká až velká, široce elipsovité, tmavě zelená, uzavřená, středně pevná až pevná s krátkým vnitřním koštělem. Barva srdíčka na řezu tmavě žlutá. Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední až vysoká.

Manoko

Poloraný hybrid pro jarní nebo podzimní sklizně k přímé spotřebě a krátkodobému skladování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, středně velké až velké, středně zelené a středně až silně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká až velká, široce elipsovité, žlutozelená, uzavřená a pevná s krátkým vnitřním koštělem. Barva srdíčka na řezu středně žlutá. Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

Merkur

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě i skladování.

Rostliny středně vysoké. Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně velké, středně zelené, slabě až středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká, elipsovité, středně zelená, pootevřená až uzavřená, středně pevná až pevná, s krátkým až středně dlouhým vnitřním koštělem. Barva srdíčka na řezu středně žlutá.

Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

Senda

Poloraný hybrid pro letní a podzimní sklizně k přímé spotřebě i skladování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka střední až velká, elipsovité, žlutozelená, uzavřená, středně pevná až pevná s krátkým vnitřním koštělem. Barva srdíčka na řezu středně žlutá. Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

Yamiko

Raný až poloraný hybrid pro letní a podzimní sklizně k přímé spotřebě a krátkodobému skladování. Rostliny středně vysoké. Listy polóvzpřímené, středně zelené, slabě až středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka velká, široce elipsovitá, světle zelená, uzavřená a pevná s krátkým vnitřním košťálem. Barva srdíčka na řezu tmavě žlutá. Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

OVOCNÉ DRUHY A RÉVA

HRUŠEŇ

Pyrus communis L.

Armida

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost střední až silná, koruna rozložitá až převislá. Plody střední velikosti, hruškovitého tvaru. Základní barva slupky světle zelená, v období zralosti žlutá s červeným líčkem. Dužnina středně šťavnatá, aromatická, výrazně voňavá, navinule sladká. Slupka hladká, středně silná. Plody netrpí otlaky.

Do plodnosti nastupuje brzy, plodí pravidelně a hojně. Sklizeň v polovině září, konzumně dozrává do deseti dnů, plody lze skladovat do ledna.

Afinita s kdouloní (K-TE-B, E) je dobrá.

Elektra

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost silná, koruna rozložitá. Větve dostatečně obrůstají krátkými plodonoši. Plody tvaru hruškovitého s maximální šífkou ve středu. Základní zelenožlutou barvu slupky částečně překrývá rozmytý červený zbarvení. Dužnina tužší, šťavnatá, navinule sladká. Slupka středně silná a lesklá. Plody netrpí otlaky a jsou vhodné pro transport.

Do plodnosti nastupuje brzy, plodí pravidelně. Sklizeň začátkem září, konzumně dozrává během čtrnácti dnů, plody lze skladovat do listopadu.

Afinita s kdouloní (K-TE-B, E) je dobrá.

Isolda

Létní odrůda.

Vzrůstnost střední, růst letorostů typicky zvlněný. Plody tvaru hruškovitého, nesouměrné. Zelená základní barva slupky se v době zralosti barví do zelenožluté, kterou ze dvou třetin překrývá výrazné červené až tmavočervené rozmytý líčko. Dužnina rozplývavá, velmi šťavnatá, harmonická, voňavá. Slupka tenká a hladká.

Plodnost pozdější, plodí nepravidelně. Sklizeň začátkem srpna, konzumně dozrává v polovině srpna, plody lze skladovat čtrnáct dnů.

Afinita s kdouloní (K-TE-B, E) je dobrá.

JABLOŇ

Malus Mill.

Deliga

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, v plodnosti až slabá, koruna vzdušná, rozvětvená, plodonosný obrost krátký. Plody středně velké až velké, kulovitého tvaru, bez žebrování. Základní světle žlutou barvu slupky kryje rozmytá tmavá červen. Dužnina křehká, šťavnatá, výrazně voňavá, navinule sladká. Slupka středně silná.

Odolnost proti strupovitosti střední, v teplejších oblastech náchylná k napadení padlím jabloňovým.

Sklizeň začátkem října, plody lze skladovat do února.

Delvit

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, koruna vzpřímená až sloupcovitá, plodonosný obrost krátký. Větve mají sklon k vyholování. Plody jsou středně velké až velké, kulovité kuželovitého tvaru s méně znatelným žebrováním. Základní zelenožlutou barvu slupky překrývá celokrajně rozmytá červen se světlými lenticelami. Dužnina křehká, šťavnatá, navinule sladká. Slupka silná, hladká a ojíčná.

Odolnost proti strupovitosti střední, padlím trpí málo a jen v teplých oblastech.

Plodí pravidelně a hojně. Sklizeň začátkem října, plody lze skladovat do února.

Domino

Zimní odrůda.

Vzrůstnost střední, koruna rozložitá, volně vzdušná, plodonosný obrost krátký. Větve mají sklon k vyholování. Plody jsou středně velké až velké, kulovitěho tvaru se slabým žebrováním. Základní světle zelené zbarvení slupky, přechází v období zralosti v oranžovou. Červené líčko překrývá až 2/3 plodu. Dužnina křehká, šťavnatá, sladce navinulá, výrazně voňavá. Slupka tenká.

Odolnost proti strupovitosti střední, padlím trpí málo.

Plodí pravidelně a hojně. Sklizeň začátkem října, plody lze skladovat do března.

Produkta

Zimní odrůda.

Vzrůst střední, v plodnosti až slabý, koruna rozvětvená až převislá, plodonosný obrost krátký. Plody jsou středně velké až velké, podlouhle kuželovitěho tvaru, se zřetelným žebrováním. Základní zelenožlutá barva slupky přechází v období zralosti do světle žluté. V teplejších oblastech se někdy objevuje krycí barva v podobě oranžového líčka. Dužnina křehká, velmi šťavnatá, nasládlá, trávovitě voňavá. Slupka silná a hladká.

Odolnost proti strupovitosti dobrá, padlím trpí méně a jen v teplejších oblastech. Při sklizni velmi citlivá na otlačky.

Plodí pravidelně a hojně. Sklizeň začátkem října, plody lze skladovat do února.

- p o d n o ž e

MM-106

Vzrůstná, vegetativně množená podnož pro jablono.

Podíl tvorby silných oddělků vyšší. Výraznost pupenové patky střední. Listy převážně vzpřímené, středně velké s pilovitým okrajem a velkým palistem. Podnož vytváří větší kořenový systém.

Odolnost vůči velmi nízkým teplotám dobrá.

RÉVA

Vitis L.

Děvín

Středně pozdní až pozdní, moštová bílá odrůda.

Olistění keřů řídké. Hrozen střední až menší, bobule menší, zelenožluté, s tenkou slupkou.

Zdravotní stav dobrý, ochrana proti botrytidě a oidiu nutná. Odolnost proti zimním mrazům a suchu dobrá.

Výnosy vysoké a pravidelné.

Odrůda vyniká vysokým obsahem cukru. Víno plné, aromatické, s vyšším obsahem alkoholu.

Vhodná i pro pozdní sběry, z nichž se vyrábí víno vysoké jakosti.

Diamant

Raná stolní odrůda, vhodná pro vyšší tvary keřů.

Vzrůstnost silná, hrozen velký až velmi velký, volný, s velkými oválnými žlutozelenými bobulami, jejichž dužnina je masitá, harmonické chuti.

Běžná ochrana proti chorobám a škůdcům nutná. Raší později, proto uniká jarním mrazíkům.

Odolnost proti zimním mrazům nižší, proti suchu slabší.

Výnosy vysoké a stabilní, tržní hodnota hroznů vysoká.

Odrůda vhodná jen do vybraných vinohradnických lokalit.

OKRASNÉ DRUHY

ASTRA ČÍNSKÁ

Callistephus chinensis (L.) Nees

Lada

Odrůda jehlicovitá nízká.

Rostliny nízké, slabě až středně větvičí, stonek středně pevný až pevný.

Úbory středně velké až větší, světle karmínově růžové.

JIRINKA PROMĚNLIVÁ

Dahlia pinnata Cav.

Alpy

Odrůda s leknínovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, stažené, silně větvičí. Stonek pevný, světle zelený, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké, žluté.

Andy

Odrůda s leknínovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, hnědofialový, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké až větší, sametově červené, u středu tmavší, na okraji světlejší.

Aura

Odrůda s leknínovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité až kulovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, zelený s hnědofialovým stínováním, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké, fialově růžové, u středu růžově fialové, okrajové květy světlejší.

Azurit

Odrůda s dekoračním kulovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, světle zelený, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké. Barva úboru růžově fialová, u středu tmavší, okrajové květy světlejší.

Baby

Odrůda s pomponkovitým typem úboru.

Rostliny nízké, kulovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, světle zelený, listy tmavě zelené.

Úbory malé, karmínově růžové, okrajové květy světlejší.

Novinka v sortimentu jirinek, tzv. miniatura, vhodná i k pěstování ve větších květináčích.

Dyje

Odrůda s pomponkovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s hnědofialovým stínováním, listy tmavě zelené.

Úbory malé až středně velké, tmavě purpurově červené.

Heda

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny vysoké, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený, listy středně zelené.

Úbory velké, žluté.

Hydra

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, slabě až středně větvičí. Stonek pevný, světle zelený s nepravidelným tmavě zeleným stínováním.

Úbory středně velké, žluté.

Indigo

Odrůda s dekoracním kulovitým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité až kulovité, středně až silně větvičí. Stonek středně pevný až pevný, středně zelený, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké, tmavě sametově červené.

Ines

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným hnědočerveným stínováním, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké až větší, karmínově růžové, u středu tmavší.

Léto

Odrůda s pomponkovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké až vysoké, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, světle zelený s nepravidelným hnědočerveným stínováním, listy středně zelené.

Úbory malé až středně velké, žluté, u středu žlutooranžové.

Luna

Odrůda s leknínovitým typem úboru.

Rostliny nízké, kulovité, středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké, žluté, se světlejšími špičkami květů.

Nella

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, hnědofialový, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké. Barva úboru oranžová, ke středu lososově růžová, střed purpurově červený.

Nina

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, hnědofialový, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké až větší, růžově fialové, u středu tmavší.

Reklama

Odrůda s dekoracním kulovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké až vyšší, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s hnědofialovým stínováním, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké, červené, u středu tmavší, na okraji světlejší.

Sandra

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, zelený s nepravidelným hnědofialovým stínováním, listy středně zelené.

Úbory velké, oranžové, ke středu lososově růžové.

Sára

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, hnědofialový, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké až větší. Barva úboru sytější karmínově růžová, u středu purpurově červená, na okraji velmi světle karmínově růžová.

Symfonia

Odrůda s dekoracním kulovitým typem úboru.

Rostliny vysoké, keřovité, středně větvičí. Stonek středně pevný až pevný, světle zelený s hnědočerveným stínováním, listy středně zelené.

Úbory středně velké až větší, oranžově červené, u středu tmavší, na okraji světlejší.

Tatry

Odrůda s leknínovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, stažené, slabě až středně větvící. Stonek pevný, hnědofialový, listy tmavě zelené.

Úbory středně velké. Barva úboru růžově fialová, u středu purpurově fialová, na okraji světlejší.

Vanda

Odrůda s kaktusovitým typem úboru.

Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvící. Stonek pevný, středně zelený s hnědofialovým stínováním, listy tmavě zelené.

Úbory velké. Barva úboru je karmínově růžová, u středu velmi světle žlutá, na okraji světle karmínově růžová.

JONÁTKA AFRICKÁ (KAPSKÁ FIALKA)

Saintpaulia ionanta H. Wendl.

Maria

Rostliny středně vysoké, listy středně zelené, na rubové straně světle zelené.

Květ bílý, jednoduchý (volně poloplný), má zvlněné okraje květních plátků.

MEČÍK

Gladiolus L.

Salome

Odrůda velkokvětá, raná.

Rostliny vysoké. Květenství husté, dvouřadé. Počet květů v květenství střední až velký.

Květ pravidelný, okraje květních plátků středně zvlněné. Barva květu matně karmínově červená, u středu světlejší, na dolním květním plátku světle žluté oko.

Samba

Odrůda velkokvětá, středně raná.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Květenství husté, dvouřadé. Počet květů v květenství střední.

Květ pravidelný, okraje květních plátků velmi silně zvlněné. Barva květu tmavě lososově růžová, ke středu světlejší. Na dolním květním plátku velké červené oko s purpurově červeným proužkem.

PELARGONIE PÁSKATÁ

Pelargonium-Zonale-Hybridae

Helena

Odrůda hybridní, středně raná.

Rostliny středně vysoké, listy středně zelené s výrazným hnědým pruhem. Květenství středně velké, středně husté. Květ jednoduchý, světle karmínově růžový, u středu má velké bílé oko.

Marie

Odrůda hybridní, středně raná.

Rostliny nízké až středně vysoké, listy středně až tmavě zelené s výrazným hnědým pruhem.

Květenství středně velké, středně husté. Květ jednoduchý, lososově růžový se světlejším okrajem květních plátků.

Pavla

Odrůda hybridní, středně raná.

Rostliny středně vysoké, listy světle až středně zelené s méně výrazným hnědým pruhem. Květenství středně velké až větší, středně husté. Květ jednoduchý, růžově fialový, na horních květních plátcích má bílé oko s růžově fialovou žilnatinou.

SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ

Carthamus tinctorius L. (partim)

Vierka

Letnička vhodná k řezu v čerstvém stavu i k sušení.

Rostliny nízké až středně vysoké, listy tmavě zelené.

Květenství středně velké, oranžové.

TULIPÁN

Tulipa L.

Aleko

Odrůda zařazena do skupiny zahradních tulipánů „Darwin-hybridy“.

Rostliny vysoké, stonek pevný, ojíněný, pod květem má antokyanové stínování.

Jednoduchý květ pevný, středně velký, na vnější straně na hřbetě tmavě červený, ojíněný, k okraji červený, lem žlutý s červenou žilnatinou. Na vnitřní straně květ červený, od poloviny plátku žlutooranžový s nepravidelnou červenou žilnatinou. Terč žlutý.

Labakan

Odrůda patří do skupiny botanických tulipánů „*Tulipa fosteriana Hoog*“.

Rostliny středně vysoké, stonek velmi pevný, ojíněný.

Jednoduchý květ je pevný, dlouhý, na vnější straně na hřbetě červený, ojíněný, k okraji šarlatově červený. Vnitřní strana květu šarlatově červená. Terč černý se žlutým lemem.

O z n á m e n í

o změně názvu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky
k 1. srpnu 1998

Ve sloupcích jsou uvedeny následující údaje:

- 1 - identifikační číslo odrůdy
- 2 - udržovatel odrůdy a žadatel
- 3 - zmocněný zástupce
- 4 - původní název odrůdy
- 5 - nový název odrůdy
- 6 - datum rozhodnutí o změně názvu

Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6
KUKUŘICE					
<i>Zea mays L.</i>					
ZEA3162	460	172	Evelyne	Javala	04.05.1998
ZEA3163	460	172	Sil	Machero	04.05.1998
VOJTĚŠKA					
<i>Medicago sativa L.</i>					
MDS1662	171		Viktoria	Vlasta	22.06.1998
CIBULE					
<i>Allium cepa L.</i>					
ALC3125	552	158	Agostana di Chioggia	Agostana	23.07.1998
FAZOL					
<i>Phaseolus vulgaris L.</i>					
- p n o u c í:					
PHV3127	552	158	Rampicante Borlotto di Vigevano	Borlotto di Vigevano	23.07.1998
ZELÍ HLÁVKOVÉ BÍLÉ					
<i>Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.</i>					
BRC3594	347	136	Admirala	Admiral	01.04.1998

JMÉNA A ADRESY UDRŽOVATELŮ ODRŮD, ŽADATELŮ A ZMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

Kód:	Jméno:	Adresa:
136	BOHEMIASEED, spol. s r. o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
158	OSEVA PRO spol. s r. o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
171	AGROGEN, spol. s r. o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
172	SELGEN a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
347	Clause Semences	24, boulevard Pierre Brossolette, 91221 Brétigny sur Orge Cédex, Francie
460	Südwestdeutsche Saatzucht	Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, SRN
552	SATIVA - Soc. Coop.	Via Madonna Dello Schioppo No. 415, 47023 Cesena, Itálie

Odbor zemědělské výroby
Ing. Ivan Branžovský, CSc., v.r.

Ministerstvo zemědělství

Odbor lesnické politiky - 5130

Č. j.: 1023/98 - 5130

OZNÁMENÍ

**sazeb na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost
hradí stát.**

Ministerstvo zemědělství na základě vyhlášky č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, vydává sazby na tuto činnost.

Sazba do 3 ha	58 Kč
Sazba nad 3 ha	46 Kč

Sazby nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999.


Ing. Martin Chytrý

ředitel odboru lesnické politiky

Doplněk č. 1

zásad regulace trhu mléka v roce 1998

Rada Státního fondu tržní regulace v zemědělství rozhodla na svém zasedání dne 28.9.1998 o změně bodů 7.a) a 7.b) Článku I. zásad regulace trhu mléka v roce 1998 (č.j. 6181/98 ze dne 1. prosince 1997).

Body 7.a) a 7.b) Článku I. uvedených zásad nově zní:


ČLÁNEK I.

SUBVENCOVANÝ VÝVOZ A INTERVENČNÍ NÁKUP MÁSLA

7. Subvencovaný vývoz másla

- a) Subvencovaný vývoz másla bude realizován formou poskytnutí vývozní subvence. Tato subvence bude poskytována zálohovým způsobem s tím, že po skončení určeného období bude výše subvence přehodnocena postupem, schváleným Radou. Pro období 4. čtvrtletí 1998 však platí, že výše zálohové subvence na vývoz másla bude odvozena zásadně pouze od finančních prostředků, které zbývají k dočerpání z celkového objemu, který je pro regulaci trhu mléka v roce 1998 vyčleněn v rozpočtu Fondu.
- b) Vývozní subvence bude poskytována zásadně pouze mlékárnám. Pro období 4. čtvrtletí 1998 platí, že zálohová sazba subvence, schválená Radou Fondu, bude stanovena v návaznosti na znění bodu 7.a) Doplněku č. 1 a její výše bude po skončení určeného období ověřena. Vypořádání zálohové subvence na maslo, po projednání a schválení Radou Fondu, bude provedeno tak, že rozhodující pro stanovení výše případného doplatku subvence bude objem finančních prostředků, který pro účely regulace trhu mléka bude v rozpočtu Fondu k dispozici.

Ing. Jan Fencel
ministr zemědělství
a předseda Rady Fondu



I n s t r u k c e
číslo : 26

**Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství
k uplatňování paragrafů 37, 41 až 45 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
a Vyhlášky MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o
udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v
lesním hospodářství :**

Č.j. 998/98 - 5120 Vyřizuje: dr. Sýkora, tel. 2181/2717 V Praze dne 19. 10. 1998

1. Úvodní ustanovení

Tato instrukce doplňuje výčet forem studia lesnického školství v ČR a posouzení jejich absolventů ve vazbě na udělování licencí podle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), (dále jen zákon).

2. Přehled oborů, forem studia a stupňů vzdělání středního a vysokého školství v České republice (stav ve školním roce 1997/1998).

2.1. Vysokoškolské studium :

Lesnické fakulty zemědělských univerzit v Praze a Brně - studijní obory :

- lesní inženýrství
- dřevařské inženýrství
- krajinné inženýrství

ČZU, LF Praha mimo to má otevřen obor bakalářského studia „Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství“

Ze všech těchto studijních oborů vysokoškolského studia lze nadále považovat jako odpovídající vzdělání pro udělení licence podle zákona, pouze absolvování studijního oboru „Lesní inženýrství“.

Doktorandské a bakalářské studium na lesnické fakultě zemědělské univerzity nemá vazbu na udělování licencí podle zákona.

2.2. Vyšší odborné studium :

Poskytují jej v současnosti Střední a vyšší lesnické školy v Trutnově a v Písku. Na absolventy (diplomované lesníky), se nahlíží ve vztahu k udělování licencí podle zákona stejně, jako na absolventy středních lesnických škol, studijního oboru „lesnictví“.

2.3. Úplné střední studium :

Poskytuje 5 středních lesnických škol (Trutnov, Písek, Hranice, Žlutice a Šluknov), přičemž vazbu na udělení licencí podle zákona má pouze úspěšné absolvování studijního oboru „lesnictví“.

2.4. Střední odborné studium :

Je zajišťováno v experimentálním, nematuritním studijním oboru „lesní hospodářství“ ve Středním odborném učilišti Bzenec a v Integrované střední lesnické škole Vimperk.

Absolvování tohoto typu studia se nepovažuje za vzdělání odpovídající udělení licence podle zákona, stejně jako bývalé mistrovské lesnické školy a střední školy pro pracující ve Šluknově.

2.5. Střední odborná učiliště lesnická :

Absolvování středního odborného učiliště lesnického v jakémkoliv učebním oboru (včetně nástavbových oborů maturitních) se nepovažuje za ucelené lesnické vzdělání za účelem udělení licence podle zákona.

Tato instrukce nabývá účinnosti dnem: 1. 12. 1998

Ing. Karel Vančura, CSc., v.r.
ředitel odboru
rozvoje lesního hospodářství