

O z n á m e n í

o odrůdách rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona č. 92/1996 Sb. v období od 21. srpna 1998 do 1. července 1999

Ve sloupcích jsou uvedeny následující údaje:

- 1 – identifikační číslo odrůdy
- 2 – udržovatel a žadatel (je-li žadatel jiný než udržovatel, je uveden v závorce)
- 3 – zmocněný zástupce
- 4 – název odrůdy
- 5 – označení odrůdy v řízení o registraci
- 6 – datum podání žádosti o registraci
- 7 – datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci

Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

OBILNINY

JEČMEN

Hordeum vulgare L. sensu lato

- jarní

HRV4040	033	271	Madeira	SEMU 86027	08.01.1996	27.04.1999
HRV3951		176	Maridol	KM 1559	22.12.1995	27.04.1999
HRV4038	031	271	Orthega	LP 29294	08.01.1996	27.04.1999

- ozimý

HRV3812	528	176	Tiffany	Tiffany	25.08.1995	09.06.1999
HRV3807	172		Luran	SG-L 725	24.08.1995	10.09.1998

KUKURICE

Zea mays L.

ZEA4176	362	500	Anjou 235	LZM 244/31	01.02.1996	02.04.1999
ZEA4177	362	500	Anjou 258	ANJOU 258	01.02.1996	02.04.1999
ZEA4181	065	255	Balada	SUM 94504	02.02.1996	02.04.1999
ZEA4154	196		Celido	CE 6895	29.01.1996	02.04.1999
ZEA4196	777	493	Elita	X 0814 B	05.02.1996	02.04.1999
ZEA4204	460	255	Havana	SWS 10444	06.02.1996	02.04.1999
ZEA3707	177	202	Jozefina	TA 327	08.02.1995	02.04.1999
ZEA4169	362	145	LG 2222	LZM 144/10	30.01.1996	02.04.1999
ZEA4157	716	469	Marshall	Marshall	29.01.1996	02.04.1999
ZEA4197	777	493	Monalisa	X 0903 B (3860)	05.02.1996	02.04.1999
ZEA4179	065	255	Radana	SUM 94501	02.02.1996	02.04.1999
ZEA4266	670	671	Rex	SK 207923	21.03.1996	02.04.1999
ZEA4243	362	946	Safrane	Safrane	29.02.1996	02.04.1999
ZEA3703	177	202	Tereza	TA 238 S	08.02.1995	02.04.1999

OVES

Avena sativa L.

AVS3962	444	147	Petra	Sv 89250	29.12.1995	10.03.1999
AVS4043	052	271	Revisor	Revisor	08.01.1996	10.03.1999

PŠENICE SETÁ

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- ozimá

TTA3841	672	202	Apache	NSA 93-0211	01.09.1995	15.06.1999
TTA3835	335	499	Corsaire	FD 90050	01.09.1995	15.06.1999
TTA3829	223		Niagara	BR 458	01.09.1995	15.06.1999
TTA3843	528	223	Record	BR 1953 C 11	01.09.1995	15.06.1999
TTA3844	374	172	Rialto	CWW 90/1	01.09.1995	15.06.1999
TTA3832	292	636	Semper	CEBECO 9303-A	01.09.1995	15.06.1999
TTA3838	031	271	Sepstra	LP 604.3	01.09.1995	15.06.1999
TTA3842	172,(163)		Vlasta	RU-488	01.09.1995	15.06.1999

ŽITO SETÉ

Secale cereale L.

- ozimé

SCC3917	564		Ergo	CMS TC-1	16.04.1997	02.04.1999
---------	-----	--	------	----------	------------	------------

TRÁVY

BOJÍNEK LUČNÍ

Phleum pratense L.

PLP3415	025	464	Lentimo	Leutimo	29.12.1994	22.03.1999
PLP3416	025	464	Lirocco	Lirocco	29.12.1994	22.03.1999

JÍLEK VYTRVALÝ

Lolium perenne L.

LLP3461	115	032	Anduril	Anduril	02.01.1995	22.03.1999
LLP3385	497	171	Barlouise	BAR ER 5436	21.12.1994	22.03.1999
LLP3462	115	032	Delaware	Delaware	02.01.1995	22.03.1999
LLP3464	115	032	Figaro	Figaro	02.01.1995	22.03.1999
LLP3395	147		Jaspis	VV-II/86	22.12.1994	02.04.1999
LLP3418	025	464	Litomba	N 1041	29.12.1994	02.04.1999
LLP3468	115	032	Napoleon	Napoleon	02.01.1995	22.03.1999
LLP3469	292	636	Numan	MMG 80	02.01.1995	22.03.1999
LLP3471	292	636	Recolta	EER 1066	02.01.1995	27.04.1999
LLP3472	115	032	Sakini	Sakini	02.01.1995	22.03.1999
LLP3475	115	032	Taya	Taya	02.01.1995	22.03.1999
LLP3476	115	032	Tivoli	Tivoli	02.01.1995	22.03.1999
LLP3478	115	032	Trani	Trani	02.01.1995	22.03.1999
LLP3479	292	636	Troubadour	EEG 82	02.01.1995	22.03.1999

KOSTŘAVA ČERVENÁ

Festuca rubra L.

FSR3757	497	171	Bargena	Bargena	13.03.1995	22.03.1999
FSR3482	115	032	Pernille	Pernille	02.01.1995	22.03.1999

KOSTŘAVA LUČNÍ

Festuca pratensis Huds.

FSP3421	025	464	Lifelix	Lifelix	29.12.1994	07.04.1999
FSP3422	025	464	Limosa	N 218	29.12.1994	07.04.1999
FSP3398	147		Pronela	VV-1/89	21.12.1994	19.05.1999
FSP3486	292	636	Stella	BL 103	02.01.1995	22.03.1999

PSINEČEK TENKÝ

Agrostis tenuis Sibth.

AGT3399	147		Vítek	VV-I/88	22.12.1994	02.04.1999
---------	-----	--	-------	---------	------------	------------

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ

Pisum sativum L. (partim)

PSS3939	172		Gotik	SG-L 676	19.12.1995	29.04.1999
PSS3937	172		Zekon	SG-L 11	19.12.1995	22.03.1999

LUPINA PROMĚNLIVÁ (ANDSKÁ)

Lupinus mutabilis L.

LUP4481	171		Anda	Anda	11.11.1996	05.02.1999
---------	-----	--	------	------	------------	------------

JETELOVINY

JETEL LUČNÍ

Trifolium pratense L.

TFP2072	201		Dolina	HŽ-V	11.02.1992	13.04.1999
---------	-----	--	--------	------	------------	------------

JETEL PLAZIVÝ

Trifolium repens L.

TFR3494	115	032	Milo	Milo	02.01.1995	22.03.1999
TFR3495	115	032	Rivendel	Rivendel	02.01.1995	22.03.1999

JETEL ZVRHLÝ (ŠVÉDSKÝ)

Trifolium hybridum L.

TFH3495	115	032	Ermo	Ermo	02.01.1995	22.03.1999
---------	-----	-----	------	------	------------	------------

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY

HOŘČICE BÍLÁ

Sinapis alba L.

SNA2778	030	255	Ascot	SF 84	10.01.1996	02.04.1999
---------	-----	-----	-------	-------	------------	------------

KONOPÍ SETÉ*Cannabis sativa L.*

CNS4259	735	222	Beniko	Beniko	01.07.1996	19.05.1999
CNS4260	734	222	JUSO-11	Zolotonožské již. jedn. II	01.07.1996	19.05.1999

LEN*Linum usitatissimum L.*

- olejný:

LNU3918	292	636	Lola	ED 45	05.06.1996	19.05.1999
---------	-----	-----	------	-------	------------	------------

- p ř a d n ý:

LNU4258	688	968	Diane	Diane	07.03.1996	19.05.1999
LNU4255	688	968	Hermes	Hermes	07.03.1996	19.05.1999

ŘEPKA*Brassica napus L. (partim)*

- j a r n í

BRN3957	777	493	46A75	NS 1575	22.12.1995	08.03.1999
BRN33886	753	255	Amica	PHP-131	06.12.1995	22.03.1999
BRN3887	753	255	Bolero	PHP-132/93	06.12.1995	22.03.1999
BRN3998	115	032	Topscore	DP 6-91	29.12.1995	22.03.1999

- o z i m á

BRN3801	024	463	Artus	NPZ 044	21.08.1995	08.03.1999
BRN3792	697	268	MS 9501 *)	EG 92/1 a Apex	15.08.1995	15.06.1999
BRN3793	378	500	Navajo	Navajo	15.08.1995	08.03.1999
BRN33788	444	147	Tenor	SW 002	02.08.1995	08.03.1999

Vysvětlivka:

*) pylově sterilní hybrid, pro pěstování se smí uvádět do oběhu jen ve směsi s odrůdami Magnum a Apex jako opylovači v poměru 70% MS 9501 + 15% Magnum + 15% Apex s označením „sdružená odrůda“ pod názvem „Betty“

SLUNEČNICE*Helianthus annuus L.*

HLA4104	276	657	Labud	NS-BW-3 x R	11.01.1996	02.04.1999
HLA4114	711	268	Melody	NX-12 244	15.01.1996	02.04.1999
HLA4115	711	268	Pixel	NX-12 339	15.01.1996	02.04.1999

OSTATNÍ KRMNÉ DRUHY**SVAZENKA VRATICOLISTÁ***Phacelia tanacetifolia Benth.*

PCT4199	025	464	Lisette	Lisette	05.02.1996	08.03.1999
---------	-----	-----	---------	---------	------------	------------

OKOPANINY**BRAMBOR***Solanum tuberosum L.*

SLT3875	044	948	Colette	Colette	01.12.1995	10.03.1999
SLT3635	045	948	Filea	Filea	01.12.1995	22.03.1999
SLT4001	519		Kordoba	KE 115/94	29.12.1995	08.03.1999
SLT4066	294	496	Kuras	Kuras	10.01.1996	08.03.1999
SLT3906	311	158	Nika	Hommes 85-7	14.12.1995	10.03.1999
SLT4069	294	496	Provento	Provento	10.01.1996	10.03.1999
SLT4145	209		Samanta	HR 37/35	22.01.1996	10.03.1999
SLT4122	043	151	Safina	Safina	15.01.1996	10.03.1999
SLT4123	043	151	Sibu	Sibu	15.01.1996	08.03.1999
SLT4004	043	151	Velox	Velox	29.12.1995	08.03.1999
SLT3679	653	948	Vineta	Vineta	01.12.1995	10.03.1999
SLT4125	310	151	Vivaldi	VDZ 87-105	15.01.1996	08.03.1999

ČUKROVKA*Beta vulgaris L. var. altissima Döll*

BTA4130	068	498	Arosa	DEL 953 CZ	17.01.1996	05.02.1999
BTA4229	279	717	Bristol	H 66224	16.02.1996	05.02.1999
BTA4279	110	482	Capri	M 9652	09.05.1996	08.03.1999
BTA4218	046	180	Dialog	Dieck 9406	14.02.1996	05.02.1999
BTA4213	447	268	Euro	HM 5283	12.02.1996	05.02.1999
BTA4132	068	498	Granada	DEL 959 CZ	17.01.1996	05.02.1999
BTA4212	447	268	Grand	HM 1437	12.02.1996	08.03.1999
BTA4127	069	628	Loretta	Loretta	15.01.1996	05.02.1999
BTA4245	069	628	Patricia	KWS-CZ 356	28.02.1996	10.03.1999
BTA4131	068	498	Porto	DEL 954 SK	17.01.1996	10.03.1999
BTA4281	016	282	Rimini	S 1463	09.05.1996	22.03.1999
BTA4282	016	282	Riposte	Riposte	09.05.1996	08.03.1999

ŘEPA KRMNÁ*Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.*

BTC4767	335	499	Jauna	Jauna	30.12.1996	05.02.1999
BTC4163	752	147	Mars Poly	Gigant Poly	29.01.1996	05.02.1999
BTC4166	752	147	Solidar	Solidar	29.01.1996	05.02.1999

ZELENINY**BROKOLICE***Brassica oleracea L. convar. botrytis var. cymosa Duch.*

BRY4617	719	473	Arcadia	Arcadia	10.12.1996	27.04.1999
BRY4565	278	183	Fiesta	Fiesta	17.12.1996	27.04.1999
BRY4566	301	268	Montvy	SG 4459	30.12.1996	27.04.1999
BRY4462	313	186	Murcia	Murcia	01.11.1996	27.04.1999
BRY4770	769	768	Ramoso calabrese medio precoce	Calabrese medio precoce	31.12.1996	19.05.1999

CELER BULVOVÝ*Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.*

APG5328	278	183	Luna	Luna	30.12.1997	05.02.1999
---------	-----	-----	------	------	------------	------------

CIBULE*Allium cepa L.*

- jarní

ALC4775	769	768	Borettana	Borettana	31.12.1996	04.01.1999
ALC4815	427	510	Boston	VDH 93-010	09.01.1997	04.01.1999
ALC4728	992	558	Brahma	Brahma	23.12.1996	04.01.1999
ALC4821	765	136	Laura	Laura	02.01.1997	04.01.1999
ALC4621	719	473	Lena	Lena	10.12.1996	04.01.1999
ALC4846	773	774	Rocky	Rocky	10.01.1997	04.01.1999
ALC4816	427	510	Samba	Samba	09.01.1997	04.01.1999
ALC4774	769	768	Tropea rossa tonda	Tropea rossa tonda	31.12.1996	04.01.1999
ALC4773	769	768	Vernina di Firenze	Vernina di Firenze	31.12.1996	04.01.1999
- ozimá						
ALC4015	278	183	Arctic	BSG 49	03.01.1996	04.01.1999

ČESNEK KUCHYŇSKÝ*Allium sativum L.*

- ozimý

ALS5144	950	951	Mojmír	HP-CE/1	04.12.1997	04.01.1999
ALS4337	544		Tantal	ROL VF	30.07.1996	23.09.1998
ALS4336	544		Tristan	MOR VF	30.07.1996	23.09.1998

FAZOL*Phaseolus vulgaris L.*

- keříčkový:

PHV4500	239		Aidagold	SM 4003/95	11.12.1996	05.02.1999
PHV4745	320	231	Artolan	Artolan	08.01.1997	04.01.1999
PHV4777	769	768	Bobis nano	Bobis nano	31.12.1996	05.02.1999
PHV4017	347	136	Freor	CLX 43	03.01.1996	05.02.1999
PHV4746	320	231	Goldfish	Goldfish	08.01.1997	04.01.1999
PHV5148	950	951	Lilana	A-3	04.12.1997	11.11.1998
PHV5147	950	951	Melinda	A-4	04.12.1997	11.11.1998
PHV5149	950	951	Nigrana	A-2	04.12.1997	11.11.1998
PHV4779	769	768	Provider	Provider	31.12.1996	04.01.1999

- p n o u c í:

PHV4780	769	768	Borlotto lingua di fuoco 3	Borlotto lingua fuoco 3	31.12.1996	05.02.1999
---------	-----	-----	----------------------------	-------------------------	------------	------------

HRÁCH SETÝ DŘEŇOVÝ*Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend. C. O. Lehm.*

PSS4817	372	510	Balmoral	Balmoral	09.01.1997	05.02.1999
PSS4818	372	510	Jaguar	Jaguar	09.01.1997	05.02.1999
PSS4781	769	768	Meraviglia d' Italia	Meraviglia d' Italia	31.12.1996	05.02.1999
PSS4819	372	510	Polo	Polo	09.01.1997	05.02.1999
PSS4820	372	510	Sancho	Sancho	09.01.1997	05.02.1999

KAPUSTA HLÁVKOVÁ*Brassica oleracea L. convar. capitata var. sabauda L.*

BRS4569	278	183	Imposa	Imposa	17.12.1996	04.01.1999
BRS4048	301	268	Premius	SG 2817	08.01.1996	04.01.1999
BRS4822	347	136	Rigoletto	Rigoletto	02.01.1997	04.01.1999
BRS4622	719	473	Salarite	Salarite	10.12.1996	04.01.1999

KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ*Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.*

BRG4570	301	268	Helemus	SG 2095	30.12.1996	27.04.1999
BRG4782	769	768	Mezzo nano	Mezzo nano	31.12.1996	27.04.1999

KEDLUBEN*Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) var. gongylodes*

BRD4463	313	186	Cindy	Cindy	01.11.1996	08.03.1999
BRD4771	769	768	Di Vienna bianco	Di Vienna bianco	31.12.1996	08.03.1999
BRD5329	278	183	Kolibri	Kolibri	30.12.1997	08.03.1999
BRD4464	313	186	Lahn	Lahn	01.11.1996	08.03.1999
BRD3861	239		Modrava	SM 11	21.11.1995	08.03.1999

KVĚTÁK*Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) var. botrytis*

BRB4748	320	231	Amsterdam	Amsterdam	08.01.1997	02.04.1999
BRB4139	313	186	Barbason	Barbason	19.01.1996	02.04.1999
BRB4515	140		Beta	Beta	10.12.1996	02.04.1999
BRB4050	301	268	Cortes	SG 4134	08.01.1996	02.04.1999
BRB4516	140		Delta	Delta	10.12.1996	02.04.1999
BRB4823	347	136	Escale	CLX 3324	02.01.1997	02.04.1999
BRB4749	320	231	Floriade	Floriade	08.01.1997	02.04.1999
BRB4863	299	193	Kimball	RS 91011	20.01.1997	02.04.1999
BRB4864	299	193	Kintore	RS 5104	20.01.1997	02.04.1999
BRB4140	313	186	Roxford	Roxford	19.01.1996	02.04.1999
BRB4824	347	136	Thalassa	CLX 3328	02.01.1997	02.04.1999
BRB4750	301	268	Virgin	SG 4105	30.12.1996	07.04.1999

MANGOLD*Beta vulgaris L. var. vulgaris*

BTV4785	769	768	Verde a costa bianca 3	Verde a costa bianca 3	31.12.1996	04.01.1999
---------	-----	-----	------------------------	------------------------	------------	------------

MELOUN VODNÍ*Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai*

CTL4786	769	768	Charleston Gray	Charleston Gray	31.12.1996	28.06.1999
CTL4787	769	768	Sugar Baby	Sugar Baby	31.12.1996	28.06.1999

MRKEV*Daucus carota L.*

DCC4730	992	558	Adona	SXC 3071	23.12.1996	19.05.1999
DCC4573	278	183	Barcelona	Barcelona	17.12.1996	27.04.1999
DCC4729	1013	510	Katop	Katop	23.12.1996	27.04.1999
DCC4850	773	774	Nanbro	Nanbro	10.01.1997	27.04.1999
DCC4574	278	183	Napa	Napa	17.12.1996	27.04.1999
DCC4575	301	268	Narmada	SG 6317	30.12.1996	27.04.1999
DCC4576	278	183	Nevis	Nevis	17.12.1996	27.04.1999
DCC4134	301	268	Yukon	Yukon	18.01.1996	27.04.1999

OKURKA*Cucumis sativus L.***- nakládačka:**

CCS4577	278	183	Asterix	Asterix	17.12.1996	08.03.1999
CCS4468	313	186	Duet	Duet	01.11.1996	08.03.1999
CCS4579	301	268	Pazano	SG 7028	30.12.1996	08.03.1999
CCS4789	769	768	Piccolo di Parigi	Vert petit de Paris	31.12.1996	08.03.1999
CCS4470	313	186	Sequenza	Sequenza	01.11.1996	08.03.1999

- salátová:

CCS4467	313	186	Deltastar	Deltastar	01.11.1996	04.01.1999
CCS4578	301	268	Enduro	K 2103	31.12.1996	04.01.1999
CCS4469	313	186	Hende	Hende	01.11.1996	04.01.1999
CCS4517	239		Lili	SM 3161	11.12.1996	04.01.1999
CCS4790	769	768	Lungo verde degli ortolani	Lungo verde degli ortolani	31.12.1996	02.04.1999
CCS4788	769	768	Marketmore	Marketmore	31.12.1996	04.01.1999
CCS3867	239		Paladinka	SM 7021	12.01.1996	05.02.1999
CCS4080	299	193	Suso	RS 502	18.01.1996	05.02.1999

PAPRIKA*Capsicum annuum L.*

CPA4660	256		Beros	BR-6/96	23.12.1996	04.01.1999
CPA4580	301	268	Cuby	Cuby	30.12.1996	04.01.1999
CPA4869	299	193	Kerala	RS 85047	20.01.1997	04.01.1999
CPA4699	682	140	Kraska	Kraska	27.12.1996	04.01.1999
CPA44442	313	186	Lambada	Lambada	01.11.1996	04.01.1999
CPA4760	475		Mars	OL 815 R	31.12.1996	21.05.1999
CPA4870	299	193	Mayata	MA 79252	20.01.1997	04.01.1999
CPA3620	048	193	Melody	Melody	16.01.1995	04.01.1999
CPA4700	682	140	Ozarowska	Ozarowska	27.12.1996	04.01.1999
CPA4761	475		Pluto	OL 822	31.12.1996	04.01.1999
CPA4793	769	768	Quadrato d' Asti giallo	Quadrato d' Asti giallo	31.12.1996	04.01.1999
CPA4956	769	768	Quadrato d' Asti rosso	Quadrato d' Asti rosso	31.12.1996	04.01.1999
CPA4791	769	768	Topepo rosso	Topepo rosso	31.12.1996	04.01.1999
CPA4792	769	768	Yolo Wonder	Yolo Wonder	31.12.1996	04.01.1999
CPA4443	313	186	Zafiro	Zafiro	01.11.1996	04.01.1999

PETRŽEL ZAHRADNÍ NAŤOVÁ*Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Dane*

PTC4670	763	757	Frisé vert foncé	Frisé vert foncé	17.12.1996	11.11.1998
PTC4471	313	186	Mooskrause 2	Mooskrause 2 – Verta	01.11.1996	19.02.1999

PÓR*Allium porrum L.*

ALP4880	313	186	Franse Zomer 3	Allard	15.01.1997	28.06.1999
ALP4582	301	268	Krystina	Krystina	30.12.1996	19.05.1999

RAJČE*Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.***-keříčkové (determinantní):**

LYC4796	769	768	Campbell 33	Campbell 33	31.12.1996	02.04.1999
LYC4701	682	140	Kmicic	Kmicic	27.12.1996	02.04.1999
LYC4520	140		Vilma	Pinokio	10.12.1996	02.04.1999

-tyčkové (indeterminantní):

LYC4585	301	268	Brick	F 4876	30.12.1996	05.02.1999
LYC4475	313	186	Diamina	73-18 RZ	01.11.1996	05.02.1999
LYC4502	505	183	Durasol	E 29194	03.12.1996	05.02.1999
LYC4519	140		Orkado	Pasat	10.12.1996	05.02.1999
LYC4885	140		Perun	Perun	20.01.1997	05.02.1999
LYC4476	313	186	Podeba	74-20 RZ	01.11.1996	05.02.1999
LYC4586	301	268	Raissa	Raissa	30.12.1996	05.02.1999
LYC4477	313	186	Riwi	72-35 RZ	01.11.1996	05.02.1999
LYC4474	313	186	Rougella	73-15 RZ	01.11.1996	05.02.1999
LYC4797	769	768	S. Marzano Vesuvio 2	S. Marzano Vesuvio 2	31.12.1996	05.02.1999
LYC4798	769	768	S. Pierre	S. Pierre	31.12.1996	05.02.1999
LYC4521	140		Tajfun	Tajfun	10.12.1996	05.02.1999

ŘEDKEV SETÁ ČERNÁ*Raphanus sativus L. var. niger (Mill.) S. Kerner*

RPN4587	301	268	Houseking	Houseking	30.12.1996	04.01.1999
RPN4605	239		Japana	Japana	11.12.1996	04.01.1999

ŘEDKVIČKA*Raphanus sativus L. var. radicola Pers.*

RPS4523	140		Lidka	Lidka	10.12.1996	11.11.1998
RPS5656	769	768	Rosso tondo a piccola punta bianca	Rosso tondo a piccola punta bianca	13.10.1998	23.11.1998

ŘEPA SALÁTOVÁ*Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef. Helm.*

BTO4526	140		Bona	Bona	10.12.1996	05.02.1999
BTO4806	769	768	Tonda di Chioggia	Da orto tonda di Chioggia	31.12.1996	05.02.1999

SALÁT HLÁVKOVÝ*Lactuca sativa L.*

LCS4404	505	183	Court	EY 2585	03.12.1996	23.11.1998
LCS4505	505	183	Embrace	EY 3732	03.12.1996	23.11.1998
LCS4809	769	768	Estiva di Kagran 2	Estiva di Kagran 2	31.12.1996	23.11.1998
LCS4808	769	768	La resistente	La resistente	31.12.1996	23.11.1998
LCS4507	505	183	Marillion	E 8625	03.12.1996	23.11.1998

LCS4810	769	768	Meraviglia d' inverno	Meraviglia d' inverno	31.12.1996	23.11.1998
LCS0364	056	510	Mona	Mona	17.10.1996	23.11.1998
LCS4755	320	231	Plenty	Plenty	08.01.1997	23.11.1998
LCS4807	769	768	Regina dei ghiacci	Regina dei ghiacci	31.12.1996	23.11.1998
LCS4591	301	268	Titan	S 3681	30.12.1996	23.11.1998
LCS4503	505	183	Wendel	E 4662	03.12.1996	23.11.1998

ŠPENÁT SETÝ

Spinacia oleracea L.

SPO4872	299	193	Chica	RS 900013	20.01.1997	21.10.1998
SPO4886	112	140	Fordane	LDR 941457	27.01.1997	21.10.1998
SPO4812	769	768	Gigante d' inverno	Gigante d' inverno	31.12.1996	21.10.1998
SPO4811	769	768	Riccio d' Asti	Riccio d' Asti	31.12.1996	21.10.1998

TYKEV OBEČNÁ

Cucurbita pepo L.

CBP3632	048	193	Consul	Consul	06.01.1995	27.04.1999
---------	-----	-----	--------	--------	------------	------------

TYKEV OLEJNÁ

Cucurbita pepo L. var. oleifera

CBP3774	158		Opavská	OPC-1	20.04.1995	22.03.1999
---------	-----	--	---------	-------	------------	------------

ZELÍ HLÁVKOVÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. capitata (L.) Alef.

- bílé:

BRC4813	769	768	Brunswick	Brunswick	31.12.1996	19.05.1999
BRC4592	301	268	Cantor	Cantor	30.12.1996	19.05.1999
BRC4593	278	183	Colmar	Colmar	17.12.1996	19.05.1999
BRC4814	769	768	Cuor di bue grosso	Cuor di bue grosso	31.12.1996	19.05.1999
BRC4061	708	231	Daneza Dulce	Cross 3057	08.01.1996	21.10.1998
BRC4594	278	183	Discover	Discover	17.12.1996	19.05.1999
BRC4595	278	183	Gonzales	Gonzales	17.12.1996	19.05.1999
BRC4596	278	183	Impuls	Impuls	17.12.1996	19.05.1999
BRC4478	634	186	Manama	Manama	01.11.1996	19.05.1999
BRC4479	634	186	Oklahoma	Oklahoma	01.11.1996	19.05.1999
BRC4597	278	183	Rivera	Rivera	17.12.1996	19.05.1999
BRC2652	299	193	Vestri	RS-933005	11.01.1994	19.05.1999

- červené:

BRC4599	278	183	Subaro	Subaro	17.12.1996	19.05.1999
BRC4600	278	183	Vitaro	Vitaro	17.12.1996	19.05.1999

ZELÍ PEKINGSKÉ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

BRP4501	140		Hilton	Bokal	10.12.1996	05.02.1999
BRP4601	301	268	Hopkin	Hopkin	30.12.1996	05.02.1999

OVOCNÉ DRUHY

JABLOŇ

Malus Mill.

MAL2328	578, 601, 483		Aneta	ÚEB 2269/1	09.09.1996	04.01.1999
MAL3325	483, 578		Goldstar	ÚEB 2359/1	09.09.1996	04.01.1999
MAL1519	483, 578		Hana	ÚEB 1740/5	22.01.1991	19.02.1999
MAL2783	231		Primula	Primula	04.06.1993	08.09.1999
MAL3326	578, 601, 483		Rajka	ÚEB 2269/10	26.09.1995	04.01.1999
MAL1602	935	231	Zlatava	KL-2/120-67	22.01.1991	08.03.1999

MERUŇKA

Prunus armeniaca L.

PRA1149	198		Darina	HL-1/89	12.12.1986	02.04.1999
PRA0868	287	367	Elena	D/J	12.12.1986	02.04.1999
PRA1146	198		Kompakta	HL-1/28	12.12.1986	02.04.1999
PRA1549	169		Ledana	LE-1041	06.04.1990	02.04.1999
PRA1553	169		Lejuna	LE-805	06.04.1990	02.04.1999
PRA1552	169		Leskora	LE-836	06.04.1990	02.04.1999

RYBÍZ BÍLÝ <i>Ribes niveum</i> Lindl.		Olin	Žatec 3/82	18.01.1990	02.04.1999
RIV1437	783				
RYBÍZ ČERVENÝ <i>Ribes sylvestre</i> (Lam.) Mert. et W. Koch		Trent	LS-14/8	04.01.1993	02.04.1999
RIS2347	231				
TŘEŠŇ <i>Prunus avium</i> (L.) L.		Colt	Colt	18.06.1998	02.04.1999
- podnož:					
PRV5526	601,631				

OKRASNÉ DRUHY

GLOXINIE NÁDHERNÁ <i>Sinningia speciosa</i> (Lodd.) Hiern		Mamka	HN 2/2	05.01.1995	06.03.1999
	231				
JÍŘINKA PROMĚNLIVÁ <i>Dahlia pinnata</i> Cav.					
	242	Harlekýn –	Harlekýn –	18.11.1997	27.04.1999
		A červenooranžový	A červenooranžový		
	242	Harlekýn – B žlutý	Harlekýn – B žlutý	18.11.1997	27.04.1999
	242	Harlekýn – C bílý	Harlekýn – C bílý	18.11.1997	27.04.1999
	242	Harlekýn – D bílý	Harlekýn – D bílý	18.11.1997	27.04.1999
	242	Harlekýn – F bílý	Harlekýn – F bílý	18.11.1997	27.04.1999
	242	Harlekýn – G	Harlekýn – G	18.11.1997	27.04.1999
		purpurově růžový	purpurově růžový		
	242	Harlekýn – H	Harlekýn – H	18.11.1997	27.04.1999
		karmínově růžový	karmínově růžový		
	242	Harlekýn – J	Harlekýn – J	18.11.1997	27.04.1999
		světle růžový	světle růžový		
	242	Harlekýn – K	Harlekýn – K	18.11.1997	27.04.1999
		purpurově fialový	purpurově fialový		
	242	Harlekýn – L	Harlekýn – L	18.11.1997	27.04.1999
		šarlatově červený	šarlatově červený		
	242	Harlekýn – M červený	Harlekýn – M červený	18.11.1997	27.04.1999

JMÉNA A ADRESY UDRŽOVATELŮ ODRŮD, ŽADATELŮ A ZMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

Kód:	Jméno:	Adresa:
16	S.E.S. Europe N.V./S.A.	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgie
24	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	Hohenlieth, 24363 Holtsee, SRN
25	Deutsche Saatveredelung Lippstadt- Bremen GmbH	Postfach 1407, 59524 Lippstadt, SRN
30	P. H. Petersen Saatzucht	Postfach 6, 24976 Langballig, SRN
31	F. von Lochow-Petkus GmbH	Postfach 1197, 29296 Bergen 1, SRN
32	DLF-TRIFOLIUM, Česká republika, s.r.o.	Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
33	Semundo Saatzucht GmbH	Siemensstrasse 43, 25462 Rellingen, SRN
43	SAKA-RAGIS Pflanzenzucht GbR	Postfach 130831, 20108 Hamburg, SRN
44	Kartoffelzucht Böhm KG	Postfach 1380, 21303 Lüneburg, SRN
45	Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH	Postfach 1380, 21303 Lüneburg, SRN
46	Fr. Strube Saatzucht KG Söllingen	Postfach 1353, 38358 Schöningen, SRN
48	Asgrow Seed Company	7000 Portage Road, Kalamazoo, Minesota 49001, USA
52	I.G. Pflanzenzucht GmbH	Postfach 151704, 80050 München, SRN
56	Saatzucht Quedlinburg GmbH	Postfach 13, 06472 Quedlinburg, SRN
65	Saaten Union GmbH	Postfach 5209, 30175 Hannover, SRN
68	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	Postfach 1294, 29297 Bergen, SRN
69	KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG	Postfach 1463, 37555 Einbeck, SRN
110	Danisco Seed	Højbygardvej 14, 4960 Holeby, Dánsko
112	Dachnfeldt A/S	Postbox 185, 5100 Odense C, Dánsko
115	DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling	Hojerupvej 31, 4660 Store-Heddinge, Dánsko
136	BOHEMIASEED, spol. s r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
140	MORAVOSEED spol. s r.o.	692 01 Mikulov – Mušlov

145	FORCE LIMAGRAIN, s.r.o.	Masarykovo nám. 1054, 763 12 Vizovice
147	OSEVA UNI, a.s.	Na Bílé 1231, 565 14 Choceň
151	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r.o.	Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
158	OSEVA PRO, s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
163	Výzkumný ústav rostlinné výroby	Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
169	Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, fakulta zahradnická	691 44 Lednice
171	AGROGEN, spol. s r. o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
172	SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
176	Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.	Havlíčková 2787, 767 41 Kroměříž
177	ZEAINVENT a.s.	Trstínská 1, 917 52 Trnava, Slovenská republika
180	STRUBE-DIECKMANN ČR, spol. s r.o.	Ve Starém Lobečku 9, 278 01 Kralupy nad Vltavou
183	BEJO BOHEMIA, s.r.o.	Podúlský 49, 533 45 Opatovice nad Labem
186	Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. Služby pro zemědělství	Stochovská 4, 161 00 Praha 6
193	Ing. Milan Říha, CSc.	Nuselská 42, 140 00 Praha 4
196	CEZEA – Šlechtitelská stanice, a.s.	696 14 Čejč
198	VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.	507 51 Holovousy čp. 1
201	Šlechtitelská stanice Hladké Žitovice, s.r.o.	742 47 Hladké Žitovice
202	PLANT SELECT, spol. s r.o.	Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť
209	Selekta Pacov, a.s.	Starodvorská 352, 395 01 Pacov
222	AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.	Zemědělská 16, 787 01 Šumperk
223	HYBRITECH, a.s.	Havlíčková 2787, 767 41 Kroměříž
231	SEMPRA PRAHA, a.s.	U topfren 2, 170 41 Praha 7
239	SEMO s.r.o.	798 17 Smržice 414
242	Výzkumný ústav okrasného zahradnictví Průhonice	252 43 Průhonice u Prahy
255	SAATEN – UNION CZ s.r.o.	Dubová 17, 637 00 Brno
256	SEVA-FLORA s.r.o.	Mikulovská 366, 691 42 Valtice
268	Novartis Seeds, s.r.o.	294 46 Semčice
271	Selekta, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
276	Institut za ratarstvo i povrtarstvo	M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Jugoslavie
278	Bejo Zaden B.V.	P.O.Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemsko
279	D.J. Van der Have B.V.	P.O. Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
282	AROS – osiva s.r.o.	Kubišova 1265/8, 182 00 Praha 8
287	Ing. Dušan Peter	L. Dérera 2, 831 01 Bratislava, Slovenská republika
292	Cebeco Zaden B.V.	P.O. Box 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemsko
294	Agrico Holland	P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Nizozemsko
299	Royal Sluis B.V.	P.O. Box 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
301	Novartis Seeds B.V. Vegetables & Flowers	P.O. Box 26, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
310	De Z.P.C., B.A.	P.O. Box 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemsko
311	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V.	P.O. Box 99, 8304 AS Emmeloord, Nizozemsko
313	Rijk Zwaan B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemsko
320	Nickerson Zwaan B.V.	Postbus 19, 2990 AA Barendrecht, Nizozemsko
335	Florimond Desprez	B.P. 41, 59242 Cappelle-en-Pévèle, Francie
347	Clause Semences	24, boulevard Pierre Brossolette, 91221 Brétigny sur Orge Cedex, Francie
362	LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A.	B.P. 115, 63203 Riom Cedex, Francie
367	Ing. Jindřich Fraisa	Nivy 1488, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice
372	Sharpes International Seeds Ltd.	Boston Road, Sleaford, Lincolnshire NG34 7HA, Velká Británie
374	Plant Breeding International Cambridge Ltd.	Maris Lane, Trumpington, Cambridge CB2 2LQ, Velká Británie
378	CPB Twyford Ltd.	56 Church Street, Triplow, Royston, Herts SG8 7RE, Velká Británie
427	ADVANTA B.V.	P.O. Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
444	Svalöf Weibull AB	268 81 Svalöv, Švédsko
447	Novartis Seeds AB	Box 302, 261 23 Landskrona, Švédsko
460	Südwestdeutsche Saat-zucht	Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, SRN
463	Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin Praha	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
464	NOVUM SEEDS, s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
469	MONSANTO ČR s.r.o.	Rybškova 1, 657 06 Brno
473	REPROSAM, s.r.o.	Revoluční 13, 110 00 Praha 1
475	LIBERA	Vrbka 154, 725 26 Ostrava – Krásné Pole
482	Danisco Seed Austria Ges.m.b.H., organizační složka v ČR	Pohoří 184, 518 01 Dobruška
483	PHYTOS, školařské středisko	Slovanská 138, 307 07 Plzeň
493	Pioneer Saaten GmbH, organizační složka	J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav
496	Agrico Holland – organizační složka	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7

- 497 Barenbrug Holland B.V.
498 Ing. Josef Vrabec
499 F.T.A., Francotcheque Agricole spol. s r.o.
500 SAATBAU LINZ Ceská Republika spol. s r.o.
- 505 ENZA ZADEN B.V.
510 Ing. Karel Skřivánek
519 Sativa Keřkov, a.s.
528 Saatzucht J. Breun GdB
544 TAGRO Červený Dvůr, spol. s r.o.
558 PASIČ spol. s r.o.
564 GALENA a.s.
578 Ústav experimentální botaniky AV ČR
601 SEMPRA LITOMĚŘICE s.r.o.
628 Repařský institut, spol. s r.o.
631 UNIPLANT – Šlechtění ovocných dřevin Ing. Petr Hajduček
- 634 Marner GZG Saaten AG
636 CEBECO SEEDS s.r.o.
653 Europlant Pflanzenzucht GmbH
657 Ing. Peter Kováčik
670 R.A.G.T. S.A.
671 Josef Vondrys, AGRIS-LINK
672 NICKERSON S. A. Station de Recherches
682 Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodnictwo i Szkółkarstwa
- 688 Terre de Lin
697 Novartis Seeds GmbH
708 Larsen Seeds
711 Novartis Seeds SA
716 ASGROW-France SA
717 Ing. Markéta Majorová
719 Sakata Seed Corporation
- 734 UAAS, Institute of Bast Fibres
735 IWN Poznań, Śląska SD
752 Małopolska Hodowla Buraka Pastewnego i Nasiennictwa Rolniczego w Krakowie - HBP Sp. z o.o.
753 Raps GbR, Saatzucht Lundsgaard
757 INTERSEMENTES Prague, spol. s r.o.
763 Graines Brivain
765 Saatzucht Aschersleben
768 Bohumil Nesměrák
769 A. SEMENCOOP soc. Coop. a r. l.
773 KEES BROERSEN ZADEN
774 Miroslav Hátle
777 Pioneer Hi-Breed International
- 783 Josef Hruška, ovocné školky
935 Herbaton s.r.o.
946 BOR, s.r.o.
948 Europlant šlechtitelská spol. s r.o.
950 ZELSEED s.r.o.
951 Ing. Jindřiška Skřivánková
968 NATAL BRNO a.s.
992 Nunza B.V.
1013 HUIZER CAROSEM B.V.
- Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout, Nizozemsko
Kotorská 1579/36, 140 00 Praha 4
Sadová 242, 294 41 Dobruška
Zdětín 31, 294 71 Benátky nad Jizerou
- Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
Pražská 895, 289 12 Sadská
Dobrovského 3538, 580 03 Havlíčkův Brod
Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, SRN
Červený Dvůr 112, 391 56 Tábor
Nové domky 175, 747 56 Dolní Životice
Ostravská 29, 747 70 Opava 9 – Komárov
Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 – Lysolaje
Českolipská 917/6, 412 01 Litoměřice
294 46 Semčice 69
783 34 Olomouc – Skrbeň
- Königstrasse 47, 25705 Marne, SRN
Poděvorská 755/5, 198 00 Praha 14
Postfach 1380, 21335 Lüneburg, SRN
Pod Fialkou 2734/8, 150 00 Praha 5 – Smíchov
18, rue de Séguret- Saincrie, 12033 Rodez Cedex 9, Francie
Tovární 1, 370 01 České Budějovice
5, rue de l' Egalité, 28130 Chartainvilliers, Francie
ul. Zeromskiego 3, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Polsko
- Saint Pierre le Viger, 76740 Fontaine le Dun, Francie
Postfach 3264, 32076 Bad Salzungen, SRN
Sandagervej 12, 5240 Odense NO, Dánsko
12 chemin de l' Hobit, 31790 Saint Sauveur, Francie
B.P. 80, 60304 Senlis, Francie
Boženy Němcové 752, 584 01 Ledec nad Sázavou
P.O.Box 20, Aoba, 2-7-1 Nakamachidai, Tsuzuki-Ku, Yokohama 224, Japonsko
Lenina 45, Glukhiv, 245130 Sumy Region, Ukrajina
46-381 Wojciechów, Polsko
ul. Zbożowa 4, 30- 002 Kraków, Polsko
- Lundsgaarder Weg 1, 24977 Grundhof, SRN
Modřanská 255, 143 00 Praha 4
B.P. 37, 49630 Mazé, Francie
Albert-Drosihn-Strasse 9, 06449 Aschersleben, SRN
Oblá 11, 634 00 Brno
Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena (FO), Itálie
Bogtmanweg 7, 1747 HV Tuijthorn, Nizozemsko
Sady, Solná ul. 256, 686 01 Uherské Hradiště
700 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa 50309, USA
281 01 Velim
053 02 Křčov, Slovenská republika
Na Bílé 1231, 561 01 Choceň
Západní 2, 162 01 Praha 6
Horná Potoň 16, 930 36 Horná Potoň, Slovenská republika
Pražská 895, 289 12 Sadská
Brněnská 634, 664 42 Modřice
P.O.Box 4005, 6080 AA Haelen, Nizozemsko
Postbus 2003, 2980 CA Ridderkerk, Nizozemsko

**Popisy odrůd
registrovaných podle § 11 zákona č. 92/1996 Sb. v období
od 21. srpna 1998 do 1. července 1999**

OBILNINY

JEČMEN

Hordeum vulgare L. sensu lato

- jarní

Madeira

Sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až vysoké, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním vysoká (obsahuje gen odolnosti Mlo), proti napadení rzí ječnou a hnědou skvrnitostí nižší, proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy ve všech výrobních oblastech s výjimkou kukuičnické vyšší.

Sladařská jakost výběrová (bodové hodnocení 9). Výtěžnost předního zrna vysoká.

Maridol

Sladovnická poloraná odrůda.

Rostliny nízké, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední (obsahuje nový gen odolnosti N81 La), proti napadení rzí ječnou vysoká až střední, proti napadení hnědou skvrnitostí nižší, proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí střední až nižší.

Výnosy ve výrobních oblastech bramborářské a pícninářské vyšší, ve výrobních oblastech kukuičnické, řepařské a obilnářské střední.

Sladařská jakost standardní (bodové hodnocení 5). Výtěžnost předního zrna vysoká.

Orthega

Nesladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání nižší. Zrno středně velké až velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední (obsahuje geny odolnosti Ar, We a U), proti napadení rzí ječnou vysoká až střední, proti napadení rhynchosporiovou a hnědou skvrnitostí střední.

Výnosy ve všech výrobních oblastech s výjimkou kukuičnické vysoké.

Sladařská jakost nevhodná. Výtěžnost předního zrna střední.

- ozimý

Luran

Víceřadá poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti vyzimování střední, odolnost proti poléhání střední. Zrno středně velké až velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední, proti napadení rzí ječnou vysoká až střední, proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy vysoké.

Tiffany

Sladovnická dvouřadá polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nižší, odolnost proti vyzimování střední, odolnost proti poléhání vysoká až střední. Zrno velké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním střední, proti napadení rzí ječnou střední až nižší, proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí střední.

Výnosy střední.

Sladařská jakost standardní (bodové hodnocení 6). Výtěžnost předního zrna velmi dobrá.

KUKUŘICE SETÁ

Zea mays L.

Anjou – 235

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti Z cca 240).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny nízko až středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna mezityp.

Počáteční vývoj středně rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské výrobní oblasti.

Anjou – 258

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti Z cca 270).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj středně rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské a kukuičnické výrobní oblasti.

Balada

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti Z cca 290).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený nízký až středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé až mezityp. Počáteční vývoj středně rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Celido

Čtyřliniový (Dc), raný hybrid (číslo ranosti S cca 270).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic nižší.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské výrobní oblasti.

Elita

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti S cca 240, číslo ranosti Z cca 250).

Rostliny středně vysoké, palice nasazený nízký až středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé.

Počáteční vývoj středně rychlý.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic střední, při pěstování na zrna dobré výnosy.

Určen pro pěstování na siláž v teplejších podmínkách bramborářské, v obilnářské a řepařské výrobní oblasti a na zrna v řepařské výrobní oblasti.

Havana

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti S cca 270).

Rostliny vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vysoké, podíl suché hmoty palic nižší.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Jozefina

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti Z cca 360).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený středně vysoko až vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna mezityp.

Počáteční vývoj pomalejší.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v teplejších podmínkách řepařské a v kukuřičné výrobní oblasti.

LG – 2222

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti Z cca 230).

Rostliny vysoké, palice nasazený nízký až středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské výrobní oblasti.

Marshall

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti S cca 250).

Rostliny nízké až středně vysoké, palice nasazený nízký až středně vysoko, počet řad zrn velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v obilnářské a řepařské výrobní oblasti.

Monalisa

Dvouliniový (Sc), středně pozdní hybrid (číslo ranosti Z cca 370).

Rostliny středně vysoké, palice nasazený středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna koňský zub.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v kukuřičné výrobní oblasti.

Radana

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti S cca 280, číslo ranosti Z cca 280).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj rychlý.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic střední, při pěstování na zrna vysoké výnosy.

Určen pro pěstování na siláž v řepařské výrobní oblasti a na zrna v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Rex

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti S cca 200).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty vyšší, podíl suché hmoty palic vysoký.

Určen pro pěstování na siláž v bramborářské a obilnářské výrobní oblasti.

Safrane

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti Z cca 260).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazený nízký až středně vysoko, počet řad zrn střední až velký, typ zrna tvrdé až mezityp.

Počáteční vývoj středně rychlý.

Výnosy zrna vysoké.

Určen pro pěstování na zrna v řepařské a kukuřičné výrobní oblasti.

Tereza

Čtyřlíniový (De), raný hybrid (číslo ranosti S cca 250).

Rostliny středně vysoké, palice nasazený nízko až středně vysoko, počet řad zrn střední, typ zrna tvrdé.

Výnosy celkové suché hmoty střední, podíl suché hmoty palic nižší.

Určen pro pěstování na siláž v obilnářské, bramborářské a řepařské výrobní oblasti.

OVES SETÝ

Avena sativa L.

Petra

Pluchatá, středně pozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání dobrá.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní, rzí ovesnou a padlím travním dobrá, odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí střední.

Výnosy zrna ve všech pěstitelských oblastech vysoké.

Zrno bílé, pluchatost střední, hmotnost tisíce zrn střední, technologická jakost dobrá. Dosahuje vysokých výnosů „ovesné rýže“ (obilky po vyloupání) – příznivý poměr pluchy a obilky. Vhodná pro krmné účely, nevhodná pro potravinářské účely. Výtěžnost hrubých bílkovin z jednotky plochy je srovnatelná s registrovanými odrůdami.

Revisor

Středně pluchatá, středně pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní, rzí ovesnou a padlím travním dobrá, odolnost proti napadení hnědou skvrnitostí střední.

Výnosy zrna ve všech pěstitelských oblastech vysoké.

Zrno bílé, pluchatost střední, hmotnost tisíce zrn střední. Dosahuje vysokých výnosů „ovesné rýže“ (obilky po vyloupání) – příznivý poměr pluchy a obilky. Vhodná pro potravinářské (výroba ovesných vloček) i krmné účely. Výtěžnost hrubých bílkovin z jednotky plochy je střední.

PŠENICE SETÁ

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

- ozimá

Apache

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování nižší, odolnost proti poléhání vysoká až střední. Zrno střední, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu nižší, proti napadení padlím travním v klasu vysoká až střední, proti napadení braničnatkami na listu střední, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu vysoká, proti napadení rzí pšeničnou střední.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rzí plevovou vysoká, proti napadení rzí travní nižší.

Výnos zrna ve výrobní oblasti kukuřičné vysoký, v teplejších podmínkách výrobní oblasti řepařské střední.

Pekařská jakost v kategorii B – chlebová. Objem pečiva střední, hodnota SDS testu vysoká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Corsaire

Polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování nižší, odolnost proti poléhání vysoká. Zrno velké, objemová hmotnost střední.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu i v klasu střední, proti napadení braničnatkami na listu i braničnatkou plevovou v klasu střední, proti napadení rzí pšeničnou vysoká až střední, proti napadení běloklasostí vysoká až střední.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rzí plevovou vysoká, proti napadení rzí travní nižší.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii C – nevhodná. Objem pečiva velmi nízký, hodnota SDS testu velmi nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Niagara

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování nižší, odolnost proti poléhání střední. Zrno velké, objemová hmotnost velmi vysoká.

Zdravotní stav dobrý až průměrný. Odolnost proti napadení padlím travním na listu i v klasu střední, proti napadení braničnatkami na listu nižší, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední, proti napadení rzí pšeničnou nižší.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rzí plevovou rasy 104E233 vysoká a rasy 111E142 nižší, proti napadení rzí travní střední.

Výnosy ve výrobní oblasti kukuřičné a v teplejších podmínkách výrobní oblasti řepařské střední.

Pekařská jakost v kategorii A – kvalitní. Objem pečiva vysoký, hodnota SDS testu vysoká, obsah N-látek střední, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Record

Polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti vyzimování střední, odolnost proti poléhání střední až vyšší. Zrno střední, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý až průměrný. Odolnost proti napadení padlím travním na listu střední až nižší, proti napadení padlím travním v klasu střední, proti napadení braničnatkami na listu střední až nižší, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední až vyšší, proti napadení rží pšeničnou střední až nižší, proti běloklasosti střední až vyšší.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rží plevovou vysoká, k napadení rží travní náchylná.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii C — nevhodná. Objem pečiva nízký, hodnota SDS testu velmi nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky nízká, číslo poklesu velmi vysoké.

Rialto

Pekařská polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování nižší, odolnost proti poléhání vysoká. Zrno střední, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav průměrný. Odolnost proti napadení padlím travním na listu i klasu nižší, proti napadení braničnatkami na listu nižší, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední až nižší, proti napadení rží pšeničnou střední až nižší, proti běloklasosti střední.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rží plevovou i rží travní vysoká.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii B — chlebová. Objem pečiva vysoký, hodnota SDS testu nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Semper

Polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti vyzimování a proti poléhání nižší. Zrno středně velké, objemová hmotnost velmi vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu nižší až střední, proti napadení padlím travním v klasu střední až vyšší, proti napadení braničnatkami na listu nižší až střední, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední až vyšší, proti napadení rží pšeničnou střední až vyšší, proti běloklasosti střední.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rží plevovou vysoká, k napadení rží travní náchylná.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii C — nevhodná. Objem pečiva střední, hodnota SDS testu velmi nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky střední, číslo poklesu velmi vysoké.

Sepstra

Polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny nižší, odolnost proti vyzimování a proti poléhání střední. Zrno středně velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu střední, proti napadení padlím travním v klasu střední až vyšší, proti napadení braničnatkami na listu střední, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední až vyšší, proti napadení rží pšeničnou nižší až střední, proti běloklasosti střední.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rží plevovou vysoká, k napadení rží travní náchylná.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii C — nevhodná. Objem pečiva nízký, hodnota SDS testu velmi nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky vysoká, číslo poklesu velmi vysoké.

Vlasta

Pekařská polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny nižší až středně vysoké, odolnost proti vyzimování střední, odolnost proti poléhání nižší. Zrno velké, objemová hmotnost vysoká.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení padlím travním na listu i v klasu střední až vyšší, proti napadení braničnatkami na listu střední až nižší, proti napadení braničnatkou plevovou v klasu střední až vyšší, proti napadení rží pšeničnou nižší, proti běloklasosti střední až vyšší.

Dle provokačních testů odolnost proti napadení rží plevovou vysoká, proti napadení rží travní nižší.

Výnosy ve výrobních oblastech řepařské, obilnářské a bramborářské vysoké.

Pekařská jakost v kategorii B — chlebová. Objem pečiva nízký, hodnota SDS nízká, obsah N-látek nízký, vaznost mouky vysoká, číslo poklesu velmi vysoké.

ŽITO SETÉ

Secale cereale L.

- ozimé

Ergo

Pylově sterilní analog, středně pozdní až pozdní.

Rostliny nízké, klas ojítněný, vzpřímený až nakloněný.

Odrůda je určena pouze pro pěstování ozimého žita za účelem produkce námele. Není vhodná k produkci zrna.

TRÁVY

BOJÍNEK LUČNÍ

Phleum pratense L.

Leutimo

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda lučního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a padlím travním střední až vyšší, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá.

Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

Lirocco

Hexaploidní, raná odrůda lučního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi a padlím travním střední až vyšší, proti napadení plísní sněžnou střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá.

Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

JÍLEK VYTRVALÝ

Lolium perenne L.

Anduril

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí travní střední až vyšší.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá.

Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

Barlouise

Diploidní, pozdní trávníková odrůda.

Rostliny v době metání nízké. Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávníkové plochy. Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Delaware

Diploidní, raná trávníková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listu tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou střední až vyšší a proti napadení listovými skvrnitostmi střední. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávníkové plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Figaro

Diploidní, středně pozdní až pozdní trávníková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávníkové plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Jaspis

Tetraploidní, pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení listovými skvrnitostmi a plísní sněžnou střední až vyšší.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

Litomba

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

Napoleon

Tetraploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou střední až vyšší a proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Jarní růst rychlý, po sečích hustě obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užítkového roku.

Numan

Diploidní, raná trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou střední až vyšší a proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Recolta

Diploidní, středně pozdní až pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísni sněžnou a rzí travní střední až vyšší, proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Sakini

Diploidní, středně pozdní až pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké. Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou střední až vyšší, proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Taya

Diploidní, středně pozdní až pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké. Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou střední až vyšší, proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Tivoli

Tetraploidní, pozdní až velmi pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Trani

Diploidní, pozdní až velmi pozdní odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní a plísni sněžnou střední až vyšší, proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Jarní růst středně rychlý, po sečích dobře obrůstá.

Pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Troubadour

Diploidní, středně pozdní až pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké. Barva listu středně zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

KOSTŘAVA ČERVENÁ

Festuca rubra L. sensu lato

Bargena

Pozdní až velmi pozdní výběžkatá trávnicková odrůda.

Rostliny středně vysoké, barva listu tmavě až velmi tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší.

Odolnost proti letním příušším dobrá. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do trávnickových směsí pro okrasné trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

Pernille

Středně pozdní až pozdní výběžkatá trávnicková odrůda.

Rostliny středně vysoké, barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísni sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší.

Odolnost proti letním příušším dobrá. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do trávnickových směsí pro okrasné trávníky i ostatní trávnické plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku a jemnosti listu.

KOSTŘAVA LUČNÍ *Festuca pratensis Huds.*

Lifelix

Diploidní, středně raná odrůda lučního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení listovými skvrnitostmi, rzí travní a plísní sněžnou střední až vyšší.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Limosa

Diploidní, středně raná odrůda lučního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší, proti napadení rzí travní střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Pronela

Diploidní, středně raná odrůda pastevního typu.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou a rzí travní dobrá, proti napadení listovými skvrnitostmi střední.

Jarní růst rychlý, po sečích dobře obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Stella

Diploidní, středně pozdní až pozdní odrůda lučního typu.

Rostliny v době metání polovzpřímené, výška střední.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí travní střední až vyšší.

Jarní růst rychlý, po sečích hustě obrůstá. Odrůda pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

PSINEČEK TENKÝ

Agrostis tenuis Sibth.

Vítek

Tetraploidní, středně raná trávníková odrůda.

Barva listu středně až tmavě zelená.

Zdravotní stav dobrý. Odolnost proti napadení rzí travní vysoká, proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi střední až vyšší.

Odolnost proti letním přísuškům dobrá. Zimovzdornost dobrá.

Vhodný komponent do intenzivně ošetřovaných trávníků golfových hřišť.

LUSKOVINY

HRÁCH SETÝ

Pisum sativum L.

Zekon

Poloraná odrůda typu semi-leafless.

Relativně rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké, jako Komet, porost je však v době sklizně výrazně vyšší (+20 cm). Barva květu bílá. Barva semene zelená, semeno kulovité, hmotnost tisíce semen střední, v průměru kolem 266 g.

Dobrý zdravotní stav.

Nadprůměrný výnos a zlepšená odolnost proti poléhání před sklizní, odrůda vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.

Vyšší obsah N-látek spolu s výnosem semene poskytuje vysoký výnos N-látek z hektaru. Nízká aktivita trypsin-inhibitoru. Nižší bobtnavost semen výrazně nepoškozuje ostatní technologické vlastnosti jako je vysoká stejnoměrnost a krátká doba vaření.

Gotik

Polopozdní odrůda typu semi-leafless.

Velmi rychlý počáteční růst, rostliny středně vysoké až vysoké, porost je v době sklizně výrazně vyšší než u odrůdy Komet (+23 cm). Barva květu bílá. Barva semene žlutá, semeno vejčité, hmotnost tisíce semen střední až vyšší, v průměru kolem 280 g.

Dobrý zdravotní stav kromě citlivosti na Fusarium-komplex a virózy.

Nadprůměrný výnos a zlepšená odolnost proti poléhání před sklizní, odrůda velmi vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.

Nepříznivou vlastností je vysoká aktivita trypsin-inhibitoru. Vysoký obsah N-látek. Technologické vlastnosti jsou na velmi dobré úrovni.

LUPINA PROMĚNLIVÁ (ANDSKÁ)

Lupinus mutabilis L.

Anda

Odrůda indeterminantní lupiny proměnlivé.

Barva semene bílá, bez kresby, hmotnost tisíce semen střední.

Rostlina je vysokého až velmi vysokého vzrůstu, Pavéza bílá, později růžová, se žlutým středem; člunek modrý, později až fialový, se žlutou špičkou.

Délkou vegetační doby se řadí mezi odrůdy pozdní až velmi pozdní.

Obsah hořkých látek v semenech nebyl zjišťován.

Deklarována jako náhrada za sóju na semeno v chladnějších oblastech.

JETELOVINY

JETEL LUČNÍ

Trifolium pratense L.

Dolina

Tetraploidní, středně raná odrůda.

Rostliny středně vzrůstné, odolnost proti poléhání střední až vysoká.

Zdravotní stav dobrý, odrůda projevila tendenci k vyšší odolnosti proti padlí rdesnovému.

Rychlost počátečního růstu a nižší až střední, rychlost obrůstání po sečích střední.

Pícninářská výkonnost v prvním užitkovém roce nízká, ve druhém užitkovém roce průměrná. Vyšších výnosů dosahuje v sušších podmínkách. Vytrvalost do druhého užitkového roku velmi dobrá.

JETEL PLAZIVÝ

Trifolium repens L.

Milo

Středně raná odrůda botanického typu holandicum.

Rostliny středně vysoké až vysoké, listy podle délky a šířky střední s kratšími řapíky.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení plísňemi a listovými skvrnitostmi střední až vyšší, odolnost proti napadení rakovinou jetele a virózy střední.

Rychlost počátečního růstu střední až vysoká, rychlost obrůstání po sečích vysoká.

Přítomnost rostlin s kyanogenními glykosidy v populaci malá.

Pícninářsky výnosná s dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

Rivendel

Raná až středně raná odrůda, habitem rostliny velmi blízká botanickému typu silvestris.

Rostliny nízké až středně vzrůstné, s krátkými a úzkými listy s kratšími, tenkými řapíky.

Zdravotní stav velmi dobrý, odolnost proti napadení rakovinou jetele, listovými skvrnitostmi a virózami střední až vyšší, odolnost proti plísni střední.

Rychlost počátečního růstu a obrůstání po sečích střední až vysoká.

Přítomnost rostlin s kyanogenními glykosidy v populaci malá.

Pícninářsky výnosná s velmi dobrou vytrvalostí do třetího užitkového roku.

JETEL ZVRHLÝ

Trifolium hybridum L.

Ermo

Diploidní, raná až středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední až vyšší.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení rakovinou jetele střední až vyšší, proti napadení listovými skvrnitostmi střední a proti napadení padlím rdesnovým nižší.

Rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích střední až vysoká.

Pícninářsky výnosná, vytrvalá do druhého užitkového roku.

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY

HOŘČICE BÍLÁ

Sinapis alba L.

Ascot

Středně raná odrůda.

Rostliny vyššího vzrůstu, odolnost proti poléhání střední.

Vyšší výnos zelené i suché hmoty.

Určena pouze pro letní výsevy meziplodin, zvláště na zelené hnojení, s případným pícním využitím.

KONOPI SETÉ

Cannabis sativa L.

Beniko

Jednodomá odrůda konopí setého.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení střední, délka vegetační doby střední až dlouhá.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Septoria cannabis* střední.

Výnosy stonku i podíl vlákna ve stoncích střední.

Obsah tetrahydrocannabinolu (THC) několikanásobně nižší, než je povoleno v §24, odstavce a) zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.

JUSO-11

Jednodomá odrůda konopí setého.

Rostliny středně vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení střední, délka vegetační doby střední až dlouhá.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Septoria cannabis* střední.

Výnosy stonku i podíl vlákna ve stoncích střední.

Obsah tetrahydrocannabinolu (THC) mnohonásobně nižší, než je povoleno v §24, odstavce a) zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.

LEN

Linum usitatissimum L.

- o l e j n ý:

Lola

Modrokvětá odrůda olejného lnu.

Rostliny nízké, odolnost proti poléhání vysoká, začátek kvetení pozdní, délka vegetační doby střední až dlouhá.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Fusarium* ssp. i *Phoma* ex. střední.

Výnosy semene na úrovni ostatních odrůd.

Obrácený poměr mastných kyselin linolové (obsah velmi vysoký) a linolenové (obsah velmi nízký) proti ostatním odrůdám řadí olej této odrůdy k potravinářským olejům.

- p ř a d n ý:

Diane

Modrokvětá odrůda přadného lnu.

Rostliny vysoké až velmi vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení střední až pozdní, délka vegetační doby střední až dlouhá.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Fusarium* ssp. i *Phoma* ex. střední.

Výnosy stonku nad úrovní ostatních odrůd, zvláště výnos nerozeného stonku velmi vysoký, výnosy semene pod úrovní ostatních odrůd.

Podíl vlákna ve stoncích velmi vysoký, vlákno dobré kvality. Vysoké výnosy vlákna v intenzivnějších lnářských oblastech.

Hermes

Modrokvětá odrůda přadného lnu.

Rostliny vysoké, odolnost proti poléhání střední, začátek kvetení střední až pozdní, délka vegetační doby střední až dlouhá.

Zdravotní stav dobrý, odolnost proti napadení *Fusarium* ssp. i *Phoma* ex. střední.

Výnosy stonku nad úrovní ostatních odrůd, výnosy semene pod úrovní ostatních odrůd.

Podíl vlákna ve stoncích, zvláště dlouhého, velmi vysoký, vlákno dobré kvality. Vysoké výnosy vlákna v intenzivnějších lnářských oblastech.

ŘEPKA OLEJKA

Brassica napus L. (partim)

- j a r n í

46A75

Raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů. Rostliny nižšího vzrůstu, odolnost proti poléhání střední až nižší.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Amica

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu, odolnost proti poléhání střední.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Bolero

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu, odolnost proti poléhání střední.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni vyšší, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Topscore

Raná až středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nižšího vzrůstu, odolnost proti poléhání střední.

Výnos semene vysoký.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní s mírně zvýšeným podílem kyseliny olejové.

- o z i m á

Artus

Polopozdní až pozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny vyššího vzrůstu. Odolnost proti vyzimování střední až vyšší, proti poléhání vyšší.

Výnos semene vysoký ve všech oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

MS 9501

Pozdní pylově sterilní hybridní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů, uváděná do oběhu pod názvem Betty jako sdružená odrůda, která je tvořena ze 70 % pylově sterilním komponentem MS 9501 a z 15 % odrůdou Apex a z 15 % odrůdou Magnum jako opylovači.

Rostliny vyššího vzrůstu. Odolnost proti vyzimování střední až vyšší, proti poléhání vyšší.

Výnos semene vysoký ve všech oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni střední až vyšší, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Navajo

Raná až středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny nižšího vzrůstu. Odolnost proti vyzimování a poléhání vyšší.

Výnos semene vysoký, zvláště v chladnějších oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Tenor

Polopozdní až pozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středního vzrůstu. Odolnost proti vyzimování vysoká, proti poléhání střední.

Výnos semene vysoký, zvláště v chladnějších oblastech pěstování.

Obsah oleje v semeni nižší až střední, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

SLUNEČNICE

Helianthus annuus L.

Labud

Dvouliniový (Sc) raný až středně raný hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, úbor střední až velký, v plné zralosti polopřevislý. Jazykové květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky středně velké, podlouhle vejčitého tvaru, bílé barvy. Olejnatost nízká (okolo 40 %).

Zdravotní stav dobrý, výskyt *Sclerotinia sclerotiorum* nízký, *Botrytis cinerea* střední.

Výnos nažek ve srovnání s olejnatými hybridy vyšší. Vhodný pouze do kukuřičné výrobní oblasti. Nažky určeny jako krmivo pro chované ptactvo.

Melody

Dvouliniový (Sc) raný hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, úbor středně velký, v plné zralosti převislý. Jazykové květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky malé, široce vejčitého tvaru, černé barvy s šedivým okrajovým a bočním proužkováním. Olejnatost střední.

Zdravotní stav dobrý, výskyt *Sclerotinia sclerotiorum* nízký, *Botrytis cinerea* střední.

Výnos nažek vysoký a stabilní.

Vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice.

Pixel

Tříliniový (Tc) raný hybrid

Rostliny středně vysoké, úbor středně velký, v plné zralosti polopřevislý. Jazykové květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky malé, široce vejčitého tvaru, černé barvy s fialově šedým okrajovým a bočním proužkováním. Olejnatost vysoká.

Zdravotní stav dobrý, výskyt *Sclerotinia sclerotiorum* nízký, *Botrytis cinerea* vyšší.

Výnos nažek vysoký a stabilní.

Vhodný do všech oblastí pěstování slunečnice.

OSTATNÍ KRMNÉ PLODINY**SVAZENKA VRATÍČOLISTÁ**

Phacelia tanacetifolia Benth.

Lisette

Středně raná odrůda.

Rostliny středního vzrůstu, odolnost proti poléhání střední až vyšší.

Výnos zelené i suché hmoty vyšší.

Určená pro letní výsevy meziplodin, zvláště na zelené hnojení. Případné pícní využití je možné.

OKOPANINY**BRAMBOR**

Solanum tuberosum L.

Colette

Velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ BA.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy oválné, středně velké, vzhledné, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Proti napadení houbičkou bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami a strupovitostí obecnou vyšší, proti napadení písní bramborovou střední.

Výnosy hlíz střední až nižší.

Važené hlízy z předčasných i konečných sklizní chutné, pevné, příjemně vlhké, netmavou.

Filea

Poloraná až raná odrůda pro přímý konzum, varný typ BA.

Počáteční růst natě dosti rychlý, nárůst hlíz pomalejší, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy dlouze oválné, vzhledné, středně velké, očka mělká, slupka hladká, jemná, žlutá, dužnina tmavě žlutá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor rasy 1 silně náchylná. Odolnost proti napadení virovými chorobami a strupovitostí obecnou vyšší, proti napadení plísni bramborovou střední.

Výnosy hlíz nižší.

Važené hlízy jemné struktury, příjemně vlhké, barevně stabilní. Velmi dobrá konzumní kvalita, salátový typ.

Kordoba

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem nižší až střední. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti napadení rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami a strupovitostí obecnou vyšší, proti napadení plísni bramborovou střední až nižší.

Výnosy hlíz střední až vyšší.

Važené hlízy slabě moučnaté, chutné, netmavou.

Kuras

Pozdní odrůda pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě a nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy krátce oválné, větší až velké, deformované, slupka žlutá, dužnina bílá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami, plísni bramborovou a strupovitostí obecnou střední až vyšší.

Výnosy hlíz vysoké, škrobnatost vysoká.

Nika

Polopozdní odrůda pro zpracování na smažené výrobky a pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy oválné, větší, deformované, slupka žlutá, dužnina světle žlutá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami, plísni bramborovou a strupovitostí obecnou střední až vyšší.

Výnosy hlíz vysoké, škrobnatost vyšší.

Velmi dobrá kvalita hranolků.

Provento

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B-BC.

Počáteční růst natě a nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem střední. Hlízy kulovité, středně velké až větší, očka středně hluboká až mělká, slupka žlutá, dužnina světle žlutá.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti napadení rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami, plísni bramborovou a strupovitostí obecnou střední.

Výnosy hlíz vyšší.

Važené hlízy slabě moučnaté, středně tmavou.

Samanta

Polopozdní odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě dosti rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem vyšší až vysoký. Hlízy kulovité, středně velké, očka dosti mělká, slupka hladká, žlutá, dužnina žlutá.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, k napadení rakovinou brambor rasy 1 silně náchylná. Odolnost proti virovým chorobám, plísni bramborové a strupovitostí obecně vyšší.

Výnosy hlíz vysoké.

Važené hlízy slabě moučnaté, chutné, stabilní zbarvení.

Satina

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ CB.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy krátce oválné, větší, očka středně hluboká až mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami střední až vyšší, proti napadení plísni bramborovou střední, proti napadení strupovitostí obecnou vysoká.

Výnosy hlíz středně vysoké.

Važené hlízy slabě moučnaté, středně tmavou.

Sibu

Pozdní odrůda pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě rychlý, nárůst hlíz středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy krátce oválné, větší, deformované, slupka žlutá, dužnina bílá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 rezistentní, k napadení rakovinou brambor rasy 1 silně náchylná. Odolnost proti napadení virovými chorobami a plísni bramborovou vyšší, proti napadení strupovitostí obecnou střední až vyšší.

Výnosy hlíz vysoké, škrobnatost vysoká.

Velox

Velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy oválné, středně velké až větší, vyrovnané velikostí, vzhledné, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami a plísní bramborovou střední, proti napadení strupovitostí obecnou vysoká.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech sklizní vyšší, při konečné sklizni nižší až střední. Vhodná pro pěstování v ranobramborářské oblasti. Vařené hlízy při předčasných sklizních dosti pevné, příjemně vlhké.

Vineta

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B-BC.

Počáteční růst natě velmi rychlý, nárůst hlíz rychlý, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka středně hluboká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami a strupovitostí obecnou vyšší, proti napadení plísní bramborovou střední až nižší.

Výnosy hlíz vyšší.

Vařené hlízy slabě moučnaté, stabilita zbarvení kolísá.

Vivaldi

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě dosti rychlý, nárůst hlíz pomalejší, počet hlíz pod trsem nižší. Hlízy oválné, středně velké až větší, očka mělká, slupka hladká, žlutá, dužnina světle žlutá.

K napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 náchylná, proti napadení rakovinou brambor rasy 1 rezistentní. Odolnost proti napadení virovými chorobami, plísní bramborovou a strupovitostí obecnou střední.

Výnosy hlíz vyšší.

Vařené hlízy méně pevné, slabě moučnaté, slabě vlhké, stabilita zbarvení vysoká.

CUKROVKA

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

- odrůdy klasického typu:

Arosa

Triploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen kónický, středně dlouhý, rýha mělká rovná. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vyběhání vysoká, odolnost proti napadení cerkosporou střední, proti napadení padlím vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády střední až vysoké, výtěžnost vysoká.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až střední.

Bristol

Triploidní odrůda normálního typu.

Kořen dlouhý kónický, rýha spirálovitá, mělká až rozptýlená. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vyběhání vysoká, proti napadení cerkosporou střední a proti napadení padlím střední až vysoká.

Výnos kořene, cukernatost a výnos polarizačního cukru střední, výtěžnost a výnos rafinády střední až vysoké.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku střední až vysoký.

Dialog

Triploidní odrůda normálního až cukernatého typu.

Kořen kuželovitý kónický, rýha mělká rovná, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vyběhání vysoká, proti napadení cerkosporou střední, proti napadení padlím střední až vysoká.

Výnos kořene nízký až střední, cukernatost a výnos rafinády střední až vysoké, výnos polarizačního cukru střední, výtěžnost vysoká.

Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku střední.

Euro

Triploidní odrůda cukernatého typu.

Kořen klínovitý, rýha středně hluboká, rovná, povrch hladký. Sklizeň raná až středně raná.

Odolnost proti vyběhání vysoká, proti napadení padlím rovněž vysoká, proti napadení cerkosporou střední až vysoká.

Výnos kořene střední, cukernatost a výnos rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru střední až vysoký, výtěžnost vysoká až velmi vysoká.

Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Granada

Triploidní odrůda normálního typu.

Kořen klínovitý, rýha mělká spirálovitá, povrch hladký. Sklizeň ranější.

Odolnost proti vyběhání vysoká, proti napadení padlím střední až vysoká, proti napadení cerkosporou střední.

Výnos kořene a polarizačního cukru střední až vysoký, cukernatost a výtěžnost střední, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až střední.

Loretta

Triploidní odrůda normálního typu.

Kořen klínovitý, rýha mělká spirálovitá, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Odolnost proti vybíhání vysoká, proti napadení padlím rovněž vysoká a proti napadení cercosporou střední.

Výnos kořene a rafinády střední až vysoký, cukernatost, výnos polarizačního cukru a výtěžnost střední.

Obsah popelovin střední, obsah škodlivého dusíku vysoký.

- odrůdy tolerantní k rizománii:

Capri

Diploidní odrůda normálního typu tolerantní k rizománii.

Kořen kónický, rýha mělká, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene, cukernatost a výnos polarizačního cukru střední, výtěžnost a výnos rafinády střední až vysoké.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku velmi nízký.

Grand

Diploidní odrůda normálního až cukernatého typu tolerantní k rizománii.

Kořen kuželovitý, rýha středně hluboká, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene nízký až střední, cukernatost a výtěžnost rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru a rafinády střední až vysoké.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký a škodlivého dusíku střední až nízký.

Patricia

Diploidní odrůda normálního typu tolerantní k rizománii.

Kořen kónický, rýha mělká spirálovitá, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene a polarizačního cukru vysoké, cukernatost a výtěžnost rafinády střední, výnos rafinády vysoký až velmi vysoký.

Obsah popelovin nízký až střední, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Porto

Diploidní odrůda normálního typu tolerantní k rizománii a cercospoře.

Kořen kónický, rýha středně hluboká, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády velmi vysoké, cukernatost střední, výtěžnost rafinády střední až vysoká.

Obsah popelovin a škodlivého dusíku nízké až velmi nízké.

Rimini

Diploidní odrůda normálního až cukernatého typu tolerantní k rizománii.

Kořen kónický, rýha mělká, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene, cukernatost a výtěžnost rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády vysoké až velmi vysoké.

Obsah popelovin střední, obsah škodlivého dusíku vysoký až velmi vysoký.

Riposte

Diploidní odrůda normálního až cukernatého typu tolerantní k rizománii.

Kořen kónický, rýha mělká, povrch hladký. Sklizeň středně raná.

Výnos kořene a výnos polarizačního cukru vysoké až velmi vysoké, cukernatost střední až vyšší, výtěžnost rafinády vysoká, výnos rafinády velmi vysoký.

Obsah popelovin nízký až střední, obsah škodlivého dusíku vysoký.

ŘEPA KRMNÁ

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

Jauma

Triploidní odrůda obsahového typu.

Bulva klínovitá, menší, barva žlutá, hlava hnědozelená. Usazení v půdě hluboké, vhodnost k mechanizované sklizni.

Výnos bulev nízký, obsah refraktometrické sušiny a výnos refraktometrické i celkové sušiny velmi vysoké, obsah celkové sušiny vysoký až velmi vysoký.

Mars Poly

Polyploidní odrůda přechodného typu.

Tvar bulvy olivovitý, barva bulvy karmínově červená, hlava hnědočervená. Dobývateľnost středně těžká.

Výnos bulev střední, obsah refraktometrické sušiny střední až vysoký, výnos refraktometrické sušiny a obsah celkové sušiny vysoké, výnos celkové sušiny vysoký až velmi vysoký.

Solidar

Diploidní odrůda objemového typu.

Bulva válcovitá, barva žlutooranžová, hlava hnědozelená. Dobývateľnost velmi snadná.

Výnos bulev vysoký až velmi vysoký, obsah refraktometrické sušiny nízký až velmi nízký, výnos refraktometrické sušiny střední až vyšší, obsah celkové sušiny nízký, výnos celkové sušiny vysoký.

ZELENINY

BROKOLICE

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

Arcadia

Polopozdní hybrid.

Rostliny vysoké, převážně s jedním a jen ojediněle s více stonky. Listy středně šedo zelené středně ojínné. Růžice středně velká, pevná, tmavě šedo zelená, příčně eliptického tvaru s krátkým až středním větvením na bázi, jemnou až střední hrboovitostí a jemnou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic středně vysoký.

Odolnost proti vyběhání do květu vysoká, dlouho si ponechává dobrou kvalitu růžice.

Fiesta

Polopozdní hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, převážně s jedním a jen ojediněle s více stonky. Listy tmavě modrozelené, středně ojínné. Růžice středně velká, pevná, středně šedo zelená, příčně široce eliptického tvaru se středním větvením na bázi s jemnou hrboovitostí a střední zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic nízký.

Odolnost proti vyběhání do květu vysoká, dlouho si ponechává dobrou kvalitu růžice.

Montvy

Poloraný hybrid.

Rostliny středně vysoké až vysoké, převážně s jedním stonkem. Listy středně šedo zelené, středně silně až silně ojínné. Růžice středně velká až velká, středně pevná až pevná, středně šedo zelená, příčně eliptického až široce eliptického tvaru s dlouhým větvením na bázi, s jemnou hrboovitostí a střední zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic nízký.

Odolnost proti vyběhání do květu středně vysoká až vysoká.

Murcia

Pozdní hybrid.

Rostliny vysoké, převážně s jedním stonkem a jen ojediněle s více stonky. Listy světle až středně šedo zelené, středně ojínné. Růžice středně velká, pevná, středně šedo zelená, příčně eliptického až široce eliptického tvaru s krátkým až středním větvením na bázi, střední hrboovitostí a střední zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic středně vysoký.

Odolnost proti vyběhání do květu vysoká, dlouho si ponechává dobrou kvalitu růžice.

Ramoso calabrese medio precoce

Poloraná odrůda.

Rostliny vysoké až velmi vysoké, převážně s více stonky. Listy středně až tmavě zelené s šedým nádechem, silným ojínním a dlouhým řapíkem. Růžice středně velká, řídká, středně zelená, příčně eliptického tvaru s dlouhým větvením na bázi, hrubou hrboovitostí a zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic je vysoký.

Odolnost proti vyběhání do květu středně vysoká až vysoká. Po dosažení sklizňové zralosti nelze ponechávat na poli.

CELER BULVOVÝ

Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

Luna

Raná odrůda. Původně vyšlechtěna jako hybridní, avšak její hybridnost byla nízká. Určena pro přímou spotřebu, sušení, průmyslové zpracování a dlouhodobé skladování.

Rostliny středně vysoké se vzpřímenou až polovzpřímenou, středně až tmavě zelenou natí. Bulva středně velká až velká se středně vysoko nasazenými, tenkými až středně silnými kořeny. Povrch bulvy slabě až středně hrbovitý. Hlava jen nepatrně zelená. Dužnina bílá, kompaktní a stálá i po uvaření.

Odolnost proti septorióze v polních podmínkách střední až vysoká.

CIBULE

Allium cepa L.

- jarní

Boretana

Polopozdní až pozdní nehybridní odrůda.

Listy polovzpřímené, středně zelené, středně až silně ojínné. Cibule středně velká až velká, silně ploše kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní žlutá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní slabá, dužnina bílá, středně pevná až pevná.

Obsah sušiny středně vysoký až vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá — doporučená doba vyskladnění prosinec až leden.

Boston

Polopozdní až pozdní hybrid.

Listy polovzpřímené, středně zelené, středně až silně ojínné. Cibule středně velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se světle hnědým okrovým odstínem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny středně vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá až dlouhodobá — doporučená doba vyskladnění únor.

Brahma

Raný až polopozdní hybrid.

Listy vzpřímené, středně zelené, slabě ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se středně hnědým okrovým odstínem, přiléhavost sukní slabá až střední, dužnina bílá, středně pevná až pevná.

Obsah sušiny nízký až středně vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu krátkodobá — doporučená doba vyskladnění listopad až prosinec.

Laura

Polopozdní až pozdní hybrid.

Listy polovzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se středně hnědým okrovým odstínem, přiléhavost sukní slabá až střední, dužnina bílá, pevná, zbarvení pokožky vnitřních sukní nazelenalé.

Obsah sušiny středně vysoký až vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu dlouhodobá — doporučená doba vyskladnění březen až duben.

Lena

Raný hybrid.

Listy vzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá s bronzovým odstínem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, středně pevná až pevná, zbarvení pokožky vnitřních sukní nazelenalé.

Obsah sušiny nízký až středně vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá — doporučená doba vyskladnění leden.

Rocky

Poloraná až pozdní nehybridní odrůda.

Listy polovzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní žlutá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, pevná.

Obsah sušiny středně vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá — doporučená doba vyskladnění leden.

Samba

Raný až poloraný hybrid.

Listy polovzpřímené, tmavě zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá s bronzovým odstínem, přiléhavost sukní střední až silná, dužnina bílá, středně pevná až pevná.

Obsah sušiny nízký až středně vysoký.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu krátce až střednědobá — doporučená doba vyskladnění prosinec až leden.

Tropea rossa tonda

Poloraná nehybridní odrůda.

Listy vzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, široce vejčitého tvaru, základní barva horních suchých sukní červená s hnědočerveným odstínem, přiléhavost sukní slabá, pevnost dužniny slabá, barva nafialovělá.

Obsah sušiny velmi nízký až nízký.

Odrůda je neskladovatelná, je vhodná pro přímý konzum maximálně do dvou měsíců po sklizni.

Vernina di Firenze

Poloraná až pozdní nehybridní odrůda.

Listy polovzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, široce opakvejčitého tvaru, základní barva horních suchých sukní červená se světle červeným odstínem, přiléhavost sukní slabá až střední, pevnost dužniny slabá, barva nafialovělá.

Obsah sušiny nízký.

Odrůda je neskladovatelná, je vhodná pro přímý konzum maximálně do dvou měsíců po sklizni.

- ozimá

Arctic

Raný hybrid.

Listy vzpřímené, krátké, tmavě zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, základní barva horních suchých sukní hnědá se světle hnědožlutým odstínem, přiléhavost sukní střední, pevnost dužniny střední až silná.

Přezimování velmi dobré, odolnost proti vyběhání do květu vysoká.

Obsah sušiny velmi nízký až nízký. Odrůda je vhodná pro sklizeň čerstvé cibule s natí. Pro přímý konzum suchých cibulí se doporučuje spotřeba maximálně do dvou měsíců po sklizni.

ČESNEK KUCHYŇSKÝ

Allium sativum L.

Mojmír

Poloraný ozimý nepalčák.

Listy polovzpřímené, slabě převislé, dlouhé, středně až tmavě zelené, středně ojínné. Cibule velká, kuželovitěho tvaru s výskytem bočních stroužků, horní suché suknice smetanově bílé s řídkými fialovými skvrnami. Uspořádání stroužků v cibuli nepravidelné. Počet vnitřních stroužků střední, vnějších střední až vysoký, stroužek velký, polokruhovitěho tvaru, světle hnědý s fialovými skvrnami.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá — doporučená doba vyskladnění únor až březen.

Tantal

Pozdní ozimý paličák.

Listy vzpřímené, středně dlouhé, modrozelené, silně ojínné, květní stvol krátký až středně dlouhý, počet velkých pacibulek nízký. Cibule velká, ploše kulovitého tvaru bez bočních stroužků, horní suché suknice smetanově bílé s řídkými fialovými skvrnami. Uspořádání stroužků v cibuli pravidelné. Vnitřní stroužky jen ojediněle, počet vnějších stroužků střední, stroužek velký, polokruhovitěho tvaru, světle až středně hnědý s fialovými skvrnami.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu středně až dlouhodobá — doporučená doba vyskladnění březen až duben.

Odrůda je ozdravena od viru žluté mozaiky cibule (OYDV) kultivací apikálních meristémů in vitro a následnou selekcí viruprostých rostlin. Předpokladem zachování dobrého zdravotního stavu porostů je každoroční používání certifikovaného rozmnožovacího materiálu.

Tristan

Pozdní ozimý paličák.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené, středně až silně ojínné, květní stvol středně dlouhý, počet středně velkých až velkých pacibulek nízký. Cibule velká až velmi velká, plošekulovitěho tvaru bez bočních stroužků, horní suché suknice bílé s řídkými fialovými skvrnami. Uspořádání stroužků v cibuli pravidelné, počet vnitřních stroužků nízký, počet vnějších stroužků střední až vysoký, stroužek velký, polokruhovitěho tvaru, světle až středně hnědý s fialovými skvrnami.

Skladovatelnost v přirozených podmínkách v neklimatizovaném skladu střednědobá — doporučená doba vyskladnění leden až únor.

Odrůda je ozdravena od viru žluté mozaiky cibule (OYDV) kultivací apikálních meristémů in vitro a následnou selekcí viruprostých rostlin. Předpokladem zachování dobrého zdravotního stavu porostů je každoroční používání certifikovaného rozmnožovacího materiálu.

FAZOL OBEČNÝ

Phaseolus vulgaris L.

- k e ř í č k o v ý:

Aldagold

Raná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy světle zelené, květy umístěny nad listy. Lusk v technologické zralosti světle až středně žlutý, slabě zakřivený, krátký až středně dlouhý, středně široký, na průřezu kruhovitý, na povrchu hladký až středně drsný, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, hmotnost tisíce semen nízká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu nebo konzervování lusků v technologické zralosti.

Artolan

Poloraná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy tmavě zelené, květy umístěny nad listy. Lusk v technologické zralosti středně až tmavě zelený, slabě zakřivený, krátký až středně dlouhý, úzký, na průřezu kruhovitý, na povrchu hladký, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, slabě až středně žilkované, hmotnost tisíce semen nízká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu nebo konzervování lusků v technologické zralosti.

Bobis nano

Poloraná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy světle zelené, květy umístěny mezi listy. Lusk v technologické zralosti světle zelený, slabě zakřivený, středně dlouhý, středně široký až široký, na průřezu elipsovitého, na povrchu středně drsný, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, středně až silně žilkované, hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu.

Freor

Poloraná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy světle až středně zelené, květy umístěny částečně v listech. Lusk v technologické zralosti světle až středně žlutý, slabě zakřivený, dlouhý, středně široký, na průřezu kruhovitý, na povrchu hladký až středně drsný, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, silně žilkované, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu nebo konzervování lusků v technologické zralosti.

Goldfish

Raná až poloraná odrůda.

Rostlina nízká, bez úponků, listy středně zelené, květy umístěny nad listy. Lusk v technologické zralosti středně žlutý, slabě zakřivený, středně dlouhý, středně široký, na průřezu kruhovitý, na povrchu hladký až středně drsný, bez vlákna a pergamenu. Semeno bílé, středně žilkované, hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu nebo konzervování lusků v technologické zralosti.

Lilana

Raná až poloraná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy světle zelené, růžové květy umístěny částečně v olistění. Lusk v technologické zralosti světle žlutý, rovný, dlouhý, široký, na průřezu elipsovitého, na povrchu hladký až středně drsný, bez vlákna a pergamenu. Semeno dvoubarevné — světle hnědé s fialovými skvrnami, hmotnost tisíce semen vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu lusků v technologické zralosti nebo semen v polozralém stavu. Pro konzervování není vhodná, neboť barevná semena mohou způsobit zabarvení nálevu.

Melinda

Raná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy světle až středně zelené, růžové květy umístěny částečně v olistění. Lusk v technologické zralosti světle žlutý, rovný, středně dlouhý, široký, na průřezu elipsovité až vejčité, na povrchu hladký, bez pergamentu s ojedinělým výskytem vláknů. Semeno hnědožluté, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu lusků v technologické zralosti.

Nigrona

Poloraná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy středně až tmavě zelené, fialové květy umístěny částečně v olistění. Lusk v technologické zralosti světle žlutý, slabě zakřivený, středně dlouhý až dlouhý, středně široký, na průřezu elipsovité, na povrchu středně drsný, bez vláknů a pergamentu. Semeno černé, hmotnost tisíce semen středně vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu lusků v technologické zralosti nebo semen v polozralém stavu. Pro konzervování není vhodná, neboť barevná semena mohou způsobit zabarvení nálevu.

Provider

Raná odrůda.

Rostlina středně vysoká, bez úponků, listy středně zelené, fialové květy umístěny částečně v olistění. Lusk v technologické zralosti středně, slabě zakřivený, středně dlouhý až dlouhý, středně široký až široký, na průřezu kruhovitý, na povrchu středně drsný, bez vláknů a pergamentu. Semeno fialové, hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká.

Odrůda je vhodná pro přímou kuchyňskou úpravu lusků v technologické zralosti nebo semen v polozralém stavu. Pro konzervování není vhodná, neboť barevná semena mohou způsobit zabarvení nálevu.

- p n o u c í:

Borlotto lingua fuoco 3

Poloraná odrůda.

Ideterminantní rostlina s rychlým ověřením úponků, listy světle až středně zelené, květy růžové. Lusk středně zelený s červeným žháním, středně zakřivený, krátký až středně dlouhý, široký, na průřezu elipsovité, na povrchu středně drsný, s vláknem. Semeno dvoubarevné — hnědožluté s červenými skvrnkami, hmotnost tisíce semen vysoká až velmi vysoká.

Vzhledem k přítomnosti vláknů v lusu není vhodná pro úpravu celých lusků, ale pouze semen v polozralém nebo suchém stavu

HRÁCH DŘEŇOVÝ

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. emend C.O. Lehm.

Balmoral

Poloraná odrůda.

Lodyha krátká až středně dlouhá, barva olistění modrozelená. Lusk slabě prohnutý, krátký až středně dlouhý, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, středně velké (50% zrno v kategorii 9-10 mm), velikostně vyrovnané. Barva děloh semene zelená, hmotnost tisíce semen nízká.

Odrůda je vhodná pro přímý konzum i průmyslové zpracování.

Jaguar

Raná odrůda.

Lodyha krátká. Lusk rovný až slabě prohnutý, středně dlouhý, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, velké (53% zrno v kategorii 9-10 mm, 25% v kategorii nad 10 mm). Barva děloh semene zelená, hmotnost tisíce semen nízká až střední.

Odrůda je vhodná pro přímý konzum i průmyslové zpracování.

Meraviglia d'Italia (synonymum Feltham First)

Raná odrůda.

Lodyha velmi krátká, barva olistění žlutozelená. Lusk slabě prohnutý, středně dlouhý až dlouhý, široký, špičatě zakončený. Zrno v technologické zralosti světle až středně zelené, středně velké (45% zrno v kategorii 8-9 mm, 47% zrno v kategorii 9-10 mm), nahořklé chuti. Semeno hladké s jednoduchými škrobovými zrny, barva děloh zelená. Hmotnost tisíce semen velmi vysoká.

Odrůda je náchylná k napadení virózy.

Polo

polopozdní až pozdní odrůda.

Lodyha středně dlouhá až dlouhá, olistění modrozelené. Lusk slabě prohnutý, krátký, úzký, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti středně zelené, malé až středně velké, (20% zrno v kategorii 7-8 mm, 50% zrno v kategorii 8-9 mm, 26% v kategorii 9-10 mm). Barva děloh semene zelená, hmotnost tisíce semen nízká.

Odrůda je vhodná pro průmyslové zpracování.

Sancho

Poloraná odrůda. s redukovanou listovou plochou (semi-leafless typ).

Lodyha krátká až středně dlouhá, barva olistění a úponků modrozelená. Lusk rovný až slabě až středně prohnutý, krátký, úzký, tupě zakončený. Zrno v technologické zralosti tmavě zelené, malé (12% zrno v kategorii 6-7 mm, 31% zrno v kategorii 7-8 mm, 45% v kategorii 8-9 mm). Barva děloh semene zelená, hmotnost tisíce semen velmi nízká až nízká.

Odrůda je vhodná pro průmyslové zpracování.

KAPUSTA HLÁVKOVÁ

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *sabauda* L.

Impósa

Velmi pozdní hybrid pro přímou spotřebu a dlouhodobé skladování.

Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně zkadeřené, silně ojínné, modrozelené s šedým nádechem. Hlávky středně velké, pevné, středně husté, okrouhlého tvaru, tmavě šedozelené, uvnitř se žlutavým zbarvením a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení rostlin vysoká.

Premius

Velmi raná hybridní odrůda pro přímou spotřebu. Vhodná i pro přirychlování.

Rostliny nízké s krátkým vnějším košťálem. Listy středně až silně zkadeřené, středně ojínné, zelené. Hlávky malé, středně pevné a středně husté, okrouhlé, světle až středně zelené, uvnitř se žlutavým a po obvodě zelenavým zbarvením a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení rostlin vysoká.

Rigoletto

Velmi pozdní hybrid pro přímou spotřebu a dlouhodobé skladování

Rostliny vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně zkadeřené, silně ojínné, šedozelené. Hlávky středně velké až velké, pevné, středně husté až husté, příčně eliptického tvaru, středně až tmavě zelené, uvnitř se žlutavým zbarvením a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení rostlin vysoká.

Salarite

Raná odrůda, vzniklá křížením hlávkové kapusty a bílého zelí, určená pro přímou spotřebu. Rostliny nízké s krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, slabě zkadeřené, středně až silně ojínné, středně zelené. Hlávky malé až středně velké, středně pevné až pevné, středně husté až husté, široce vejčitého až okrouhlého tvaru, světle žlutozelené, uvnitř se žlutavým zbarvením a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek střední a proti vyvracení rostlin vysoká.

KAPUSTA RŮŽIČKOVÁ

Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC.

Helemus

Polopozdní hybrid ke sklizni od října do listopadu.

Rostliny vysoké se středně až tmavě modrozelenými listy s šedým nádechem. Řapky vodorovné. Listy na podzim jen pozvolna opadávají. Růžičky malé až středně velké, středně zelené, široce vejčitého tvaru s hladkým povrchem a dobrým uzavřením.

Odolnost proti vyvracení a poléhání rostlin vysoká.

Mezzo nano

Polopozdní odrůda ke sklizni od října do prosince.

Rostliny vysoké s tmavě modrozelenými listy. Řapky vodorovné až převislé. Listy na podzim jen pozvolna opadávají. Růžičky malé, středně zelené, okrouhlého až široce vejčitého tvaru s hladkým povrchem a dobrým uzavřením. Odrůda je méně vyrovnaná ve výšce rostlin.

Odolnost proti vyvracení a poléhání rostlin velmi vysoká.

KEDLUBEN

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.

Cindy

Bílý raný hybrid pro rychlení a jarní nebo podzimní pěstování ve volné půdě. Vhodný i pro přirychlování pod fólií.

Rostliny středně vysoké se středně velkými, středně až silně ojínnými listy a středně dlouhými, tenkými až středně silnými řapky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou bez ligninových vláken.

Odolnost proti dřevnatění bulev a vybíhání do květu vysoká, proti praskání středně vysoká až vysoká.

Di Vienna bianco

Bílá poloraná odrůda pro jarní a podzimní pěstování ve volné půdě.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně velkými až velkými, slabě až středně ojínnými listy a středně dlouhými, silnými řapky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou a jen s ojedinělými ligninovými vlákny.

Odolnost proti dřevnatění a praskání bulev středně vysoká až vysoká, proti vybíhání do květu vysoká.

Kolibri

Modrý poloraný hybrid pro jarní, případně letní až podzimní pěstování ve volné půdě.

Rostliny středně vysoké až vysoké se středně velkými až velkými, středně ojínnými listy a středně dlouhými až dlouhými, středně silnými řapky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní dužninou a jen s ojedinělými ligninovými vlákny.

Odolnost proti dřevnatění, praskání bulev středně vysoká až vysoká a proti vybíhání do květu vysoká.

Lahn

Bílý raný hybrid pro jarní a letní pěstování ve volné půdě.

Rostliny středně vysoké se středně velkými až velkými, středně ojínnými listy a středně dlouhými, středně silnými řapky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní dužninou a jen s ojedinělými ligninovými vlákny.

Odolnost proti dřevnatění, praskání bulev středně vysoká až vysoká a proti vybíhání do květu vysoká.

Modrava

Modrý raný hybrid pro rychlení a jarní nebo podzimní pěstování ve volné půdě.

Rostliny nízké až středně vysoké se středně velkými, středně ojíňenými listy a středně dlouhými, středně silnými řapíky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní dužninou a jen s ojedinělými ligninovými vlákny.

Odolnost proti dřevnatění, praskání bulev středně vysoká až vysoká a proti vybíhání do květu vysoká.

KVĚTÁK

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

Amsterdam

Poloraný hybrid pro raně podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, středně šedo zelené barvy, středně ojíňené a středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bílá, jemně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Barbason

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně šedo zelené barvy, středně až silně ojíňené a středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, jemně až středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Beta

Velmi raná odrůda pro rychlení a nejranější polní pěstování.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy malé až středně velké, polovzpřímené, středně zelené barvy, slabě až středně ojíňené a slabě bublinaté. Růžice částečně krytá, středně velká, příčně eliptická, slabě až středně klenutá, středně pevná až pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.

Odolná proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Cortes

Poloraný hybrid pro pozdně letní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, tmavě až středně šedo zelené, středně ojíňené a středně bublinaté. Růžice dobře krytá, velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bílá, hrubě hrbolovitá a středně zrnitá.

Vysoce odolný proti mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice. Při přezrávání má sklon k fialovění.

Delta

Poloraná odrůda pro letní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, polovzpřímené, středně šedo zelené, slabě ojíňené, slabě až středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavé barvy s odstínem slonové kosti, středně až silně hrbolovitá a středně zrnitá.

Vysoce odolná proti fialovění, prorůstání i žloutnutí růžice. Ojediněle slabě mechovatí.

Escale

Polopozdní hybrid pro sklizně v časném létě nebo na podzim.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené, středně šedo zelené s modrozeleným nádechem, středně ojíňené a středně až silně bublinaté. Růžice velmi dobře krytá, středně velká, příčně široce eliptická, silně klenutá, pevná, bílá, jemně hrbolovitá a jemně zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Floriade

Raná odrůda pro časně letní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké, polovzpřímené, středně šedo zelené, silně ojíňené a slabě bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká až velká, příčně eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně až hrubě hrbolovitá a středně zrnitá.

Vysoce odolná proti fialovění, prorůstání i žloutnutí růžice. Ojediněle slabě mechovatí. Citlivá k vyslepnutí.

Kimball

Polopozdní hybrid pro pozdně letní a podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené s šedým nádechem, středně ojíňené a slabě až středně bublinaté. Růžice velmi dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, prorůstání i žloutnutí růžice. Ojediněle slabě mechovatí.

Kintore

Poloraný hybrid s univerzálním pěstitelským využitím od jara až do podzimu.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené s šedým nádechem, středně ojíňené a středně bublinaté. Růžice velmi dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bílá, středně hrbolovitá a jemně zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, prorůstání i žloutnutí růžice. Ojediněle slabě mechovatí. Citlivý na výskyt hnědé bakteriální hniloby.

Roxford

Polopozdní hybrid pro letní až podzimní sklizeň.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně šedo zelené, středně až silně ojínné a středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a středně až jemně zrnitá. Vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Thalassa

Polopozdní hybrid pro letní a zejména podzimní sklizeň.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené, středně modrozelené, středně až silně ojínné a silně bublinaté. Růžice velmi dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bílá, jemně až středně hrbolovitá i zrnitá.

Vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

Virgin

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizeň.

Rostliny středně vysoké. Listy středně velké až velké, polovzpřímené středně modrozelené s šedým nádechem, silně ojínné a silně bublinaté. Růžice dobře krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bílá, jemně až středně hrbolovitá i jemně zrnitá.

Vitální, vysoce odolný proti fialovění, mechovatění, prorůstání i žloutnutí růžice.

MANGOLD

Beta vulgaris L. var. vulgaris

Verde a costa bianca 3

Odrůda řapíkatého mangoldu.

Rostlina středně vysoká až vysoká. Listy vzpřímené, tmavě zelené, hladké a lesklé. Řapíky bílé, široké 5 – 7,5 cm. První sklizeň listů za 96 – 110 dní po výsevu. Za dlouhého dne pravidelně část rostlin (do 20 %) předčasně vyběhá do květu, proto se doporučuje výsev až po 10. červnu.

MELOUN VODNÍ

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai

Charleston Gray

Pozdní nehybridní diploidní odrůda.

Hmotnost plodu vysoká, tvar cylindrický, zbarvení pokožky bílé až nazelenalé s intenzivním mramorováním, vnitřní dužnina pevná, středně až tmavě nachová, vnější vrstva dužniny silná, semena hnědá velká, počet semen vysoký.

Sugar Baby

Raná nehybridní diploidní odrůda.

Hmotnost plodu středně vysoká, tvar kulovitý, zbarvení pokožky tmavě zelené s tmavšími pruhy a slabým mramorováním, vnitřní dužnina středně pevná až pevná, středně až tmavě červená, vnější vrstva dužniny slabá, semena hnědá středně velká, počet semen nízký až středně vysoký.

MRKEV

Daucus carota L.

Adona

Raná odrůda typu Nantes pro jarní a letní sklizeň, vhodná ke svazkování nebo jako letní mytá mrkev bez natě a z pozdních výsevů i na krátkodobé skladování.

Listy středně dlouhé, polovzpřímené, středně zelené, středně až hrubě členité. Kořen středně dlouhý, středně široký, dlouze válcovitého až mírně kónického tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Barva pokožky středně oranžová, vnitřní části středně až tmavě oranžová, dřeň tmavší než korová část. Hlava slabě zelená na povrchu, ale ne uvnitř.

Při přežívání citlivá na praskání kořenů.

Obsah karotenu nízký, obsah sušiny střední.

Barcelona

Poloraný hybrid typu Nantes pro letní až podzimní sklizeň, vhodný na přímou spotřebu, průmyslové zpracování a z pozdních výsevů i na dlouhodobé skladování.

Listy středně dlouhé, vzpřímené až polovzpřímené, světle až středně zelené, jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý a středně široký, dlouze válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně až tmavě oranžové, dřeň tmavší nebo stejně zbarvena jako korová část. Hlava na povrchu nezelená, na řezu zelená jen velmi slabě.

Odolnost proti praskání kořenů při přežívání vysoká.

Obsah karotenu nízký, obsah sušiny střední.

Katop

Raný hybrid typu Nantes pro jarní, letní a podzimní sklizně, vhodný ke svazkování nebo jako letní mytá mrkev bez natě a z pozdních výsevů i na krátkodobé skladování.

Listy krátké až středně dlouhé, vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý, středně široký, dlouze válcovitého až mírně kónického tvaru s zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a velmi slabě rýhovaným povrchem. Vnější i vnitřní vybarvení středně oranžové, dřeň stejně zbarvená nebo tmavší než korová část. Hlava slabě zelená na povrchu a na řezu slabě až středně. Slabý výskyt antokyanového zbarvení hlavy.

Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání vysoká.

Obsah karotenu nízký, obsah sušiny střední.

Nanbro

Poloraná odrůda typu Nantes pro letní až podzimní sklizně, vhodná k přímé spotřebě jako mytá mrkev bez natě.

Listy středně dlouhé, polovzpřímené, středně zelené, středně až hrubě členité. Kořen středně dlouhý, středně široký, dlouze válcovitého až mírně kónického tvaru se zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a jen velmi slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky středně oranžové, vnitřní části středně až světle oranžové, dřeň stejně zbarvená jako korová část. Hlava na povrchu ani uvnitř nezelená. Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání vysoká.

Obsah karotenu nízký až střední, obsah sušiny střední až vysoký.

Napa

Poloraný hybrid typu Nantes pro letní až podzimní sklizně, vhodný jako mytá mrkev k přímé spotřebě, průmyslovému zpracování a z pozdních výsevů ke skladování.

Listy středně dlouhé, polovzpřímené, středně zelené, hrubě členité. Kořen středně dlouhý až dlouhý a středně široký, dlouze válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, převážně s tupě špičatým zakončením a jen velmi slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky středně oranžové, vnitřní části středně až tmavě oranžové, dřeň tmavší. Hlava na povrchu nezelená a na řezu zelená jen velmi slabě.

Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání nízká až střední.

Obsah karotenu a sušiny nízký.

Narmada

Raný až poloraný hybrid typu Nantes pro letní až podzimní sklizně, vhodný jako mytá mrkev k přímé spotřebě a z pozdních výsevů ke skladování.

Listy středně dlouhé, vzpřímené, středně až tmavě zelené, středně členité. Kořen středně dlouhý, středně široký, dlouze válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, tupě špičatým zakončením a velmi slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, zbarvení dřeně středně až tmavě oranžové, dřeň stejná nebo tmavší než korová část. Hlava slabě zelená na povrchu i uvnitř. Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání střední až vysoká.

Obsah karotenu nízký až střední, obsah sušiny střední.

Nevis

Poloraný hybrid typu Nantes pro letní až podzimní sklizně, vhodný k přímé spotřebě jako svazková a nebo mytá mrkev bez natě a z pozdních výsevů i na dlouhodobé skladování.

Listy středně dlouhé, vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě zelené, jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý, úzký až středně široký, dlouze válcovitého tvaru s plochou až zakulacenou hlavou, převážně tupým zakončením a jen velmi slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení pokožky středně oranžové, vnitřní části středně až tmavě oranžové, dřeň tmavší než korová část. Hlava nezelená na povrchu i uvnitř.

Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání vysoká.

Obsah karotenu a sušiny nízký.

Yukon

Raný hybrid typu Nantes, vhodný i pro velmi rané výsevy a časné letní až podzimní pěstování jako svazková a zejména jako letní mytá mrkev bez natě z pozdních výsevů lze i dlouhodobě skladovat.

Listy krátké až středně dlouhé vzpřímené, středně zelené, jemně až středně členité. Kořen středně dlouhý, úzký až středně široký, dlouze válcovitého tvaru se zakulacenou hlavou, převážně tupě špičatým až tupým zakončením a jen slabě rýhovaným povrchem. Zbarvení vnější i vnitřní části je středně oranžové, dřeň stejně zbarvená jako korová část. Hlava jen velmi slabě zelená na povrchu. Vnitřním ani vnějším zelenáním hlavy netrpí.

Odolnost proti praskání kořenů při přezrávání vysoká. Listy vysoce odolné alternariové skvrnitosti.

Obsah karotenu nízký a sušiny střední.

OKURKA

Cucumis sativus L.

- n a k l á d a ě k a :

Asterix

Poloraný hybrid.

Rostlina středně vzrůstná. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý až střední, barva středně zelená, povrch plodu hrubě hříde bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou vysoká, odrůda dlouho odolává infekčnímu tlaku plísně.

Duet

Raný hybrid.

Rostlina slabě až středně vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou vysoká, odrůda je napadána plísni brzy, má však dobrou regenerační schopnost.

Pazano

Poloraný hybrid.

Rostlina slabě až středně vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva středně zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou vysoká, odrůda je napadána plísni brzy, má však dobrou regenerační schopnost.

Piccolo di Parigi (synonymum Vert pepit de Paris)

Poloraná nehybridní odrůda.

Rostlina silně vzrůstná. Na rostlině přibližně stejný počet květů samčích a samičích, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva světle zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý s černými ostny, na stopečném konci hořký.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou nízká.

Sequenza

Raný hybrid.

Rostlina slabě až středně vzrůstná. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký, průměr plodu malý, barva tmavě zelená, povrch plodu jemně hustě bradavičnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou vysoká.

- s a l á t o v á :**Deltastar**

Raný partenokarpický hybrid, „Beta Alfa“ typ vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírnicích.

Rostlina silně vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký až středně dlouhý (cca 19 cm), průměr plodu střední, tvar stopkového konce tupý, barva středně zelená, povrch plodu hladký.

Enduro

Poloraný partenokarpický hybrid, „holandský“ typ vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírnicích.

Rostlina slabě vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod středně dlouhý až dlouhý (cca 29 cm), průměr střední, stopkový konec s krátkým krčkem, barva plodu středně zelená, povrch plodu hladký, slabě žebnatý.

Hende

Raný až poloraný partenokarpický hybrid, „Beta Alfa“ typ vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírnicích.

Rostlina slabě vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký až středně dlouhý (cca 19 cm), průměr střední, stopkový konec s velmi krátkým krčkem, barva plodu středně zelená, povrch plodu hladký.

Lili

Poloraný hybrid, „americký“ typ vhodný pro polní pěstování.

Rostlina středně až silně vzrůstná. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod nehořký, středně dlouhý (cca 24 cm), průměr velký, tvar stopkového konce tupý, barva plodu tmavě zelená, povrch plodu hrubě řídce bradavičnatý, slabě žebnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou nízká.

Lungo verde degli ortolani

Raná až poloraná nehybridní odrůda, „americký“ typ vhodná pro polní pěstování.

Rostlina středně až silně vzrůstná. Na rostlině přibližně stejný počet květů samčích a samičích, a to jeden až tři na nodu. Plod středně dlouhý až dlouhý (cca 28 cm), průměr velký, na stopkovém konci nahořklý, tvar stopkového konce tupý, barva plodu světle zelená, povrch plodu hrubě řídce bradavičnatý, slabě žebnatý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou nízká.

Marketmore

Pozdní nehybridní odrůda, „americký“ typ, vhodná pro polní pěstování.

Rostlina středně vzrůstná. Na rostlině přibližně stejný počet květů samčích a samičích, a to jeden až tři na nodu. Plod středně dlouhý (cca 23 cm), průměr velký, tvar stopkového konce tupý, barva plodu tmavě zelená, povrch plodu hrubě řídce bradavičnatý, slabě žebnatý, ojedinělý výskyt hořkých plodů.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou nízká.

Paladinka

Raný partenokarpický hybrid, krátký „holandský“ typ vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírnicích.

Rostlina silně vzrůstná. Květy téměř výlučně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod krátký až středně dlouhý (cca 19 cm), průměr plodu střední, tvar stopkového konce zahrocený, barva středně zelená, povrch plodu hladký, slabě žebnatý.

Suso

Poloraný hybrid, „americký“ typ vhodný pro polní pěstování.

Rostlina středně až silně vzrůstná. Květy převážně samičí, a to jeden až tři na nodu. Plod středně dlouhý.

Odolnost proti napadení plísni okurkovou vysoká.

PAPRIKA

Capsicum annuum L.

Beros

Raná až poloraná odrůda vhodná pro polní pěstování.

Rostlina vysoká, stonek po první větvení dlouhý, postavení větví polovzpřímené. Plod slabě lesklý, před zralostí světle zelený, ve zralosti středně až tmavě červený, perikarp v bazální části silně zvlněný, dlouhý až velmi dlouhý, úzký, na podélném řezu tvaru rohu, bez stopečné jamky, semeník velmi malý, tloušťka oplodí slabá.

Chuť palčivá — plod obsahuje kapsaicin.

Cuby

Pozdní hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí středně zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu hladký, délka plodu střední, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká až středně hluboká, semeník středně velký, tloušťka oplodí silná.

Chuť sladká.

Kerala

Poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod středně až silně lesklý, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně až tmavě žlutý, na povrchu hladký, délka plodu střední, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka středně hluboká, semeník malý až středně velký, tloušťka oplodí silná.

Chuť sladká.

Kraska

Raná až poloraná nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod středně až silně lesklý, před zralostí světle zelený, ve zralosti středně až tmavě červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu střední, průměr střední, převládající tvar na podélném řezu trojúhelníkovitý, stopečná jamka velmi mělká, semeník malý, tloušťka oplodí slabá až střední.

Chuť sladká.

Lambada

Poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené až rozkladité, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí středně zelený, ve zralosti středně až tmavě červený, na povrchu hladký, délka plodu střední, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká, semeník středně velký, tloušťka oplodí silná.

Chuť sladká.

Mars

Poloraná nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v vytápěných i nevytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení středně dlouhá až dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí světle zelený, ve zralosti tmavě žlutý, perikarp v bazální části středně zvlněný, na povrchu slabě drsný, délka velmi dlouhá, průměr středně velký až velký, plod na podélném řezu tvaru rohu, stopečná jamka velmi mělká, semeník malý, tloušťka oplodí střední.

Chuť sladká.

Mayata

Poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině vzpřímené, délka stonku po první větvení středně dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí středně zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu dlouhá, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu obdélníkovitý, stopečná jamka mělká až středně hluboká, semeník malý, tloušťka oplodí středně silná až silná.

Chuť sladká.

Melody

Raná až poloraná hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká. Plod středně až silně lesklý, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu dlouhá, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu lichoběžníkovitý, stopečná jamka mělká až středně hluboká, semeník malý až středně velký, tloušťka oplodí středně silná.

Chuť sladká.

Ozarowska

Poloraná nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách.

Postavení větví na rostlině vzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá, postavení plodu na rostlině vzpřímené. Plod středně lesklý, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu střední, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka mělká, semeník středně velký, tloušťka oplodí střední.

Chuť sladká.

Pluto

Raná nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlínách a v teplých oblastech vhodná též pro polní pěstování.

Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká. Plod silně lesklý, před zralostí světle až středně zelený, ve zralosti tmavě červený, perikarp v bazální části silně zvlněný, na povrchu drsný, délka dlouhá, průměr velmi malý, plod na podélném řezu tvaru rohu bez stopečné jamky, semeník malý, tloušťka oplodí slabá.

Chuť sladká.

Quadrato d'Asti giallo

Poloraná až pozdní nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlírnicích v teplejších oblastech i pro polní pěstování. Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá až dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí středně zelený, ve zralosti tmavě žlutý, na povrchu slabě drsný, délka plodu střední, průměr velmi velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka hluboká, semeník středně velký, tloušťka oplodí střední.

Chuť sladká.

Odrůda je náchylná k napadení virem tabákové mozaiky.

Quadrato d'Asti rosso

Poloraná až pozdní nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlírnicích, v teplejších oblastech i pro polní pěstování. Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu střední, průměr velmi velký, převládající tvar na podélném řezu čtvercovitý, stopečná jamka hluboká, semeník středně velký, tloušťka oplodí střední.

Chuť sladká.

Odrůda je náchylná k napadení virem tabákové mozaiky.

Topepo rosso

Raná až poloraná nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlírnicích, v teplejších oblastech i pro polní pěstování. Postavení větví na rostlině vzpřímené až polovzpřímené, délka stonku po první větvení středně dlouhá. Plod silně lesklý, před zralostí tmavě zelený, ve zralosti tmavě červený, na povrchu hladký, délka plodu krátká, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu ploše kulovitý bez stopečné jamky, semeník velký, tloušťka oplodí silná.

Chuť sladká.

Yolo Wonder

Poloraná až pozdní nehybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných rychlírnicích, v teplejších oblastech i pro polní pěstování. Postavení větví na rostlině polovzpřímené, délka stonku po první větvení středně dlouhá. Plod středně až silně lesklý, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu střední, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu ploše obdélníkovitý, stopečná jamka mělká, semeník středně velký, tloušťka oplodí střední.

Chuť sladká.

Zafiro

Pozdní hybridní odrůda vhodná pro pěstování v nevytápěných i vytápěných rychlírnicích.

Postavení větví na rostlině rozkladité, délka stonku po první větvení krátká až středně dlouhá. Plod středně až silně lesklý, před zralostí středně zelený, ve zralosti středně červený, na povrchu slabě drsný, délka plodu dlouhá, průměr velký, převládající tvar na podélném řezu obdélníkovitý, stopečná jamka mělká až středně hluboká, semeník malý, tloušťka oplodí silná.

Chuť sladká.

PETRŽEL ZAHRADNÍ NAŤOVÁ

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. convar. *vulgare* (Nois) Danert

Frisc vert foncé

Kadeřavá odrůda vhodná pro přímý trh, sušení i zmrazování.

Rostliny středně vysoké, hustě olistěné s polovzpřímenými silně zkadeřenými listy, středně až tmavě zelené barvy. Řapíky středně dlouhé, středně tlusté až tlusté. Nať má rychlý vývoj a sklizeň je možno několikrát opakovat.

Mooskrause 2 (Verta)

Kadeřavá odrůda vyselektovaná z odrůdy Mooskrause 2, vhodná pro přímý trh, sušení i zmrazování. Prodává se pod obchodním názvem Verta.

Rostliny nízké až středně vysoké, hustě olistěné s polovzpřímenými silně zkadeřenými listy, středně až tmavě zelené barvy. Řapíky krátké až středně dlouhé, středně tlusté. Nať má rychlý vývoj a sklizeň je možno několikrát opakovat.

PÓR

Allium porrum L.

Franse Zomer 3

Raná odrůda vhodná pro letní sklizeň.

Rostlina dlouhá. Listy polovzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Lodyha středně dlouhá až dlouhá, průměr lodyhy střední bez zesílení do cibule.

V EU je odrůda udržována více udržovateli, provenience udržovaná firmou Rijk Zwaan B.V., Nizozemsko, je známa pod obchodním názvem Allard.

Krystina

Pozdní odrůda vhodná pro pozdní podzimní až zimní sklizeň.

Rostlina středně dlouhá. Listy polovzpřímené, tmavě modrozelené, středně až silně ojínné. Lodyha středně dlouhá, průměr lodyhy střední bez zesílení do cibule.

RAJČE

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

- k e ř í č k o v é (determinantní):

Campbell 33

Pozdní nehybridní odrůda vhodná pro polní pěstování s využitím plodů především pro průmyslové zpracování.

Květenství jednoduché i složené. Plod velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci prohloubený až plochý, slabě žebnatý, stopečná jamka mělká s velkou korkovou stopou u stopky, více než čtyřkomorový, před zralostí světle zelený s žlhnáním, ve zralosti červený, bez dělivého pletiva ve stopce.

Kmície

Raná až poloraná nehybridní odrůda vhodná pro polní pěstování s využitím plodů především pro průmyslové zpracování.

Květenství jednoduché i složené. Plod malý až středně velký, převážně vejčitého tvaru, na apikálním konci plochý až zahrocený, hladký, bez stopečné jamky s velmi malou až malou korkovou stopou u stopky dvou až tříkomorový, před zralostí světle až středně zelený bez žlhnání, ve zralosti červený, bez dělivého pletiva ve stopce.

Vilma

Velmi raná nehybridní odrůda tzv. „koktejlového“ typu vhodná především pro pěstování na balkonech a terasách.

Rostlina velmi nízká (maximálně 25-30 cm vysoký keř), listy velmi malé, internodia krátká, nahloučená. Květenství jednoduché i složené. Plod velmi malý, převážně kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, bez stopečné jamky s velmi malou korkovou stopou u stopky dvou až tříkomorový, před zralostí světle až středně zelený s intenzivním žlhnáním, ve zralosti červený, s dělivým pletivem ve stopce. Odrůda nemá hospodářský význam, je určena především pro drobné pěstitele.

- t y č k o v é (indeterminantní):

Brick

Poloraný až pozdní hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký až velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, stopečná jamka mělká až středně hluboká s velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí světle až středně zelený bez žlhnání, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu 2-3 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

Diamina

Poloraný hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký až velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, slabě žebnatý, stopečná jamka mělká se středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí středně zelený bez žlhnání, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu až 4 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

Durasol

Pozdní hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký až velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, velmi slabě žebnatý, stopečná jamka mělká se středně velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí středně zelený se slabým žlhnáním, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu až 3 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

Orkado

Raný až poloraný hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách a taktéž pro polní pěstování.

Květenství převážně jednoduché. Plod malý až středně velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý až zahrocený, slabě žebnatý, stopečná jamka mělká s velkou korkovou stopou u stopky, dvou až tříkomorový, před zralostí středně zelený s žlhnáním, ve zralosti červený.

Perun

Poloraná nehybridní odrůda tzv. „koktejlového“ typu vhodná pro rychlení i polní pěstování.

Květenství převážně jednoduché. Plod velmi malý, převážně silně hruškovitého tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, bez stopečné jamky s velmi malou korkovou stopou u stopky, dvoukomorový, před zralostí světle až středně zelený s intenzivním žlhnáním, ve zralosti žlutý.

Odrůda nemá hospodářský význam, je určena především pro drobné pěstitele.

Podeba

Pozdní hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký až velký, převážně kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, velmi slabě až slabě žebnatý, stopečná jamka mělká se středně velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí středně zelený bez žlhnání, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu až 4 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

Raissa

Poloraný až pozdní hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký až velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, stopečná jamka středně hluboká s velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí světle až středně zelený bez žhání, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu 3 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

Riwi

Poloraný hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký až velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, stopečná jamka mělká se středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, tří až čtyřkomorový, před zralostí světle až středně zelený bez žhání, ve zralosti červený.

Rongella

Poloraný hybrid vhodný pro rychlení ve vytápěných i nevytápěných rychlírňách.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, slabě žebernatý, stopečná jamka mělká se středně velkou korkovou stopou u stopky, dvou až tříkomorový, před zralostí světle zelený bez žhání, ve zralosti červený.

Odrůda patří ke skladovatelnému typu (tzv. „long shelf life“ typ) — plody lze skladovat v neřízené atmosféře bez ztráty kvality po dobu 3 týdnů po sklizni plně vyzrálých plodů.

S. Marzano Vesuvio 2 (synonymum San Marzano 2)

Pozdní nehybridní odrůda vhodná pro rychlení i polní pěstování.

Květenství jednoduché i složené. Plod malý až středně velký, převážně cylindrického tvaru, na apikálním konci zahrocený, slabě žebernatý, stopečná jamka mělká s velmi malou až malou korkovou stopou u stopky, dvoukomorový, před zralostí světle až středně zelený s intenzivním žháním, ve zralosti červený.

Odrůda je náchylná k tvorbě dutých plodů, nemá hospodářský význam, je určena především pro drobné pěstitele.

S. Pierre (synonymum Saint Pierre)

Pozdní nehybridní odrůda vhodná pro rychlení i polní pěstování.

Květenství jednoduché i složené. Plod velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci prohloubený, středně žebernatý, stopečná jamka středně velká s velkou korkovou stopou u stopky, více než čtyřkomorový, před zralostí středně až tmavě zelený s žháním, ve zralosti červený. Plody jsou měkké, náchylné k praskání.

Odrůda nemá hospodářský význam, je určena především pro drobné pěstitele.

Tajfun

Raný až poloraný hybrid vhodný pro rychlení i polní pěstování.

Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký, převážně slabě ploše kulovitěho tvaru, na apikálním konci plochý, hladký, stopečná jamka středně hluboká s malou korkovou stopou u stopky, dvou až tříkomorový, před zralostí středně zelený bez žhání, ve zralosti červený.

ŘEDKEV SETÁ

Raphanus sativus L.

Houseking

Poloraný hybrid typu Daikon pro jarní, letní až podzimní pěstování a přirychlování pod fólií. Vhodný k přímé spotřebě a z pozdních výsevů i ke skladování.

Listy středně dlouhé, úzce vejčité, tmavě šedozelené, silně laločnaté. Bulvy velké, převážně dlouze válcovité s tupě špičatým zakončením, bílé s velmi hladkým povrchem a kompaktní bílou dužninou.

Odolnost proti plísnatění, houbovatění a vyběhání do květu i za dlouhého dne vysoká.

Japan

Poloraný hybrid typu Daikon pro podzimní pěstování, vhodný k přímé spotřebě a z pozdních výsevů i ke skladování.

Listy středně dlouhé, úzce vejčité, světle až středně šedozelené, silně laločnaté. Bulvy dlouhé, rampouchovité s převážně tupě špičatým zakončením, bílé, na povrchu slabě rýhované až hladké s kompaktní bílou dužninou. Za dlouhého dne vyběhává do květu, proto lze pěstovat jen na podzim..

Odolnost proti plísnatění, a houbovatění vysoká.

ŘEDKVIČKA

Raphanus sativus L. var. sativus

Lidka

Poloraná odrůda pro jarní až časně letní nebo podzimní pěstování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené vejčitého tvaru, středně šedozelené se středně až silně laločnatým okrajem. Bulvičky velké, kulovité na bázi zakulacené s matně bílou až narůžovělou kompaktní dužninou.

Odolnost proti praskání bulviček a houbovatění po dosažení optimální sklizňové zralosti vysoká. Odolnost proti vyběhání do květu za dlouhého dne střední.

Rosso tondo a piccola punta bianca

Poloraná dvoubarevná odrůda pro jarní i podzimní polní pěstování.

Rostliny vysoké. Listy polovzpřímené, vejčité, středně až silně laločnaté. Bulvičky velké, převážně kulaté, na bázi zakulacené, červenobílé s bílou špičkou malého rozsahu. Dužnina matně bílá, v době optimální zralosti kompaktní, při přezrávání středně rychle houbovatí. Vyžaduje včasnou sklizeň. Odolnost proti vyběhání do květu střední.

ŘEPA SALÁTOVÁ

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Bona

Víceklíčková polopozdní odrůda typu Detroit pro letní až podzimní sklizeň k přímé spotřebě a průmyslovému zpracování.

Chrást středně vysoký až vysoký, listová čepel velká, eliptická, středně zelená, řapíky dlouhé, červené. Bulva kulatá s karmínově červenou, hladkou pokožkou bez nebo jen ojediněle s nepatrnou korkovitostí. Dužnina stejnoměrně intenzivně karmínově červená, kroužky stejné, vláknitost po vaření střední.

Odolnost proti vyběhání do květu vysoká.

Tonda di Chioggia

Víceklíčková raná odrůda pro pozdní letní až podzimní sklizeň k přímé spotřebě, zejména do salátů a na zdobení pokrmů. Nevhodná ke konzervaci, neboť ztrácí zbarvení.

Chrást nízký až středně vysoký, listová čepel středně velká, široce eliptická, světle zelená, řapíky středně dlouhé, zelené, ojediněle oranžové. Bulva slabě zploštělá s rumělkově červenou, hladkou pokožkou, bez korkovitosti. Dužnina velmi jemná s výraznými koncentrickými bílými a rumělkově červenými kroužky.

Odolnost proti vyběhání do květu vysoká.

SALÁT HLÁVKOVÝ

Lactuca sativa L. var. capitata Alef.

Court

Polopozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizeň na přímou spotřebu a průmyslové zpracování.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené bez antokyanu, tlusté, se středním leskem, slabou bublinatostí a silně zvlněným okrajem. Hlávka středně velká až velká, uzavřená, pevná, středně hustá až hustá, kompaktní, těžká, křehká, okrouhlého tvaru, zcela překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu i za dlouhého dne vysoká.

Embrace

Polopozdní odrůda ledového salátu typu Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní podzimní sklizeň na přímou spotřebu a průmyslové zpracování.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené bez antokyanu, tlusté, se středním až silným leskem, slabou bublinatostí a silně zvlněným okrajem. Hlávka velká, uzavřená, kompaktní, pevná, hustá, těžká, křehká, okrouhlého tvaru, zcela překrytá listy. Odolnost proti vyběhání do květu i za dlouhého dne velmi vysoká.

Estiva di Kagan 2

Poloraná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro jarní a letní sklizeň.

Listy polovzpřímené, středně zelené bez antokyanu, celokrajné, středně tlusté, se středním leskem, středně silnou až silnou bublinatostí a slabě zvlněným okrajem. Hlávka středně velká až velká, středně uzavřená, pevná, středně hustá, okrouhlého až přičně široce eliptického tvaru, středně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední.

La resistente

Poloraná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro jarní a letní sklizeň.

Listy téměř vodorovné, středně až tmavě zelené bez antokyanu, celokrajné, středně tlusté až tlusté se slabým leskem, středně silnou bublinatostí a bez zvlněného okraje. Hlávka středně velká uzavřená, středně pevná až pevná, středně hustá až hustá, okrouhlého tvaru, středně silně až silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední až vysoká.

Marillion

Raná až poloraná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizeň.

Listy polovzpřímené až vodorovné, středně zelené bez antokyanu, středně tlusté až tlusté, se středním leskem, slabou bublinatostí a velmi slabě zvlněným okrajem. Hlávka středně velká, středně uzavřená až uzavřená, středně pevná, hustá, okrouhlého tvaru, středně silně až silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední až vysoká.

Meraviglia d'Inverno

Raná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro jarní a podzimní sklizeň.

Listy polovzpřímené až vodorovné, středně zelené bez antokyanu, slabé až středně tlusté; se slabým až středním leskem, slabou až středně silnou bublinatostí a slabě zvlněným okrajem. Hlávka je středně velká až velká, uzavřená, středně pevná, středně hustá, okrouhlého tvaru, slabě až středně silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne nízká až střední.

Monia

Raná odrůda máslového typu (Atrakce) k polnímu pěstování pro časně letní nebo podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, světle žlutozelené bez antokyanu, slabé až středně tlusté, se slabým až středním leskem, velmi slabou až slabou bublinatostí a velmi slabě zvlněným okrajem. Hlávka středně velká, uzavřená, středně pevná, středně hustá, okrouhlého tvaru, středně silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední až vysoká.

Plenty

Raná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro jarní nebo podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně zelené bez antokyanu, středně tlusté, se středním až silným leskem, slabou až střední bublinatostí a velmi slabě zvlněným okrajem. Hlávka je středně velká až velká, uzavřená, pevná, středně hustá až hustá, okrouhlého tvaru, středně silně až silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední.

Regina dei ghiacci

Poloraná odrůda ledového salátu typu Batavia k polnímu pěstování pro jarní až podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až téměř vodorovné, tmavě šedozeleň bez antokyanu, středně tlusté až tlusté, se slabým až středním leskem, středně silnou až silnou bublinatostí, intenzivně zubatým a středně silně až silně zvlněným okrajem. Hlávka otevřená, velká až velmi velká, volná až středně hustá, převážně příčně eliptického tvaru.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne po dosažení zralosti střední až vysoká.

Titan

Raná odrůda máslového typu k polnímu pěstování pro sklizeň v časném létě nebo na podzim.

Listy polovzpřímené až téměř vodorovné, středně zelené bez antokyanu, středně tlusté, se slabým leskem, slabou bublinatostí a velmi slabě zvlněným okrajem. Hlávka středně velká až velká, uzavřená, středně pevná až pevná, středně hustá, okrouhlého tvaru, středně silně překrytá listy.

Odolnost proti vyběhání do květu v podmínkách dlouhého dne střední.

Wendel

Raná odrůda máslového typu vhodná k jarnímu, podzimnímu a zimnímu rychlení ve skleníku.

Listy polovzpřímené až vodorovné, středně zelené bez antokyanu, celokrajné, středně tlusté, se slabým leskem, slabou bublinatostí a bez zvlněného okraje. Hlávka středně velká, uzavřená, pevná, hustá až velmi hustá, okrouhlého tvaru, středně silně překrytá listy.

Lze pěstovat jen za krátkého dne.

ŠPENÁT

Spinacia oleracea L.

Chica

Pozdní až velmi pozdní hybrid pro jarní nebo podzimní pěstování a v mírnějších zimách i k přezimování.

Listová čepel velká, polovzpřímená až vzpřímená, tmavě šedozeleň, hladká, široce eliptického tvaru s malým leskem. Řapíky krátké, polovzpřímené.

Po překročení sklizňové zralosti velmi pozdě a středně rychle vybíhá do květu.

Fordane

Raný hybrid pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel středně velká, vzpřímená, světle žlutozelená, hladká, široce eliptického tvaru s malým až středním leskem. Řapíky krátké, vzpřímené.

Po překročení sklizňové zralosti poměrně časně a středně rychle vybíhá do květu.

Gigante d inverno

Raná odrůda pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel středně velká až velká, polovzpřímená, světle až středně žlutozelená, středně až slabě bublinatá, okrouhlého tvaru s malým leskem. Řapíky krátké až středně dlouhé, polovzpřímené.

Po překročení sklizňové zralosti časně, hromadně a středně rychle vybíhá do květu.

Riccio d Asti

Poloraná odrůda pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel malá až středně velká, polovzpřímená středně až tmavě šedozeleň, silně bublinatá, široce eliptického až vejčitého tvaru se středním leskem. Řapíky krátké až středně dlouhé, polovzpřímené.

Po překročení sklizňové zralosti časně, ale pozvolna vybíhá do květu.

TYKEV OBECNÁ

Cucurbita pepo L.

Consul

Keřková hybridní odrůda typu cuketa.

Rostlina nevětví, bez úponků. List středně velký, silně členěný, tmavě zelený s mramorováním. Mladý plod zelený se žlutým mramorováním, hladký, silně lesklý. Plod plně vyvinutý ve velikosti tmavě zelený s tmavšími pruhy na žebrech, válcovitého tvaru bez krčku. Dlouhý, na průměru široký, v botanické zralosti oranžový. Semeno bělavé, malé až středně velké.

TYKEV OLEJNÁ

Cucurbita pepo L. var. oleifera

Opavská

Nehybridní plazivá odrůda olejné tykve.

Rostlina silně větví, list slabě členitý, mramorovaný. Mladý plod zelený se žlutým mramorováním, hladký. Plod plně vyvinutý ve velikosti tmavě zelený, kulovitý až mírně plošekulovitý tvaru, středně velký, v botanické zralosti oranžový. Semeno šedozelené bez tvrdého osemení, středně velké, eliptického tvaru.

Odrůda je určena především pro produkci bezslupkatých semen s vysokým podílem oleje.

Agrotechnika tykve olejné je shodná s agrotechnikou ostatních plazivých tykví.

ZELÍ HLÁVKOVÉ

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef var. capitata (L.) Alef

- b f l 6

Brunswick

Poloraná odrůda pro letní až podzimní sklizně k přímé spotřebě a k kruhárenskému zpracování.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené, světle až středně šedozelené, středně bublinaté a středně ojínné. Hlávka středně velká, příčně úzce eliptická, středně hustá, uzavřená až polouzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek při přezrávání vysoká a proti vyvracení košťálu středně vysoká až vysoká.

Cantor

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a zejména ke kruhárenskému zpracování.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, světle až středně šedozelené, středně bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka velká, okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a proti vyvracení košťálu vysoká.

Colmar

Pozdní až velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a na dlouhodobé skladování.

Rostliny velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, u báze vodorovné, středně šedozelené, slabě až středně bublinaté a slabě až středně ojínné. Hlávka středně velká, široce obvejčitá, hustá, polouzavřená až uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Cuor di bue grosso

Raná až poloraná odrůda pro letní a podzimní sklizně k přímé spotřebě, zejména k výrobě salátů.

Rostliny středně velké až velké s krátkým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně bublinaté a středně ojínné. Hlávka středně velká, vysoká, převážně špičatě vejčitého tvaru, volná až středně hustá, křehká, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá s krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek při přezrávání střední a proti vyvracení košťálu vysoká.

Daneza Dulce

Raný až poloraný hybrid pro letní sklizně k přímému zásobování trhu, vhodný především k výrobě salátů.

Rostliny středně vysoké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené, u báze až vodorovné, středně zelené, slabě bublinaté a velmi slabě ojínné. Hlávka středně velká, plochá, středně hustá, křehká, uzavřená, středně zelená, uvnitř žlutavá a na obvodu bělavá s hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým až dlouhým vnitřním košťálem.

Odolný proti praskání hlávek.

Discover

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně ke kruhárenskému zpracování a případně k přímé spotřebě.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené s modrozeleňým nádechem, slabě až středně bublinaté a silně ojínné. Hlávka středně velká až velká, převážně okrouhlá, hustá až velmi hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s krátkým až středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Gonzales

Raný malohlávkový hybrid do zahuštěných výsadeb pro jarní sklizně k přímé spotřebě.

Rostliny malé s krátkým vnějším košťálem. Listy malé, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě šedozelené, velmi slabě bublinaté a středně ojínné. Hlávka malá, pevná, převážně příčně eliptická, středně hustá až hustá, uzavřená až polouzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek při přezrávání vysoká. Stabilita košťálu dobrá.

Impuls

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a ke skladování.

Rostliny středně velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené u báze však vodorovné, středně zelené, velmi slabě bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka malá až středně velká, pevná, převážně okrouhlá, hustá až velmi hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Manama

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně ke kruhárenskému zpracování a k přímé spotřebě.

Rostliny středně velké až velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, středně zelené, slabě bublinaté a slabě až středně ojínné. Hlávka velká, pevná, převážně příčně eliptického tvaru, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Oklahoma

Pozdní až velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizně ke kruhárenskému zpracování, skladování a případně přímé spotřebě.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené, středně šedozelené, středně až silně bublinaté a středně ojínné. Hlávka velká, široce elipsovité, pevná, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá a na obvodu bělavá se středním vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Rivera

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a dlouhodobému skladování.

Rostliny velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené, u báze vodorovné, středně zelené s šedým nádechem, slabě bublinaté a silně ojínné. Hlávka středně velká, pevná, převážně okrouhlá, hustá, uzavřená, středně šedozelená, uvnitř žlutavá s jemnou až středně jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Vestri

Polopozdní až pozdní hybrid pro podzimní sklizně ke kruhárenskému zpracování, přímé spotřebě a krátkodobému skladování.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené, středně zelené s šedozeleným nádechem, slabě bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka velká, pevná, převážně okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

- červené

Subaro

Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a dlouhodobému skladování.

Rostliny velké s dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně až tmavě fialové se slabě až středně zeleným nádechem, slabě bublinaté se středně až silně zvlněným okrajem čepele a středním až silným ojínním. Hlávka malá až středně velká, pevná, široce elipsovité až obvejčitá, uzavřená, tmavě fialová vně i uvnitř, hustá se středně jemnou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

Vitaro

Pozdní hybridní odrůda pro podzimní sklizně k přímé spotřebě a dlouhodobému skladování.

Rostliny středně velké až velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně až fialové se středně zeleným nádechem, velmi slabě bublinaté se středně až silně zvlněným okrajem čepele a středně silným až silným ojínním. Hlávka středně velká, pevná, okrouhlá až široce elipsovité, uzavřená, tmavě fialová vně i uvnitř, hustá se středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odolnost proti praskání hlávek a vyvracení košťálu vysoká.

ZELÍ PEKINGSKÉ

Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.

Hilton

Poloraná odrůda pro pozdně letní a podzimní sklizně k přímé spotřebě a krátkodobému skladování.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy polovzpřímené, středně velké, středně zelené a středně bublinaté, převážně široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká, široce elipsovité, žlutozelená, uzavřená, pevná s krátkým vnitřním košťálem. Barva srdíčka na řezu středně žlutá. Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

Hopkin

Raný hybrid pro rychlení a jarní až podzimní sklizně k přímé spotřebě a krátkodobému skladování.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy polovzpřímené, středně velké, středně zelené a středně bublinaté, široce obvejčitého tvaru. Hlávka středně velká, široce elipsovité, světle až středně zelená, uzavřená, pevná s krátkým vnitřním košťálem.

Barva srdíčka na řezu tmavě žlutá.

Polní odolnost proti napadení alternariovou skvrnitostí střední.

OVOCNÉ DRUHY A RÉVA

JABLOŇ

Malus Mill.

Primula

Letní odrůda

Vzrůstnost střední až silnější, obrost dlouhý, tenký, převislý, vyholuje. Plody středně velké až malé, elipsovitého až vejčitého tvaru, žebernaté. Stopka středně dlouhá. Stopečná jamka středně hluboká, úzká, kalich malý, jemně zvlněný. Slupka nerovná, silně ojínná, středně silná. Základní barva slupky světle zelená, krycí tmavě červená, celokrajně rozmytá. Dužnina bílá, slabě navinulá, křehká, šťavnatá, nevýrazně voňavá.

Proti strupovitosti rezistentní, padlími trpí středně.

Sklizeň v polovině srpna, skladovatelnost tři týdny.

Hana**Letní odrůda**

Vzrůstnost střední, spoře obrůstá, středně dlouhým tenkým obrostem, vyholuje. Plody střední až velké, kulovité, slabě žebernaté, bez svalců, se středně velkým kalichem. Stopka středně dlouhá. Slupka středně silná, nerovná, hladká, lesklá, slabě mastná, neojíněná. Základní barva slupky světle zelená, krycí barva tmavě červená, žlhaná. Dužnina zelenavá, velmi šťavnatá, jemná, aromatická, slabě navinulá. Proti strupovitosti rezistentní, padlím trpí středně. Sklizeň začátkem srpna, skladovatelnost tři týdny.

Zlatava**Podzimní odrůda**

Vzrůstnost střední, obrůstá krátkým, silným obrostem, částečně vyholuje. Plody střední až velké, zploštělé kuželovité, slabě žebernaté s nepatrnými svalci na distální konci, s velkým a hlubokým kalichem. Stopka krátká a tenká. Slupka tenká, hladká, slabě mastná, neojíněná. Základní barva slupky žlutá, krycí červená ve formě líčka. Dužnina krémové barvy, šťavnatá, křehká, aromatická, sladce navinulá. Méně citlivá na strupovitost a padlí. Sklizeň koncem srpna, skladovatelnost do poloviny října.

Aneta**Zimní odrůda**

Vzrůstnost střední až slabší, bohatě obrůstá velmi krátkým obrostem, nevyholuje. Plody velké až velmi velké, kulovité kuželovité bez žeber, s širokým kalichem. Stopka krátká. Slupka tenká, suchá, nerovná, neojíněná. Základní barva slupky světle žlutá, krycí hnědě až tmavě červeně rozmytá. Rzvost kolem stopečné jamky jen občas. Dužnina krémové barvy, šťavnatá, jemná, aromatická, slabě navinulá, po rozkrojení slabě hnědné. Proti strupovitosti rezistentní, padlím trpí méně. Sklizeň v polovině září, skladovatelnost do února.

Goldstar**Zimní odrůda**

Vzrůstnost střední, spoře obrůstá středně dlouhým obrostem, se sklonem k vyholování větví. Plody velké až velmi velké, zploštělé kulovité bez žeber s širokým kalichem. Stopka dlouhá a tenká. Slupka tenká, hladká, lesklá, suchá, neojíněná. Základní barva slupky zelenožlutá, krycí červená ve formě nevýrazného líčka. Rzvost kolem stopečné jamky jen občas. Dužnina krémové barvy, šťavnatá, jemná, aromatická, křehká, navinule sladká, později nasádlá. Proti strupovitosti rezistentní, padlím trpí méně. Sklizeň začátkem října, skladovatelnost do dubna.

Rajka**Zimní odrůda**

Vzrůstnost silná, dostatečně obrůstá středně dlouhým, silným obrostem. Plody velké, kulovité bez žeber s nepatrnými svalci a mělkým kalichem. Stopka středně dlouhá. Slupka silná, hladká, lesklá, slabě mastná, neojíněná. Základní barva slupky žlutá, krycí tmavě červená, rozmytá. Rzvost kolem stopečné jamky jen občas. Dužnina krémové barvy, velmi šťavnatá, navinule sladká, aromatická. Proti strupovitosti rezistentní, padlím trpí méně. Sklizeň koncem září, skladovatelnost do března.

MERUŇKA

Prunus armeniaca L.

Lejuna**Raná odrůda**

Vzrůstnost střední, koruna vzpřímená, středně hustá. Plody středně velké, kulaté, souměrné. Povrch plodu hladký. Základní barva slupky světle oranžová s malým sytě červeným líčkem. Dužnina oranžová, tužší, avšak ne hrubá, hodně šťavnatá, sladce navinulá, dobrá. Pecka středně velká, vejčitá, velmi dobře odlučitelná od dužniny, jádro velmi hořké. Množství plodů je třeba redukovat správným řezem (zmlazovací), případně probírkou plodů. Otláčitelnost plodů malá. Odolnost proti mrazu vysoká. Plodnost brzká, velmi velká a pravidelná. Zraje o 12 dnů dříve než odrůda Velkopavlovická.

Leskora**Velmi raná odrůda**

Vzrůstnost střední, koruna vzpřímená, středně hustá. Plody středně velké, srdčité, souměrné. Povrch plodu hladký. Základní barva slupky oranžová s malým červeným líčkem. Dužnina oranžová, středně tuhá, hrubší, hodně šťavnatá, sladce navinulá, aromatická, dobrá. Pecka středně velká, kulatá, velmi dobře odlučitelná od dužniny, jádro velmi hořké. Otláčitelnost plodů malá. Odolnost proti mrazu vysoká. Plodnost brzká, středně velká a pravidelná. Zraje o 17 dnů dříve než odrůda Velkopavlovická.

Ledana**Velmi raná odrůda**

Vzrůstnost střední, koruna vzpřímená, středně hustá. Plody středně velké, válcovité, souměrné. Povrch plodu nerovný. Základní barva slupky oranžová s malým červeným líčkem. Dužnina oranžová, středně tuhá, rozplývavá, hodně šťavnatá, sladce navinulá, aromatická, dobrá. Pecka středně velká, kulatá, velmi dobře odlučitelná od dužniny, jádro velmi hořké. Otláčitelnost plodů malá. Odolnost proti mrazu vysoká. Plodnost středně brzká, velká a pravidelná. Zraje o 15 dnů dříve než odrůda Velkopavlovická.

Darina

Středně raná odrůda.

Vzrůstnost silná, koruna vzpřímená, řídká. Plody středně velké, srdčité, souměrné. Povrch plodu nerovný. Základní barva slupky světle oranžová asi z 1/3 krytá červeně tečkovaným líčkem. Dužnina oranžová, tuhá, hodně šťavnatá, navinulá, dobrá. Pecka středně velká, vejčitá, středně dobře odlučitelná od dužniny, jádro sladké. Otažitelnost plodů malá.

Odolnost proti mrazu vysoká.

Plodnost brzká, velká a pravidelná. Zraje 4 dny po odrůdě Velkopavlovická.

Kompakta

Středně raná odrůda.

Vzrůstnost střední, koruna rozložitá, kompaktní, ne příliš hustá. Plody malé až středně velké, kulaté, souměrné. Povrch plodu hladký. Základní barva slupky světle oranžová. Na plodu se objevují červené skvrny, zřídka celistvé líčko. Dužnina oranžová, v konzumní zralosti měkká, středně šťavnatá, sladká, středně dobrá. Pecka středně velká, kulatá, velmi dobře odlučitelná od dužniny, jádro středně hořké. Otažitelnost plodů je malá.

Odolnost proti mrazu v květu vysoká, ve dřevě střední.

Plodnost brzká, velká a pravidelná. Zraje 2 dny před odrůdou Velkopavlovická.

Elena

Středně raná odrůda.

Vzrůstnost střední, koruna rozložitá, středně hustá. Plody velmi velké, tupě kuželovité, nesouměrné, tvarově pouze středně vyrovnané. Povrch plodu nerovný. Základní barva slupky světle oranžová. Líčko je většinou méně výrazné, světle červené, rozmyté, při okraji tečkované. Dužnina oranžová, měkká, rozplývavá, hodně šťavnatá, sladká, středně dobrá. Pecka vzhledem k velikosti plodu malá, vejčitá, středně dobře odlučitelná od dužniny, jádro středně hořké. Plody mají náchylnost na otažení.

Odolnost proti mrazu střední.

Plodnost středně velká až velká, pravidelná. Zraje 2 dny po odrůdě Velkopavlovická.

TŘEŠEŇ

Prunus avium (L.) L.

- p o d n o ž

Colt

Vegetativně množená podnož pro třešně a višně.

Vzrůstnost střední, habitus vzpřímený. Vegetativní pupen vejčitý, od výhonu silně odkloněný. Listy podlouhlé, zelené, lesklé, horizontálně postavené. Výhony tvoří na bázi kořenové patky, proto se dobře rozmnožuje dřevitými řízků. Lze množit i zelenými řízků, hřížením a odštěpkami. Na podzim drží listy dlouho na výhonech, které pozdě vyzařávají.

Odolnost proti mrazu dobrá.

Odrůdy naštěpované na této podnoži rostou slabě až středně. Plodnost nastupuje brzy a je vysoká.

OKRASNÉ DRUHY

GLOXINIE NÁDHERNÁ

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern

Mamka

Rostliny středně vysoké, listy polovzpřímené až vodorovné, tmavě zelené.

Květ sytě červený, sametový. Jícen na vnější straně bílý s karmínově červenou žilnatinou.

JIRINKA PROMĚNLIVÁ

Dahlia pinnata Cav.

Harlekýn — A červenooranžový

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké až středně vysoké, keřovité, středně až silně větvičité. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným středním hnědočerveným stínováním, listy tmavě zelené. Úbory malé až středně velké, červenooranžové, středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — B žlutý

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, silně větvičité. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším hnědočerveným stínováním, listy středně zelené. Úbory středně velké, žluté, středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — C bílý

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, středně větvičité. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším až středním hnědočerveným stínováním, listy středně zelené. Úbory malé až střední, bílé, jednotlivé květy u báze žluté, středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — D bílý

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším hnědočerveným stínováním, listy středně zelené. Úbory malé, bílé, jednotlivé květy u báze žluté, středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — F bílý

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším hnědočerveným stínováním, listy středně až tmavě zelené. Úbory malé až střední, bílé, jednotlivé květy u báze žluté (žlutá zasahuje téměř do poloviny květu), středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — G purpurově růžový

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším až středním červenohnědým stínováním, listy středně až tmavě zelené. Úbory malé, purpurově růžové, přemýté purpurově fialovou, jednotlivé květy k bázi bílé, báze žlutá. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — H karmínově růžový

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké až střední, keřovité, silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným slabším červenohnědým stínováním, listy tmavě zelené. Úbory malé, karmínově růžové, špičky karmínově červené, jednotlivé květy báze žlutooranžová. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — J světle růžový

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny nízké, keřovité, slabě až středně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným středním červenohnědým stínováním, listy středně zelené. Úbory malé, světle růžové s tmavším lemem, jednotlivé květy báze žlutá. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — K purpurově fialový

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny střední, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným středním červenohnědým stínováním, listy středně až tmavě zelené. Úbory malé až střední, purpurově fialové, jednotlivé květy báze tmavě purpurově červená. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — L šarlatově červený

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny malé, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným středním červenohnědým stínováním, listy středně až tmavě zelené. Úbory malé, šarlatově červené. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

Harlekýn — M červený

Odrůda s jednoduchým typem úboru.

Rostliny malé, keřovité, středně až silně větvičí. Stonek pevný, středně zelený s nepravidelným středním červenohnědým stínováním, listy středně až tmavě zelené. Úbory malé až střední, červené. Středové květy žlutooranžové.

Odrůda je určena výlučně jako komponent syntetických populací.

O z n á m e n í
o změně názvu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky
k 1. červenci 1999

Ve sloupcích jsou uvedeny následující údaje:

- 1 – identifikační číslo odrůdy
- 2 – udržovatel odrůdy a žadatel
- 3 – zmocněný zástupce
- 4 – původní název odrůdy
- 5 – nový název odrůdy
- 6 – datum rozhodnutí o změně názvu

Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

OLEJNINY A PŘADNÉ ROSTLINY

ŘEPKA

Brassica napus L. (partim)

- ozimá

BRN2377	697	268	Arta	Magnum	11.06.1999
---------	-----	-----	------	--------	------------

JMÉNA A ADRESY UDRŽOVATELŮ ODRŮD, ŽADATELŮ A ZMOCNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ

Kód:	Jméno:	Adresa:
268	Novartis Seeds, s.r.o.	294 46 Semčice
697	Novartis Seeds GmbH	Postfach 3264, 32076 Bad Salzuflen, SRN

**Přehled odrůd, jejichž popisy byly dodány k uložení
podle § 25 zákona č. 92/1996 Sb.**

Název odrůdy	Udržovatel	Pozn.	Název odrůdy	Udržovatel	Pozn.
TRÁVY					
Smělek štíhlý					
<i>Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes</i>					
Barkoel	497				
ZELENINY					
Meloun vodní					
<i>Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai</i>			Tykev fíkolistá		
Kosť	239	H	<i>Cucurbita ficifolia C. Bouché</i>		
			TF 1/93	239	
Salát listový k řezu					
<i>Lactuca sativa L. var. crispata</i>			Tykev obecná		
Dubagold	239		<i>Cucurbita pepo L.</i>		
Dubared	239		Delikates	239	
Karmína	239		Gold	239	H
Robin	239		Greenstar	239	H
Rosana	239		Jigo	239	
Roset	239		Tykev velkoplodá		
Zlatava	239		<i>Cucurbita maxima Duch.</i>		
Zoltán	239		Cristal	239	
			Kompakt	239	
Vysvětlivka: H – hybrid F1					
OKRASNÉ ROSTLINY					
Chryzantéma zahradní					
<i>Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitamura</i>			Netýkavka novoguinejská		
Eva	242		<i>Impatiens hawkeri (Impatiens-Neu-Guinea-hybriden)</i>		
Hana	242		Anka	242	
Hela	242		Fana	242	
Ivana	242		Irma	242	
Jana	242		Marta	242	
Jarka	242		Nela	242	242
			Olga	242	
Kalanchoe			Roza	242	
<i>Kalanchoe x hybrida hort.</i>			Valja	242	
Andy	242		Zora	242	
Elan	242		Pěnišník		
Kato	242		<i>Rhododendron L.</i>		
Manda	242		Lenora	242	
Retro	242		Loreta	242	
Veno	242		Prof. Schulz	242	

JMÉNA A ADRESY UDRŽOVATELŮ ODRŮD

Kód:	Jméno:	Adresa:
239	SEMO s.r.o.	Smržice 414, 798 17 Smržice
242	Výzkumný ústav okrasného zahradnictví	252 43 Průhonice u Prahy
497	Barenbrug Holland B.V.	Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout, Nizozemsko

V Praze 14.10.1999

Zveřejnění o vydaných rozhodnutích o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení ve 3. čtvrtletí r. 1999

V souladu s ustanovením § 10 písm. c) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech v platném znění, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení:

Vysvětlivky použitých zkratk

ATC: Anatomicko-terapeutická klasifikace

B: Balení

DR: Držitel rozhodnutí o registraci

IS: Indikační skupina

OL: Ochranná lhůta

PE: Doba použitelnosti (v měsících)

PP: Popis (vzhledu) přípravku

PR: Registrace prodloužena do

RP: Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře

S: Složení

V: Výrobce

VP: Přípravek je volně prodejný

ZS: Způsob skladování

Nově registrované veterinární přípravky

• RP 97/039/99-C

AVINAK NGBER inj. ad us. vet.

Inaktivovaná olejová vakcína proti pseudomoru, infekční burzitidě, infekční bronchitidě, infekčnímu poklesu snášky u drůbeže a aviárním reovírům. Je určena k vakcinaci nosnic před začátkem snášky za účelem dosažení imunity a zároveň ochrany kuřat v prvních dnech života protilátkami přenášenými vaječným žloutkem.

V:MEVAK akciová společnost, 949 91 Nitra

DR:MEVAK akciová společnost, 949 91 Nitra

S:Jedna vakcinační dávka (0,8 ml) obsahuje:

Paramyxovirus pseudopestis avium ante inactivatum

min. $10^{9,0}$ EID₅₀

Virus burzitidis infectiosae avium ante inactivatum

min. $10^{6,5}$ EID₅₀

Virus bronchitidis infectiosae avium ante inactivatum

min. $10^{8,0}$ EID₅₀

Adenovirus EDS 76 ante inactivatum

min. 1 280 HA

Reovirus avium ante inactivatum

min. $10^{6,0}$ TCID₅₀

formaldehyd, tiomersal a Montanide ISA 70.

PP:Homogenní bílá neprůhledná tekutina.

IS:Veterinární imunopreparát

ATC:Q15AA

B:Jedna lékovka o objemu 100 ml.

Jedna NTS láhev o objemu 300 ml nebo 500 ml.

OL:Bez ochranných lhůt.

PE:12

ZS:Při teplotě +2 °C až + 8 °C, v suchu, chránit před světlem, nezmrazovat.

ŽÁDOST

o vydání pověření pro provádění odběru vzorků agrochemického zkoušení půd

Obchodní jméno / jméno:

Sídlo / bydliště:

IČO / rodné číslo:

Telefon:

Fax:

Jméno odpovědného pracovníka:

Údaje o vzdělání odborných pracovníků:

Údaje o technickém vybavení:

Zájmová oblast (okresy):

_____ podpis žadatele — odpovědného pracovníka

V dne

• **RP 97/015/99-C**

BIO REO 2 inj. sicc. ad us. vet.

Živá lyofilizovaná vakcína proti virové artritidě (inf. tenosynovitidě)

*V:** Merial, Italia S.p.A. - 27013 Chignolo PO, Italia

*DR:** Merial, Italia S.p.A. - 27013 Chignolo PO, Italia

*S:** Vakcína obsahuje Reovirus avium (S 1133), minimálně 10^4 TCID₅₀ v jedné dávce, pomnoženého na buněčných kulturách kuřecích embryonálních fibroplastů, pepton a laktózu.

*PP:** Porézní lyofilizát smetanově bílé barvy. Zředovač je čirá bezbarvá tekutina bez sedimentu.

*IS:** Veterinární imunopreparát.

*ATC: Q15AA

*B:** Lahvičky 10 x 1000 dávek + 10 x ředidlo 200 ml.

*OL:** Bez ochranných lhůt.

*PE:** 24

*ZS:** Vakcína při + 2 až + 8 °C. Ředidlo v chladu a temnu.

• **RP 97/041/99-C**

GUMBOVAX PLUS lyof. ad us. vet.

*V:** Merial, Italia S.p.A. - 27013 Chignolo Po, Italia.

*DR:** Merial, Italia S.p.A. - 27013 Chignolo Po, Italia.

*S:** Virus bursitidis infectiousae avium min. 10^4 TCID₅₀ (phyl.S-706) v 1 dávce. Pepton, sacharóza.

*PP:** Lyofilizát žlutorůžové barvy.

*IS:** Veterinární imunopreparát

*ATC: Q15AA

*B:** Lékovka 1000, 2000 a 5000 dávek.

*OL:** Bez ochranných lhůt.

*PE:** 24

*ZS:** Při teplotě +2 až + 8 °C.

• **VP 96/037/99-C**

NOLVASAN OTIC CLEANSING sol. ad us. vet.

roztok na čištění uší

*V:** Fort Dodge Animal Health, USA.

*DR:** Fort Dodge Animal Health

(CYANAMID GmbH, Division of American Home Products Corporation, a-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9), Österreich.

*S:** Přípravek obsahuje v 1 ml:

Alcohol Isopropylicus 50,0 mg

Dále: Triton X-100, Propylenglycolum, Linalylacetatum,

FD&C Blue Nr. 1, Aqua purif.

*PP:** Čirý modrý až modrozelený roztok.

*IS:** Veterinaria-pharmaceutica: Vet. otologica.

*ATC: Q11AB

*B:** Lékovky o obsahu 60 ml, 118 ml, 130 ml a 472 ml.

*OL:** Přípravek není určen pro potravinová zvířata.

*PE:** 36

*ZS:** Přípravek se skladuje při teplotě 15 °C až 30 °C.

• **RP 97/033/99-C**

TRICHOBIN inj. ad us. vet.

*V:**Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané.

*DR:**Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané.

*S:**1 ml: Trichophyton verrucosum N. 765 inact., Trichophyton verrucosum N. 8166 inact., Trichophyton mentagrophytes N. 202 inact. – min. 20×10^6 konidii, formaldehyd, voda pro inj.

*PP:**Homogenní nahnědlá suspenze tvořící sediment.

*IS:**Veterinární imunopreparát.

*ATC:Q15AA

*B:**5 x 10 ml, 5 x 20 ml, 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

*OL:**Maso 14 dní.

*PE:**12

*ZS:**V suchu a temnu při teplotě 2 až 8 °C.

• **VP 99/028/99-C**

VALIANT BARRIER sol. + VALIANT CATALIST sol. ad us. vet.

*V:**HENKEL-ECOLAB, Chalons-en-Champagne Francie.

*DR:**Henkel- Ecolab spol. s r.o., Jakubské nám. 1, 602 00 Brno.

*S:**a)V. Barrier – účinná látka- 3,25 % kyselina mléčná (Acidum lacticum) 80 %

- pomocné látky- Xanthani gummi; Sorbitolum 70 % non cristall.; Kalii benzoas; Acidum a-alkylbenzensulfon; Kalii hydroxidum; Color; Adeps lanae oxyethylenatus; Alcohol polyvinyllicus; Aqua purificata.

b)V.Catalyst – účinná látka – 6,25 % Chloritan sodný (Natrii chloris) stabilizovaný

- pomocná látka – Aqua purificata.

*PP:**a) Čirý roztok tmavězelené barvy.

b) Bezbarvý až nažloutlý čirý roztok.

*IS:**Veterinaria varia

*ATC:Q04BA

*B:**Umělohmotné kanystry – V. Barrier: 10 l, 20 l, 60 l, 200 l.

V. Catalyst: 1 l, 5 l.

*OL:**Bez ochranných lhůt.

*PE:**U obou složek – báze i aktivátoru – je doba použitelnosti 12 měsíců.

*ZS:**Při teplotě 0 – 40 °C.

• **VP 99/029/99-C**

VALIANT TEAT DIP sol. + VALIANT CATALIST sol. ad us. vet.

*V:**HENKEL-ECOLAB, Chalons-en-Champagne Francie.

*DR:**Henkel- Ecolab spol. s r.o., Jakubské nám. 1, 602 00 Brno.

*S:**V.Teate Dip – účinná látka- 3,25 % kyselina mléčná (Acidum lacticum) 80 %

- pomocné látky- Xanthani gummi; Sorbitolum 70 % non cristall.; Kalii benzoas; Acidum a-alkylbenzensulfon; Kalii hydroxidum; Color; Adeps lanae oxyethylenatus; Alcohola C 12-16 oxyethylenata; Aqua purificata.

V.Catalyst – účinná látka – 6,25 % Chloritan sodný (Natrii chloris) stabilizovaný

- pomocná látka – Aqua purificata.

*PP:**a) Čirý roztok tmavězelené barvy.

b) Bezbarvý až nažloutlý čirý roztok.

*IS: *Veterinaria varia.

*ATC: Q04BA

*B: *Umělohmotné kanystry — V. Teat Dip: 10 l, 20 l, 60 l, 200 l.
V. Catalyst: 1 l, 5 l.

*OL: *Bez ochranných lhůt.

*PE: *U obou složek — báze i aktivátoru — je doba použitelnosti 12 měsíců.

*ZS: *Při teplotě 0 — 40 °C.

Prodloužení registrace

***AMPROL PLUS prm. ad us. vet.**

*DR: Merial S.A.S., Francie.

**B: 5 kg, 10 kg, 25 kg, 50 kg.

*RČ: 98/243/92-C

*PR: 2002

***BIOVERM sol. ad us. vet.**

*DR: Bioveta, a.s., ČR.

**B: 1000 ml, 10 x 1000 ml.

*RČ: 10/350/71-C

*PR: 2003

***BIOVERM tabl. ad us. vet.**

*DR: Bioveta, a.s., ČR.

**B: 30 tbl., 1000 tbl..

*RČ: 99/173/84-C

*PR: 2003

***ERYTHROMYCIN inj. ad us. vet.**

*DR: Bioveta, a.s., ČR.

**B: 50 ml

*RČ: 99/150/78-C

*PR: 2004

***IVOMEK 0,6 % prm. ad us. vet.**

*DR: Merial S.A.S., Francie.

**B: 5 kg, 25 kg.

*RČ: 98/447/93-C

*PR: 2003

***KETAZON ung. ad us. vet.**

*DR: Léčiva a.s., ČR.

**B: 50 g.

*RČ: 99/168/78-C

*PR: 2003

***LECTADE PLUS plv. sol. ad us. vet.**

***DR:** Pfizer Animal Health, ČR.

****B:** 12 x sáček A, 12 x sáček B
48 x sáček A, 48 x sáček B.

***RČ:** 96/521/94-C

***PR:** 2004

***LYSVULPEN por. ad us. vet.**

***DR:** Bioveta, a.s., ČR.

****B:** 1 x 20 dávek, 1 x 60 dávek, 10 x 40 dávek, 30 x 20 dávek, 12 x 60 dávek.

***RČ:** 97/234/93-C

***PR:** 2003

***NOVACOC FORTE inj. ad us. vet.**

***DR:** Richter Pharma C. Richter GesmbH & Co KG, Rakousko.

****B:** 250 ml.

***RČ:** 96/238/93-C

***PR:** 2003

***REHYVET plv. ad us. vet.**

***DR:** Univit s.r.o., ČR.

****B:** 10 x 300 g.

***RČ:** 99/219/76-C

***PR:** 2003

***SYNULOX PALATABLE TABLETS 250 mg ad us. vet.**

***DR:** Pfizer Animal Health, Belgie.

****B:** 10, 25 nebo 50 blistrů á 10 tbl.

***RČ:** 96/1178/93-C

***PR:** 2003

***SYNULOX PALATABLE TABLETS 50 mg ad us. vet.**

***DR:** Pfizer Animal Health, Belgie.

****B:** 10, 25 nebo 50 blistrů á 10 tbl.

***RČ:** 96/1177/93-C

***PR:** 2003

***SYNULOX RTU inj. ad us. vet.**

***DR:** Pfizer Animal Health, ČR.

****B:** 40 ml, 6 x 40 ml, 12 x 40 ml, 100 ml, 6 x 100 ml, 1 x 250 ml.

***RČ:** 96/036/94-C

***PR:** 2004

***TERRAMYCIN LA inj. ad us. vet.**

***DR:** Pfizer Animal Health, ČR.

****B:** 100 ml, 250 ml.

***RČ:** 96/984/93-C

***PR:** 2003

***VARIDOL FUM sol., proužky ad us. vet.**

***DR:** Výzkumný ústav včelařský s.r.o., ČR.

****B:** 5 ml a 5 fum. proužků.

***RČ:** 96/238/94-C

***PR:** 2004

Změny registrace

***AMPICLOX LACTATING COW susp. ad us. vet.**

***DR:** *Pfizer Animal Health, ČR.

***RČ:** *96/255/91-C

***V:** **dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

***nově:** Pfizer Animal Health, Itálie.

***ZS:** *dosud: Při teplotě 5 – 15 °C.

***nově:** Při teplotě 15 – 25 °C.

***ANTISEDAN inj. ad us. vet.**

***DR:** *Pfizer Animal Health, Belgie.

***RČ:** *96/126/98-C

***PE:** *dosud: 60

***nově:** 36

***AUREOMIX – 150 plv. ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Cymedica, spol. s r. o., ČR

***nově:** ANICO, spol. s r.o., ČR.

***RČ:** *96/1352/97-C

***AUREOMIX 200 S premix ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Cymedica, spol. s r. o., ČR

***nově:** ANICO, spol. s r.o., ČR.

***RČ:** *98/185/98-C

***AUREOMIX 133 T premix ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Cymedica, spol. s r. o., ČR

***nově:** ANICO, spol. s r.o., ČR.

***RČ:** *98/165/98-C

***AUREO – SPRAY 1 % spray ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Cymedica, spol. s r. o., ČR

***nově:** ANICO, spol. s r.o., ČR.

***RČ:** *96/195/97-C

***AUREOZÁSYP 2 % plv. ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Cymedica, spol. s r. o., ČR

***nově:** ANICO, spol. s r.o., ČR.

***RČ:** *96/523/96-C

***BURSAL DISEASE-MAREK'S DISEASE VACCINE inj. ad us. vet.**

***(BUR-CELL 1+1)**

***DR:** *dosud: Merial S:A:S., Francie

***nově:** Merial SELECT, USA.

***RČ:** *97/134/98-C

***CALCIUM 10 % HERBAVET gel ad us. vet.**

***V: + DR:** *dosud: Herbacos spol. s r.o., ČR.

***nově:** Herbacos-BOFARMA s.r.o., ČR.

RČ:96/179/98-C dosud: vázán na předpis
nově: bez předpisu

***EURICAN DHPPi2 inj. sicc. ad us. vet.**

DR:Merial SAS, Francie.

RČ:97/03/98-C

*S: **dosud:	Virus febris contagiosae canis.....	..min. $10^{3,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀
nově:	Virus febris contagiosae canis.....	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,9}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀

***EURICAN DHPPi2 – L inj. sicc. ad us. vet.**

DR:Merial SAS, Francie.

RČ:97/05/98-C

*S: **dosud:	lyofilizovaná složka (EURICAN DHPPi2)	
	Virus febris contagiosae canis.....	..min. $10^{3,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀
	tekutá složka (LEPTODOG):	
	Leptospira canicola inact.	V dostatečné dávce dle
	Leptospira icterohaemorrhagiae inact.	Evropského lékopisu.
nově:	Virus febris contagiosae canis.....	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,9}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀
	Leptospira canicola inact.	V dostatečné dávce dle
	Leptospira icterohaemorrhagiae inact.	Evropského lékopisu

***EURICAN DHPPi2-LR inj. sicc. ad us. vet.**

DR:Merial SAS, Francie.

RČ:97/026/98-C

*S: **dosud:	lyofilizovaná složka (EURICAN DHPPi2)	
	Virus febris contagiosae canis.....	..min. $10^{3,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀
	tekutá složka (LEPTORABISIN):	
	Leptospira canicola inact.	V dostatečné dávce dle
	Leptospira icterohaemorrhagiae inact.	Evropského lékopisu.
	Virus rabiei inact.	min. 1 IU
	Thiomersalum	0,1 mg
	Algedratum	0,6 mg
nově:	Virus febris contagiosae canis.....	min. $10^{4,0}$ CCID ₅₀
	Virus laryngotracheitidis contagiosae canis.....	min. $10^{2,5}$ CCID ₅₀
	Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,9}$ CCID ₅₀
	Virus parainfluenzis canis	min. $10^{4,7}$ CCID ₅₀

Leptospira canicola inact.
Leptospira icterohaemorrhagiae inact.
Virus rabiei inact.
Thiomersalum
Algedratum

V dostatečné dávce dle
Evropského lékopisu.
..... min. 1 IU
..... 0,1 mg
..... 0,6 mg

***FLUMIQUIL 50 % plv. ad us. vet.**

*DR: *Sanofi Animal Health Slovakia, spol. s r.o., SR.

*RČ: *96/193/97-C

*B: *dosud: 1 x 100 g.

*nově: 100 g, 1 kg.

***GAMARET NEO susp. ad us. vet.**

*DR: *dosud: Infusia a.s. Hořátek, ČR.

*nově: Bioveta a.s., ČR:

*RČ: *96/198/97-C

***KOLIBIN inj. ad us. vet.**

*DR: *Bioveta, a.s., ČR.

*RČ: *97/807/92-C

*PE: *dosud: 12

*nově: 24

***KOLISIN inj. ad us. vet.**

*DR: *Bioveta, a.s., ČR.

*RČ: *97/200/91-C

*PE: *dosud: 12

*nově: 24

***LYSVULPEN por. ad us. vet.**

*DR: *Bioveta, a.s., ČR.

*RČ: *97/234/93-C

*PP: *dosud: Návnada je hnědočerné barvy, tvaru kostky, pevné konzistence. Uvnitř návnady je uložena plastická tobolka (blister) s vícejazyčným potiskem „Pozor – vakcína proti vzteklině“. Obsah tobolky (vakcinační antigen se stabilizačním médiem) je tekutina načervenalé barvy.

*nově: Návnada je hnědočerné barvy, tvar kostky nebo kulatý, pevné konzistence. Uvnitř návnady je uložena plastická tobolka (blister), uzavřená aluminiovou fólií s vícejazyčným potiskem „Pozor – vakcína proti vzteklině“. Obsah tobolky (vakcinační antigen se stabilizačním médiem) je tekutina načervenalé barvy.

*B: *dosud: 1 x 60 dávek, 1 x 20 dávek, 12 x 60 dávek, 30 x 20 dávek, 10 x 40 dávek.

*nově: 1 x 20 dávek, 30 x 20 dávek, 10 x 40 dávek.

***MEBENDAZOL 10 % premix ad us. vet.**

*DR: *Biopharm, VÚBVL, a.s., ČR.

*RČ: *98/1062/97-C

*PE: *dosud: 12

*nově: 24

***MIKASAN CU sol. ad us. vet.**

*DR: *Mika a.s., ČR.

*RČ: *96/059/98-C

*PE: *dosud: 6

*nově: 12

***MIKASAN JD sol. ad us. vet.**

DR:Mika a.s., ČR.

RČ:96/043/98-C

PE:dosud: 6

***nově:** 12

***MIOCOL plv. ad us. vet.**

DR:Bremer Pharma GmbH., SRN.

RČ:96/167/98-C

B:dosud: 100 g, 1 kg.

***nově:** 100 g, 1 kg, 20 kg.

***NOLVASAN SHAMPOO sol. ad us. vet.**

DR:Fort Dodge Animal Health.

RČ:96/090/98-C

B:dosud: 236 ml.

***nově:** 236 ml, 3,7 ml.

***ORBENIN EXTRA DRY COW susp. ad us. vet.**

DR:Pfizer Animal Health, ČR.

V:dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

***nově:** Pfizer Animal Health, Itálie.

RČ:96/257/91-C

ZS:dosud: Při teplotě 5 – 15 °C.

***nově:** Při teplotě 15 – 25 °C.

***ORBENIN DRY COW susp. ad us. vet.**

DR:Pfizer Animal Health, ČR.

V:dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

***nově:** Pfizer Animal Health, Itálie.

RČ:96/256/91-C

ZS:dosud: Při teplotě 5 – 15 °C.

***nově:** Při teplotě 15 – 25 °C.

***dosud: POULVAC i-NIG inj. ad us. vet.**

***nově:** **PROVAV 3 inj. ad us. vet.**

DR:Fort Dodge Animal Health.

RČ:97/683/92-C

***dosud: POULVAC ND HITCHNER B1 lvof. ad us. vet.**

***nově:** **NEWCASTLE DISEASE VACCINE B1 TYPE.**

B STRAIN, LIVE VIRUS ad us. vet.

DR:Fort Dodge Animal Health.

RČ:97/272/95-C

***RIMADYL 50 mg tbl. ad us. vet.**

DR:dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

***nově:** Pfizer Animal Health, ČR.

V:dosud: Grampian Pharmaceuticals Ltd., Velká Británie.

***nově:** Vericore Ltd., Velká Británie.

RČ:96/028/98-C

***RIMADYL 20 mg tbl. ad us. vet.**

DR:dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

*nově: Pfizer Animal Health, ČR.

*V:**dosud: Grampian Pharmaceuticals Ltd., Velká Británie.

*nově: Vericore Ltd., Velká Británie.

*RČ:*96/027/98-C

***RIMADYL inj. ad us. vet.**

*DR:*dosud: Pfizer Animal Health, Belgie.

*nově: Pfizer Animal Health, ČR.

*V:**dosud: Grampian Pharmaceuticals Ltd., Velká Británie.

*nově: Vericore Ltd., Velká Británie.

*RČ:*96/135/98-C

***SKALIOMUTIN 10 % prm. ad us. vet.**

*DR:*dosud: Cymedica s.r.o., ČR.

*nově: Anico s.r.o., ČR.

*V:**dosud: Cymedica s.r.o., ČR.

*nově: Anico s.r.o., ČR.

*RČ:*98/164/98-C

***TRISULMIX LIQUIDE sol. ad us. vet.**

*DR:*dosud: Merial S.A.S., Francie.

*nově: Coopvet, Francie.

*V:**Coopvet, Francie.

*RČ:*96/016/98-C

***TUCOPRIM plv. sol. ad us. vet.**

*DR:*Pharmacia & Upjohn, Belgie.

*V:**dosud: Pharmacia & Upjohn, Belgie.

*nově: Grampian Pharmaceuticals Ltd., Velká Británie.

*RČ:*96/1407/97-C

*OL:*dosud: maso prasat 5 dní, maso drůbeže 24 hodin.

*nově: maso prasat 5 dní, maso drůbeže 5 dní (nepoužívat u nosnic, jejichž maso je určeno pro lidský konzum).

*dosud: **WELPAN susp. ad us. vet.**

*nově: **DRONTAL PUPPY susp. ad us. vet.**

*DR:*Bayer s.r.o., ČR.

*RČ:*96/1158/97-C

*dosud: je vázán na recept.

*nově: není vázán na recept.

Zrušení registrace

***AGRAMELK-koncentrát sol. ad us. vet.**

*DR:*Agraria Pharma GmbH., SRN.

*RČ:*96/801/93-C

ALBAC 10 % plv. ad us. vet.

*DR:*Lohman Animal Health GmbH., ČR.

*RČ:*96/946/95-C

***ALBAC 10 % Lactodispersible plv. ad us. vet.**

*DR:*Lohman Animal Health GmbH., ČR.

*RČ:*96/947/95-C

*ALBAC 15 % gran. ad us. vet.

*DR:*Lohman Animal Health GmbH., ČR.

*RČ:*96/948/95-C

*CANVAC D inj. sicc. ad us. vet.

*DR:*Dyntec spol. s r.o., ČR.

*RČ:*97/749/94-C

*CANVAC DHL inj. sicc. ad us. vet.

*DR:*Dyntec spol. s r.o., ČR.

*RČ:*97/751/94-C

*CANVAC DPL inj. sicc. ad us. vet.

*DR:*Dyntec spol. s r.o., ČR.

*RČ:*97/747/94-C

*CANVAC H inj. sicc. ad us. vet.

*DR:*Dyntec spol. s r.o., ČR.

*RČ:*97/746/94-C

*CANVAC L inj. sicc. ad us. vet.

*DR:*Dyntec spol. s r.o., ČR.

*RČ:*97/745/94-C

*FEBRIGLOB inj. ad us. vet.

*DR:*Bioveta, a.s., ČR.

*RČ:*97/502/94-C

*FEBRIPUR inj. ad us. vet.

*DR:*Bioveta, a.s., ČR.

*RČ:*97/504/94-C

*LIVOL liquid sol. ad us. vet.

*DR:*Indian Herbs (CZ) s.r.o., ČR.

*RČ:*96/694/95-C

*NEODICOL 250 EC sol. ad us. vet.

*DR:*Novartis, Švýcarsko.

*RČ:*96/647/93-C

Ing. Stanislav Kozák, v.r.
ředitel odboru zemědělské výroby

Doc.MVDr.Alfred Hera,CSc., v.r.
ředitel ÚSKVBL

Státní veterinární správa ČR
Těšnov 17, Praha 1

Vyřizuje : Mgr. Ing. Jaroslav S o u č e k
Vedoucí právního a personálního odboru SVS ČR

V Praze dne 13.10.1999

Věc: SVS ČR – oznámení o povolení výjimky

Státní veterinární správa České republiky jako orgán příslušný podle § 31 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhodnutím č.j. RED 1178/99 ze dne 13.10.1999 povolila výjimku na jednorázový dovoz pěti balení léčivého přípravku LYSODREN tbl., výrobce Bristol Myers Squibb Comp. a jeho používání pro léčbu hyperadrenokorticismu – Cushingova syndromu u psů společnosti VEDILAB spol. s r.o., veterinární laboratoři a klinice, Pod vrchem 51, 312 80 Plzeň, zást. MVDr. Karlem Böhmlem, podle ust. § 11 písm. a) bodu 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

MVDr. Josef Holejšovský, v.r.
pověřený výkonem funkce
ústředního ředitele

V Praze dne 12.11.1999

**Seznam právnických a fyzických osob,
které mohou na základě souhlasu uděleného podle § 50 odstavce 3 zákona č. 79/1997 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů,
příslušným úřadem provádět zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv.**

Dne 16.9.1998 - OkÚ České Budějovice udělil pod č.j. 7655/98-249/PRRAD/1-Med. souhlas
k zneškodňování nepoužitelných veterinárních léčiv firmě:

EKOKOMBEK s.r.o.
Husova 103
370 05 České Budějovice
IČO :251 51 274



Ing. Stanislav Kozák, v.r.
ředitel odboru zemědělské výroby

Státní veterinární správa ČR
Těšnov 17, Praha 1

Vyřizuje: Mgr. ing. Jaroslav S o u č e k
vedoucí právního a personálního odboru SVS ČR

V Praze dne 17. 11. 1999

Věc: SVS ČR — oznámení o povolení výjimky

Státní veterinární správa ČR jako orgán příslušný podle § 31 odst. 1 zák. č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhodnutím č.j. Ře 1174/99 ze dne 12. 11. 1999 povolila výjimku na jednorázový dovoz sedmi orig. balení léčivého přípravku LYSODREN tbl., 100×500 mg výrobce Bristol Myers Squibb Comp. a jeho používání pro léčbu hyperadrenokorticismu — Cushingova syndromu u psů Veterinární nemocnici Libuš, se sídlem Na Šejdru 45, 142 00 Praha 4, zastoupené MVDr. Vojtěchem Novákem, r.č. 680610/0983, bytem Voskovcova 933, 152 00 Praha 5, IČO 61478261, podle ust. § 11 písm. a) bodu 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.

MVDr. Josef Holejšovský, v.r.
pověřený výkonem funkce
ústředního ředitele SVS ČR