

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor strukturální politiky a rozvoje venkova – 7030

Vyřizuje: Ing. Leibl, linka 2056
Čj.: 29453/01-7030

V Praze, dne: 1. 8. 2001

Oznámení o znění identifikačního kódu kontrolního orgánu pro ekologické zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, podle § 35 vyhlášky MZe č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že identifikační kód kontrolního orgánu ekologického zemědělství (organizace KEZ o. p. s. – Kontrola ekologického zemědělství, obecně prospěšná společnost) je: CZ-KEZ

Ing. Martin Fantýš v. r.
ředitel odboru 7030

Státní veterinární správa ČR
Tešnov 17, Praha 1.

Vyřizuje: Ing. Jaroslav S o u č e k
vedoucí právního a personálního odboru

V Praze dne 3. 9. 2001

Věc: SVS ČR – oznámení o povolení výjimky

Státní veterinární správa ČR jako orgán příslušný podle § 11 písm. a) bod 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhodnutím č.j. Ře 1276/2001 ze dne 20. 8. 2001 **povolila výjimku** na jednorázový dovoz **léčivého přípravku LYSODREN tbl.**, výrobce Bristol – Myers – Squibb Company, panu MVDr. Vojtěchu Novákovi, Voskovcova 933, 152 00 Praha 5, určeného pro terapii hyperadrenocorticismu / tzv. Cushingův syndrom / psů, podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.

MVDr. Josef H o l e j š o v s k ý v. r.
ústřední ředitel

Státní veterinární správa ČR
Těšnov 17, Praha 1

Vyřizuje: Ing. Jaroslav S o u č e k
vedoucí právního a personálního odboru

V Praze dne 3. 9. 2001

Věc: SVS ČR – oznámení o povolení výjimky

Státní veterinární správa ČR jako orgán příslušný podle § 11 písm. a) bod 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhodnutím č.j. Ře 1282/2001 ze dne 20. 8. 2001 povolila výjimku na jednorázový dovoz léčivého přípravku **LYSODREN tbl.**, výrobce Bristol – Myers – Squibb Company, panu MVDr. Radanu Šimkovi, Vlkančice 60, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, určeného pro terapii hyperadrenocorticismu / tzv. Cushingův syndrom / psů, podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.

MVDr. Josef Holejšovský v. r.
ústřední ředitel

Státní veterinární správa ČR
Těšnov 17, Praha 1

Vyřizuje: Ing. Jaroslav S o u č e k
vedoucí právního a personálního odboru

V Praze dne 18. 9. 2001

Věc: SVS ČR – oznámení o povolení výjimky

Státní veterinární správa ČR jako orgán příslušný podle § 11 písm. a) bod 1 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhodnutím č. j. Ře 1553/2001 ze dne 17. 9. 2001 povolila výjimku na jednorázový dovoz **vitamínového přípravku MYOGASTER-E inj. a. u. v.**, výrobce V. M. D. n. v. , 2370 Arendonk, Belgie, firmě PHRAMED, s. r. o., se sídlem Mendelova 32, 742 35 Odry, zast. osobou odborně způsobilou, panem MVDr. Dušanem Hrachovcem; podle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 79/1997 Sb.

MVDr. Josef H o l e j š o v s k ý v. r.
ústřední ředitel

V Praze dne 18. 7. 2001

**Zveřejnění seznamu vydaných rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků,
jejich změny, prodloužení a zrušení za 2. čtvrtletí r. 2001**

V souladu s ustanovením § 10 písm. c) zákona č. 79/1997Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje vydaná rozhodnutí o registraci veterinárních léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení a zrušení:

Vysvětlivky použitých zkratk	
ATC: Anatomicko-terapeutická klasifikace	PR: Registrace prodloužena do
B: Balení	RP: Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře
DR: Držitel rozhodnutí o registraci	S: Složení
IS: Indikační skupina	V: Výrobce
OL: Ochranná lhůta	VP: Přípravek je volně prodejný
PE: Doba použitelnosti	ZS: Způsob skladování
PP: Popis (vzhledu) přípravku	

Nově registrované veterinární přípravky

■ RP 96/027/01-C

ABAMITEL™ LA inj. ad us. vet.

- DR: Krka, d. d., Slovinsko.
V: Krka, d. d., Slovinsko.
S: Účinná látka: Abamectinum 10 mg v 1 ml olejového injekčního roztoku.
Pomocné látky: Benzylalkohol, ethyloléat, sezamový olej.
IS: Antiparazitikum.
ATC: Q09CX
PP: Čirý olejový roztok žlutohnědé barvy.
B: Polštářkové PE obaly s kaučukovými zátkami po 50 ml roztoku.
Polštářkové PE obaly s kaučukovými zátkami po 250 ml roztoku.
OL: Maso skotu 49 dní, maso ovce 21 dní. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců
ZS: Chraňte před světlem. Uchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Udržujte mimo dosah dětí.

■ RP 96/028/01-C

ABAMITEL™ PLUS oral. paste ad us. vet.

- DR: Krka, d. d., Slovinsko.
V: Krka, d. d., Slovinsko.
S: Účinné látky: Abamectinum 4 mg a Praziquantelum 50 mg v 1 ml pasty.
Pomocné látky: diethylenglykolmonopalmitostearát, ovesná mouka, disiřičitan sodný, sorbitol, glycerolformal, makrogol 400, methylparaben, propylparaben, benzylalkohol, čištěná voda.
IS: Antiparazitikum.
ATC: Q09CX
PP: Homogenní pasta světle hnědé barvy.
B: 1 x 30 ml. PE injektor s pístem a ochranným kloboučkem, baleno jednotlivě do papírové skládačky.
OL: Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců
ZS: Chraňte před světlem. Uchovávejte při teplotě 15 – 25 °C. Udržujte mimo dosah dětí.

■ RP 96/015/01-C

AMOXIVETO 15 S plv. sol. ad us. vet.

- DR: V.M.D. n.v., Berendonk 74, Belgie.
V: V.M.D. n.v., Berendonk 74, Belgie.
S: Amoxicilinum trihydricum 172,21 mg Eq. Amoxicilinum 150 mg – Natrii carbonas monohydricus – Silica colloidalis – Lactosum q. s. ad 1g.
IS: Veterinaria – pharmaceutica.
PP: Homogenní jemný bílý až světle nahnědlý sypký prášek.
B: 5 kg papírový pytel vícevrstvený, 100g, 500g a 1 kg.
OL: Maso 1 den.
PE: 2 roky. Čerstvý roztok nebo směs připravovat 2x denně.
ZS: Skladujte při pokojové teplotě 15 – 25 °C v originálním balení, v suchu.

■ **RP 96/022/01-C**

BIHELMINTH mv tbl. ad us. vet.

DR: Riemser Arzneimittel GmbH, Německo.

S: 1 tableta obsahuje:

účinné látky:

Praziquantelum 50,0 mg

Fenbendazolum 500,0 mg

pomocné látky:

Natrii laurilsulfas

Povidonum 25

Magnesii stearas

IS: Anthelmintikum.

ATC: Q09AA

PP: Bílé nebo skoro bílé tablety, kulaté, ploché, s půlicí rýhou na jedné straně.

Skladovat mimo dosah dětí.

B: 30 tablet v umělohmotné lékovce.

OL: Není určeno pro potravinová zvířata.

PE: 4 roky v neporušeném obalu.

ZS: Skladování: Při teplotě 15 – 25 °C.

■ **RP 96/021/01-C**

BIOKUBATOL spray ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

V: Bioveta, a. s., Česká republika.

S: 100 g: Fagi pix – 20 g, octan etylnatý, lfh.

IS: Veterinární dermatologikum a antipsoriaticum.

PP: Hnědá mírně opalizující až zakalená tekutina.

B: 40 g, 80 g, 160 g a 400 g – ve skleněných nebo plastových lahvičkách s mechanickým rozprašovačem.

800 g, 2400 g – jako náhradní balení v PE lahvič nebo kanystrech.

OL: Není určeno pro potravinová zvířata.

PE: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

ZS: Při teplotě do 25 °C, chráněno před světlem a zdroji sálavého tepla.

■ **RP 96/017/01-C**

CEVASOL AD3E+C sol. ad us. vet.

Retinolum, Cholecalciferolum, Alfa-Tocoferoli acetat, Acidum ascorbicum

DR: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r.o., Slovenská republika.

V: Ceva Santé Animale, La Ballastiere, Francie.

S: *Účinné látky:* Retinolum 50 000 IU, Cholecalciferolum 5 000 IU, Alfa-Tocoferoli acetat 30 g, Acidum ascorbicum 100 mg.

Pomocné látky: Propylparabenum natrium, Butylhydroxytoluenum, Macrogolum 400, Ricinomacrogolum, Natrii hydroxidum, Aqua purificata.

IS: Vitaminy.

ATC: Q01EA

PP: Opalescentní oranžově žlutý roztok.

B: 250 ml, 1 l, 5 l. Láhev z PE se šroubovacím uzávěrem.

OL: Bez ochranných lhůt.

PE: 24 měsíců. Spotřebovat do 3 dnů po rozpuštění v pitné vodě.

ZS: V originálním balení při teplotě 15 - 25 °C, chránit před světlem.

■ **RP 96/029/01-C**

CLINDAMYCIN 75 mg tbl. ad us. vet.

DR: CP-Pharma GmbH, Německo.

V: Artesan GmbH, Německo.

S: *Účinná látka:* Clindamycinu hydrochloridum monohydricum 85 mg (odpovídá 75 mg Clindamycinu).

Pomocné látky: Massa tabulettarum ad 460 mg.

IS: Antibiotikum.

ATC: Q07AK

PP: Kulaté ploché bílé tablety se skoseným okrajem a půlicí rýhou na jedné straně.

B: 10 x 10 tablet, 2 x 10 tablet.

OL: Není určeno pro potravinová zvířata.

PE: 36 měsíců.

ZS: Při teplotě 15 až 25 °C.

■ **RP 96/097/00-C**

E-FLOX sol. ad us. vet.

Přípravek s indikačním omezením

DR: VELE, spol. s r.o., Česká republika.

V: CENAVISA, S. A., Španělsko.

S: Enrofloxacinum 10,0g, Kalii hydroxidum, Natrii hydroxymethansulfinas, Aqua purificata ad 100ml.

IS: Chemoterapeutikum chinolové řady.
PP: Čirá nažloutlá kapalina.
B: 100ml, 250ml, 500ml, 1000ml.
OL: Maso 12 dní.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců. Doba použitelnosti po přimísení do pitné vody je 48 hodin.
ZS: Na tmavém místě, při teplotě 15 – 25 °C.

■ **RP97/104/00-C**

EQUILIS RESEQUIN inj. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Holandsko.
V: Intervet International B.V., Holandsko.
S: Herpesvirus equorum typ 1 (RAC-H) inac. min. 10^{7,8} TCID₅₀, Herpesvirus equorum typ 4 (2252) inac. min. 10^{6,3} TCID₅₀, Virus influentis A/equi 1/Praque1/56 inac. min. 50 mcg HA, Virus influentis A/equi 2/Newmarket/1/93 (americký typ) inac. min. 50 mcg HA, Virus influentis A/equi 2/Newmarket/2/93 (evropský typ) inac. min. 50 mcg HA v jedné dávce (2ml).
Pomocné látky: hydroxid hlinitý, Immunostim, natriumtimerfonát
IS: Veterinární imunopreparát.
ATC: Q15AA
PP: Šedobílá suspenze bez sedimentu.
B: 1x10 ml, 5x2 ml (v předpíněných stříkačkách)
OL: Bez ochranných lhůt.
PE: 24 měsíců, po otevření 8 hodin (1 pracovní den), aby se zabránilo kontaminaci a/nebo snížení účinnosti.
Nepoužívejte po uplynutí data expirace vyznačeného na obalu.
ZS: Při teplotě 2 – 8 °C, chránit před slunečním zářením. Nesmí zmraznout.

■ **RP96/024/01-C**

EXCENEL RTU inj. ad us. vet.

Přípravek s indikačním omezením

DR: Pharmacia & Upjohn N.V. / S. A., Belgie.
V: Pharmacia & Upjohn N.V. / S. A., Belgie.
S: Cefitofurum (ut hydrochloridum) 50,0 mg
Sojae lecithinum hydrogenatum
Sorbitani oleas
Gossypii oleum ad 1 ml
IS: Veterinaria pharmaceutica.
ATC: Q07AD
PP: Po protřepání neprůhledná suspenze.
B: Velikost balení: 1 x 100 ml, 10 x 100 ml.
OL: Maso prasat 5 dní.
Maso skotu 8 dní.
Mléko bez ochranné lhůty.
PE: 24 měsíců.
Po prvním použití je doba použitelnosti 28 dnů.
ZS: Uchovávat při teplotě 15 – 25 °C.

■ **RP96/012/01-C**

FLUMIGAL 5% sol. ad us. vet.

Přípravek s indikačním omezením

DR: Pharmagal, spol. s r. o., Slovenská republika.
V: Pharmagal, spol. s r. o., Slovenská republika.
S: Flumequinum 5 g, Propylenglycolum, Natrii hydroxidum, Aqua purificata ad 100 ml.
IS: Veterinaria pharmaceutica – chinolony.
ATC: Q07AX
PP: Nažloutlý roztok
B: 3x10 ml, 1x250 ml, 1x1000ml
OL: Maso telat, jehňat, kůzlat 5 dnů, maso drůbeže a králků 2 dny.
Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: 24 měsíců. Expirace po naředění v pitné vodě – 24 hodin.
ZS: Při teplotě 15 – 25 °C, v suchu, chránit před světlem.

■ **RP97/023/01-C**

FOOTVAX inj. ad us. vet.

DR: Schering-Plough Central East AG, Švýcarsko.
V: Schering Plough Animal Health, Nový Zéland.
S: Dichelobacter nodosus – Serotypy A, B1, B2, C, D, E, F, G, H každý v koncentraci 1 µg pili/ml, Dichelobacter nodosus – Serotyp I v koncentraci 5 x 10⁸ buněk/ml, Paraffinum perliquidum, Oleomannidum, Formaldehydum, Thiomersalum, Natrii chloridi solutio 0,85 % v 1 ml vakcíny.
IS: Veterinaria immunopreparata.

ATC: Q15AA
 PP: Tekutá olejová emulze.
 B: 20 ml, 50 ml a 250 ml pružná plastová láhev.
 OL: Bez ochranných lhůt.
 PE: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti je 24 měsíců. Nespotřebovanou vakcínu zlikvidujte tentýž den.
 ZS: Při teplotě 2 – 8 °C. Chraňte před světlem a mrazem.

■ RP 96/098/00-C

INDIGEST inj. ad us. vet.

DR: M+H vet s. r. o., Česká republika.
 V: Laboratorios Calier, SA, Španělsko.
 S: Menbutonium 10 g
 Diolaminum, Acidum edeticum, Natrii disulfid, Chlorocresolum, Aqua pro inj. ad 100 ml.
 IS: Veterinaria pharmaceutica.
 PP: Čirý nažloutlý vodný roztok bez viditelných částic.
 B: 30 ml a 100 ml lékovky.
 OL: Maso: 2 dny.
 Mléko: 2 dny.
 PE: 4 roky, po 1. otevření spotřebujte do 28 dní.
 ZS: Skladujte při teplotě 8 – 15 °C, v temnu.

■ RP 96/018/01-C

IVATYL OTC premix ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.
 V: Bioveta, a. s., Česká republika.
 S: 1000g:
 Tylosinum (Tylosini phosphas) – 100g, Oxytetracyclinum (oxytetracyclini dihydras) – 200 g, mouka.
 IS: Veterinaria – praemixta.
 ATC: Q07AB
 PP: Světlehnědý prášek.
 B: 0,5 kg, 3 kg, 5 kg, 10kg, 15 kg, 25 kg.
 OL: Maso – 7 dní.
 PE: Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
 ZS: V suchu, v neporušených, řádně uzavřených původních obalech při teplotě 15 – 25 °C.

■ YP 96/099/00-C

LEKASEPTAL ung. ad us. vet.

DR: Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d., Slovinsko.
 V: Lek Pharmaceutical and Chemical Company d.d., Slovinsko.
 S: 100 g masti obsahuje 3,22 g Eucalypti etheroleum, 0,16 g Myristicae etheroleum, 0,16 g Cedri etheroleum, 0,16 g Camphora, 0,08 g Mentholum, 1,21 g Lauri oleum, 0,023 g Chlorophyllum a Unguentum basale do 100 g.
 IS: Veterinaria pharmaceutica.
 ATC: Q12JA.
 PP: Zelená homogenní mast.
 B: Plastové nádoby o obsahu 350 g masti.
 OL: Bez ochranných lhůt.
 PE: 24 měsíců.
 ZS: Přípravek skladujeme při teplotě do 25 °C.

■ RP 97/009/01-C

MM- Vac inj. sicc. ad us. vet.

DR: Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.
 V: Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.
 S: 1 ml vakcíny obsahuje :
 Poxvirus myxomatosa min. 10^{4,6} TCID₅₀
 Calicivirus septicaemiae haemorrhagicae cuniculi min. 256 HA
 Thiomersalum max. 0,2 mg
 Saponinum quillaiae max. 0,25 mg
 Emulsio olei max. 0,3 ml

IS: Veterinaria immunopraeparata.

ATC: Q15AA

PP: Myxomatózní složka – lyofilizát bílé barvy porézní struktury.

Morová složka – bílá neprůhledná tekutina.

B: 1x 10 dávek, to je 1,5 ml tekuté RHD složky v jedné 3 ml lékovce a lyofilizát MXT složky v jedné 3 ml lékovce.
 6x 10 dávek, to je 1,5 ml tekuté RHD složky v šesti 3 ml lékovkách a lyofilizát MXT složky v šesti 3 ml lékovkách
 1x 40 dávek, to je 4,5 ml tekuté RHD složky v jedné 10 ml lékovce a lyofilizát MXT složky v jedné 3 ml lékovce.
 1x 80 dávek, to je 8,5 ml tekuté RHD složky v jedné 10 ml lékovce a lyofilizát MXT složky v jedné 3 ml lékovce.
 1x 160 dávek, to je 16,5 ml tekuté RHD složky v jedné 20 ml lékovce a lyofilizát MXT složky v jedné 3 ml lékovce.

6x 40 dávek, to je 4,5 ml tekuté RHD složky v šesti 10 ml lékovkách a lyofilizát MXT složky v šesti 3 ml lékovkách.
6x 80 dávek, to je 8,5 ml tekuté RHD složky v šesti 10 ml lékovkách a lyofilizát MXT složky v šesti 3 ml lékovkách.
6x 160 dávek, to je 16,5 ml tekuté RHD složky v šesti 20 ml lékovkách a lyofilizát MXT složky v šesti 3 ml lékovkách.
Smícháním obsahu 1 lékovky složky RHD a 1 lékovky složky MXT představuje odpovídající počet dávek pro i.d. aplikaci bezjehelným aplikátorem.

OL: Bez ochranných lhůt.

PE: 18 měsíců

ZS: V temnu a suchu při teplotě 2 – 8 °C.

■ RP 97/019/01-C

NOBILIS E.COLI INAC inj. ad us. vet.

Jen pro zvířata !

DR: Intervet International B. V., Nizozemsko.

V: Intervet International B. V., Nizozemsko.

S: Účinné látky: každá dávka (0,5 ml) obsahuje 100 mcg F11 – antigenu a 100 mcg FT – antigenu zárodku Escherichia coli.

Pomocné látky: tekutý parafin, polysorbát 80, sorbitanoleát, chlorid sodný, formalin, voda na injekci.

IS: Veterinární imunopreparát.

ATC: Q15AA

PP: Olejová emulze.

B: Lékovka s propichovací zátkou o objemu 500 ml (1000 dávek).

OL: Bez ochranných lhůt.

PE: 24 měsíců, po otevření spotřebujte do 10 hodin.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

ZS: Při teplotě 2 – 8°C, nesmí zmraznout.

■ 97/034/01-C

PARACOX 5 susp. ad us. vet.

DR: Schering – Plough Central East AG, Švýcarsko.

V: Schering – Plough Ltd., United Kingdom.

S: E. acervulina HP 500 – 650 sporulovaných oocyst

E. maxima CP 200 – 230 sporulovaných oocyst

E. maxima MFP 100 – 130 sporulovaných oocyst

E. mitis HP 1000 – 1300 sporulovaných oocyst

E. tenella HP 500 – 650 sporulovaných oocyst

Pufrovaný sodný fosfát do 0,004 ml (1 dávka).

IS: Veterinaria immunopreparata.

ATC: Q15AA

PP: Průsvitná vodní suspenze k perorální aplikaci postříkem na potravu.

B: 4 ml (1000 dávek) a 20 ml (5000 dávek) plastové lékovky.

ZS: Skladujte přípravek při teplotě 2 – 8°C.

Neskladujte při teplotě nižší než +2°C.

Chraňte před světlem a mrazem (jednou zmraženou vakcínu zlikvidujte).

Chraňte před dětmi.

OL: Bez ochranných lhůt.

PE: Doba použitelnosti je 27 týdnů (vakcína Paracox 5 v lékovce, která nebyla otevřena)

Roztok musí být spotřebován a kuřatům zajištěn přístup ke krmivu do 6-ti hodin od naředění.

■ RP 96/102/00-C

RUNCID susp. ad us. vet.

DR: Cp-Pharma GmbH, Německo.

V: Cp-Pharma GmbH, Německo.

S: 1 ml suspenze obsahuje:

Účinná látka: Pyranteliembonas 14,40 mg

Pomocné látky: Methylparabenum

Propylparabenum

Natrii disulfis

Natrii edetas dihydricus

Povidonum

Propylenglycolum

Antispumans emulsio

Aqua purificata

IS: Anthelminthikum

ATC: Q09AA

PP: Bílá suspenze.

ZS: Při teplotě 15 – 25 °C.

B: 60 ml v lahvičce z hnědého skla s odměrkou.

OL: Nejlépe určeno pro potravinová zvířata.

PE: 24 měsíců.

Po otevření 14 dnů

■ RP 97/020/01-C**SALENVAC inj. ad us. vet.**

Jen pro zvířata!

DR: Intervet International B. V., Nizozemsko.**V:** Intervet U. K. Ltd., Velká Británie.**S:** Salmonella enteritidis (PT 4) min. 2×10^9 v 1 ml.*Pomocné látky:* suspenze algedrátu, trometamol, maleinová kyselina, chlorid sodný, thiomersal, čištěná voda, formaldehyd.**IS:** Veterinární imunopreparát.**ATC:** Q15AA**PP:** Bílá neprůhledná tekutina.**B:** Lékovka s propichovací zátkou o obsahu 500 ml.**OL:** Bez ochranných lhůt.**PE:** 36 měsíců; po otevření spotřebujte do 10 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí data expirace vyznačeného na obalu.

ZS: Při teplotě 2 – 8 °C, chránit před světlem.**■ RP 97/007/01-C****SUIVAC ERY inj. sicc. ad us. vet.**

vaccine proti července prasat živá

DR: Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.**V:** Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.

S:	1 ml vakcíny obsahuje pro aplikaci s. c.:	Erysipelothrix rhusiopathiae avirulancia	min. CFU 10^7
		Solvens	ad 1 ml
	0,1 ml vakcíny obsahuje pro aplikaci i. d.:	Erysipelothrix rhusiopathiae avirulancia	min. CFU 10^7
		Solvens	ad 0,1 ml

IS: Veterinaria immunopraeparata.**ATC:** Q15AA**PP:** Šedobílý porézní kompaktní lyofilizát.**B:** 6x1 dávka pro s. c. aplikaci

6x 5 dávek pro i. d. aplikaci

12 x 25 dávek pro s. c. aplikaci

12x 50 dávek pro i. d. aplikaci

6x 25 dávek pro s. c. aplikaci

6x50 dávek pro i. d. aplikaci

6x 50 dávek pro s. c. aplikaci

6 x 100 dávek pro i. d. aplikaci

1 x 250 dávek pro s. c. aplikaci

1x 500 dávek pro i. d. aplikaci

Lékovky jsou v kartonové krabičce s příbalovou informací.

OL: Maso 21 dnů.**PE:** 24 měsíců.

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

ZS: V suchu a chladu při teplotě 2 – 8 °C, chránit před světlem.**■ RP 97/008/01-C****SUIVAC ERY - IN inj. sicc. ad us. vet.**

vaccine proti července prasat inaktivovaná

DR: Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.**V:** Dyntec, spol. s r. o., Česká republika.

S:	1 ml vakcíny obsahuje pro aplikaci s. c.:	Erysipelothrix rhusiopathiae inactivatum	min. 10^{10}
		Thiomersalum	max. 0,1 mg
		Formaldehydum solutum	max. 3,0 mg
		Saponinum quillaiae	max. 0,05 mg
		Emulsio olei	max. 0,15 ml
		Solvens	ad 1 ml

IS: Veterinaria immunopraeparata.**ATC:** Q15AA**PP:** Bílá až bílošedá tekutina s malým množstvím sedimentu.**B:** 5 dávek, to je 10 ml v lékovce o objemu 10 ml,

25 dávek to je 50 ml v lékovce o objemu 50 ml,

50 dávek to je 100 ml v lékovce o objemu 100 ml,

250 dávek to je 500 ml v lékovce o objemu 500 ml.

Lékovky jsou v kartonové krabičce s příbalovou informací.

OL: Bez ochranných lhůt.**PE:** 24 měsíců

Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

ZS: V suchu a chladu při teplotě 2 – 8 °C, chránit před světlem.

■ RP 97/014/01-C**SUVAXYN AR/E/EC-4 inj. ad us. vet.****DR:** Fort Dodge Animal Health, Kansas, USA.

(Division of American Home Products Corporation, CYANMID GmbH, A-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9, Austria)

V: Fort Dodge Animal Health, Iowa, USA.

S: Vakcína obsahuje ve 3ml:

Erysipelothrix rhusiopathiae	0,5000 ml
Bordetella bronchiseptica	0,2500 ml
Escherichia coli (Pilus-antigeny)	
K-88	0,0125 ml
K-99	0,0104 ml
987-P	0,0104 ml
F-41	0,0100 ml
Pasteurella multocida	0,1178 ml

Algedrati suspensio, Formaldehydi solutio, Gentamycini sulfas, Antifoam FGJ0, Natrii chloridi solutio, Carbopol.

IS: Veterinaria – imunopraeparata.**ATC:** Q15AA**PP:** Inaktivovaný a adjuvovaný bakterin.**B:** Lékovky s obsahem 10 dávek, 25 dávek a 10 x 35 dávek vakcíny.**OL:** Nevakcinovat prasnice a prasničky 21 dní před porážkou.**PE:** 21 měsíců.

Obsah otevřené lékovky je nutno ihned spotřebovat.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

ZS: Skladovat v temnu při teplotě +2 až +7 °C, mimo dosah dětí.

Vakcína nesmí zmraznout.

■ RP 97/013/01-C**SUVAXYN AR/T/E inj. ad us. vet.****DR:** Fort Dodge Animal Health, Kansas, USA.

(Division of American Home Products Corporation, CYANAMID GmbH, A-1140 Wien, Waidhausenstr. 19/9, Austria)

V: Fort Dodge Laboratories, Iowa, USA.

S: Vakcína obsahuje ve 2 ml:

Bordetella bronchiseptica 10 ^{8,5} CFU/dávka	0,0062 ml
Erysipelothrix rhusiopathiae 10 ⁸ CFU/dávka	0,5000 ml
Pasteurella multocida Serotype D (22 MLD ₅₀ Toxin/ml)	0,1000 ml

Algedrati suspensio, Formaldehydi solutio, Gentamycini sulfas, Natrii chloridi solutio

IS: Veterinaria – imunopraeparata.**ATC:** Q15AA**PP:** Inaktivovaný a adjuvovaný bakterin.**B:** Lékovky s obsahem 10 dávek, 35 dávek a 10 x 35 dávek vakcíny.**OL:** Nevakcinovat prasnice a prasničky 21 dní před porážkou.**PE:** 27 měsíců.

Obsah otevřené lékovky je nutno ihned spotřebovat.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.

ZS: Skladovat v temnu při teplotě +2 až +7 °C, mimo dosah dětí.

Vakcína nesmí zmraznout.

■ RP 96/011/01-C**TRISULMIX plv. sol. ad us. vet.****DR:** CoopHavet, Francie.**V:** CoopHavet, Francie.

S: Účinné látky:

Sulfadimethoxinum natrium	20 g
Trimethoprimum	4 g ve 100 g přípravku

Pomocné látky:

Silicia colloidalis anhydrica, Saccharosum, Lactosum.

IS: Veterinaria pharmaceutica.**ATC:** Q07BB**B:** 10 x 100 g, 1 kg.**OL:** Maso drůbeže a krávků 12 dní, maso ostatních zvířat 15 dní.

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

PE: 30 měsíců. Viz. vyznačený údaj na obalu.**ZS:** Při teplotě 15 – 25 °C, v suchu, chránit před světlem.**■ RP 97/030/01-C****VANQUARD PLUS 5L inj. sicc. ad us. vet.****DR:** Pfizer Animal Health, Česká republika.**V:** Pfizer Animal Health, USA.

S: v 1 ml:

1. Lyofilizovaná složka: Vanguard Plus 5

Virus febris contagiosae canis attenuatum $10^{2.5}$ TCID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis $10^{2.9}$ TCID₅₀, Virus parainfluenzae canis $10^{3.6}$ TCID₅₀, Parvovirus enteritidis canis $10^{7.0}$ TCID₅₀.

2. Tekutá frakce: Leptoferm C-I

Leptospira canicola ≥ 600 NU/ml. Leptospira icterohaemorrhagiae ≥ 600 NU/ml.

Pomocné látky: Streptomycinum, Penicilinum, Aqua pro inj.

IS: Veterinaria immunopraeparata.

ATC: Q15AA

B: 1 dávka vakcíny se skládá z lyofilizátu a 1 ml tekuté složky jako ředidla. Lyofilizát je balen po jedné dávce ve skleněných lékovkách uzavřených gumovou propichovací zátkou s hliníkovým uzávěrem. Ředidlo je baleno po jedné dávce v plastových lékovkách uzavřených gumovou propichovací zátkou s hliníkovým uzávěrem. Velikost balení vakcíny: 5 x 1 dávka v kartónové krabičce, 10 x 1, 25 x 1 nebo 50 x 1 dávka v plastových krabičkách.

OL: Není určeno pro potravinová zvířata.

PE: 18 měsíců. Datum ukončení použitelnosti je vyznačeno na obalu. Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti.

ZS: Uchovávat při teplotě 2 – 8 °C. Nezmrazovat. Chránit před světlem.

■ RP 96/010/01-C

XYLAPAN inj. ad us. vet.

DR: Chassot, s. r. o., Česká republika.

V: Chassot AG, Švýcarsko.

S: Účinná látka v 1 ml inj. roztoku:

Xylazinum (ut hydrochloridum) 20 mg

Pomocné látky

Methylparabenum, Propylparabenum, Natrii chloridum, Aqua pro injectione.

IS: Sedativum, analgetikum, myorelaxans.

ATC: Q08FB

PP: Čirý bezbarvý roztok.

B: Lahvička s propichovací zátkou o obsahu 50 ml.

5 lahvíček s propichovací zátkou o obsahu 10 ml.

OL: Maso 3 dny.

Nelze používat pro zvířata, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

PE: 48 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním odběru z orig. balení: 4 týdny.

ZS: Při teplotě 15 – 25 °C.

■ RP 96/016/01-C

ZEROFEN 4% plv. ad us. vet.

DR: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Irsko.

V: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Irsko.

S: Fenbendazolum 40 g – v 1 kg. Lactosum ad 1 kg.

IS: Veterinaria – pharmaceutica.

ATC: Q09AA

PP: Bílý nebo téměř bílý prášek.

B: 1 kg

OL: Maso 5 dní

PE: Pouze pro perorální použití, 5 let.

ZS: Ukládejte na suchém místě, do 25 °C.

Prodloužení registrace a změny registrace v rámci prodloužení

ADVOCIN inj. ad us. vet.

DR: Pfizer Animal Health, Česká republika.

V: Dosud: Pfizer Products Corporation, Belgie.

Nově: Pfizer Animal Health, Francie.

RČ: 96/682/95-C

PR: 07/2005

AMPISUR inj. ad us. vet.

DR: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o.; Slovenská republika.

V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale, Francie.

Nově: Ceva Santé Animale, Francie.

I: Dosud: Cílová zvířata: Koně, skot, ovce, prasata.

Nově: Cílová zvířata: Skot, prasata.

RČ: 96/023/94-C

PR: 01/2004

ANTIASPER I. ply. ad us. vet.**DR:** Mevak, a. s., Slovenská republika.**B:** 4 kg, 5 kg, 10 kg.**PE:** Dosud: 24 měsíců.

Nově: 12 měsíců. Roztok připravovat denně čerstvý.

RČ: 99/021/79-S/C

Dosud: Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře.

Nově: Přípravek není vázán na předpis veterinárního lékaře.

PR: 08/2004**BAYOVAC BREEDER E inj. ad us. vet.****DR:** Bayer AG, Německo.**B:** 100 ml.**RČ:** 97/869/95-C**PR:** 11/2005**BIOPRAN 200 inj. ad us. vet.****DR:** Bioveta, a. s., Česká republika.**B:** 100 ml.**RČ:** 99/199/88-C**PR:** 02/2004**CALCIUM 20 % BIOFIKA inj. ad us. vet.****DR:** Biotika, a. s., Slovenská republika.**I:** Dosud: Poporodní parézy, osteomalacie, rachitis, hypokalcemie, tetanie, eklampsie a ostatní poruchy výměny vápníku; podpůrná léčba zánětlivých a exsudativních procesů (pleuritis, peritonitis, ascites), procesů se sklonem k hemoragiím, akutních katarálních afekcí dýchacích cest, anafylatických stavů a sérové nemoci; ušknutí zmijí, bodnutí sršněm, včelou; acetonemie, hemoglobinurie, myoglobinurie.

Nově: Cílový druh zvířat: Skot, kůň, tele, hříbě, prase, pes, drůbež. Deficit a poruchy metabolismu vápníku – osteomalacie, osteoporóza, rachitida, hypokalcemie, paratyreoidální insuficience. Eklampsie, tetanie, parézy během gravidity a puérperia. Podpůrná léčba zánětlivých procesů se sklonem k hemoragiím, akutních katarálních afekcí dýchacích cest. Acetonemie, hemoglobinemie, hemoglobinurie, myoglobinurie. Alergická onemocnění – anafylaktický šok, sérová nemoc, urtikarie. Ušknutí zmijí nebo pobodání hmyzem.

P: Dosud: 36 měsíců.

Nově: 36 měsíců, po prvním otevření skladovat při teplotě 2 – 8 °C, použitelnost 28 dní.

RČ: 39/799/69-S/C**PR:** 09/2004**CATOSAL 10 % inj. ad us. vet.****DR:** Bayer, s. r. o., Česká republika.**I:** Dosud: Tonikum pro koně, skot, prasata, ovce, kozy, psy, kočky, kožešinová zvířata a drůbež. Poruchy přeměny látkové podmíněné nedostatky ve výživě nebo nemocemi. Metafylaxe sterility a poporodních onemocnění. Tetanie a parézy společně s vápníkovou a hořčičkovou léčbou. U zdravých zvířat ke zvýšení svalové výkonnosti.

Nově: Cílový druh zvířat: Koně, skot, psi, kočky, kožešinová zvířata. Poruchy přeměny látkové podmíněné nedostatky ve výživě nebo nemocemi. Metafylaxe sterility a poporodních onemocnění. Tetanie a parézy společně s vápníkovou a hořčičkovou léčbou. U zdravých zvířat ke zvýšení svalové výkonnosti.

OL: Dosud: Bez ochranných lhůt. Intravenózní aplikaci nepoužívat u dojnic, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.

Nově: Skot: Maso a mléko bez ochranných lhůt. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

PE: Dosud: 36 měsíců.

Nově: 36 měsíců. Po 1. otevření 28 dnů.

RČ: 96/985/94-C**PR:** 09/2004**CODIMOX L.A. 15 % inj. ad us. vet.****DR:** Codifar N.V., Belgie.**V:** Dosud: Codifar NV, Belgie.

Nově: Laboratoria Smeets, Belgie.

B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.

Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml.

RČ: 96/1033/94-C**PR:** 09/2004**COLIVET ply. sol. ad us. vet.****DR:** Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, Slovenská republika.

Nově: Ceva Animal Health Slovakia, Slovenská republika.

V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale S. A., Francie.

Nově: Ceva Santé Animale S. A., Francie.

B: 100 g, 1 kg, 5 kg, 20 kg.**DO:** Dosud: PE sáček; hliníková nádoba s PE uzávěrem a nalepeným informačním letákem; 4-vrstevný papírový pytel.

Nově: 100 g v papírovém sáčku, 1 kg v plechovce, 5 a 20 kg ve 4 – vrstevném papírovém balení.
I: Dosud: Prevence a léčba infekčních enteritid telat, prasat, drůbeže, králků.
Nově: Cílový druh zvířat: Telata, selata, kur domácí. Prevence a léčba gastrointestinálních onemocnění telat, selat a kura domácího způsobených gramnegativními bakteriemi (zejména E. coli a Salmonella spp.).
OL: Dosud: Maso 2 dny. Vejce bez ochranné lhůty.
Nově: Maso telat, prasat a brojlerů: 2 dny. Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.
PE: Dosud: 18 měsíců.
Nově: 36 měsíců. Po zamíchání do krmiva 72 hodin.
RČ: 96/135/94-C
PR: 02/2004

CUNIPRAVAC RHD inj. ad us. vet.

DR: Laboratorios Hipra S. A., Španělsko.
B: Dosud: 10 x 20 ml.
Nově: 1 x 20 ml, 10 x 20 ml.
OL: Dosud: Maso 21 dnů.
Nově: Bez ochranných lhůt.
RČ: 97/197/96-C
PR: 03/2006

DEFENSOR 3 inj. ad us. vet.

DR: Pfizer Animal Health, Česká republika.
B: Dosud: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 10 x 25 ml, 50 x 25 ml.
Nově: 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 50 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 50 x 25 ml, 50 x 1 ml.
RČ: 97/225/94-C
PR: 02/2004

DUOMYCIN Vet susp. ad us. vet.

DR: G. Streuli & Co. AG, Švýcarsko.
RČ: 96/451/93-C
PR: 05/2003

DUPHAFRAL MULTI inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
V: Dosud: Fort Dodge Animal Health, USA.
Nově: Fort Dodge Veterinaria, S.A., Španělsko.
B: 10 x 100 ml.
DO: Dosud: Příbalová informace a etiketa odděleně.
Nově: Příbalová informace na etiketě.
PE: 24 měsíců, po 1. otevření ihned spotřebovat.
RČ: 96/287/94-C
PR: 03/2004

DUPHAMOX LA inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
V: Dosud: Fort Dodge Animal Health, USA.
Nově: Norbrook Laboratories Ltd., Severní Irsko.
OL: Dosud: Maso 21 dnů, mléko krav 60 hodin. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
Nově: Maso 21 dnů, mléko krav 72 hodin. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidský konzum.
PE: Dosud: 24 měsíců.
Nově: 24 měsíců, po prvním otevření 28 dnů.
RČ: 96/981/94-C
PR: 09/2004

DUPHALYTE inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
B: 50 ml.
I: Dosud: Léčba a prevence dehydratace, porucha rovnováhy elektrolytů a hypoproteinemie.
Nově: Cílový druh zvířat: Kůň, skot, prase, pes, kočka, drůbež. Přípravek je určen k podpůrné terapii domácích a hospodářských zvířat při dehydrataci, ztrátách tělních tekutin, imbalance elektrolytů a při hypoproteinemii.
PE: 36 měsíců. Po 1. otevření spotřebovat ihned.
RČ: 96/535/94-C
PR: 04/2004

DUPHAPEN LA inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
I: Dosud: Infekční onemocnění způsobená organizmy citlivými na penicilin.
Nově: Cílový druh zvířat: kůň, skot, ovce, prase, pes, kočka. Přípravek je určen k léčbě infekčních bakteriálních onemocnění koní, skotu, ovcí, prasat, psů, a koček způsobovaných nebo spojených s mikroorganismy citlivými na penicilin (např. Coryne-

bacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus spp. – neprodukuje penicilinasu, Streptococcus spp.).

PE: Dosud: 36 měsíců.
Nově: 36 měsíců, po 1. otevření 28 dní.
RČ: 96/1108/94-C
PR: 10/2004

DUVAXYN IE-T PLUS inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 97/048/94-C
PR: 01/2004

FIBROVAC inj. sicc. ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.
B: Dosud: 5 x 50 dávek, 50 x 100 dávek.
Nově: Pro s.c. aplikaci: 1 x 10 dávek, 5 x 10 dávek, 1 x 20 dávek, 5 x 20 dávek. Pro aplikaci dvojvpíchem: 1 x 50 dávek, 5 x 50 dávek, 1 x 100 dávek, 5 x 100 dávek.
RČ: 97/1026/95-C
PR: 12/2005

GALLIMYCIN 200 inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, Slovenská republika.
Nově: Ceva Animal Health Slovakia, Slovenská republika.
V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale S. A., Francie.
Nově: Ceva Santé Animale S. A., Francie.
B: 50 ml, 250 ml.
OL: Dosud: Maso 7 dní, mléko 3 dny (6 dojení).
Nově: Maso 7 dní, mléko 9 dní (18 dojení).
PE: Dosud: 24 měsíců.
Nově: 24 měsíců. Po prvním otevření 28 dní.
RČ: 96/015/94-C
PR: 01/2004

HORMOTONIN inj. ad us. vet. 0.1 %

HORMOTONIN inj. ad us. vet. 0.01 %

DR: Biotika, a. s., Slovenská republika.
I: Dosud: Skot, kůň, hřibě, ovce, koza, prase, pes, kočka, liška, králík.
Nově: Kůň, hřibě, pes, kočka, liška.
OL: Dosud: Bez ochranných lhůt.
Nově: Není určeno pro potravinová zvířata.
RČ: 51/904/69-S/C
PR: 12/2004

INTERZOL susp. ad us. vet.**DR:** Werft-Chemie GmbH, Rakousko.**S:** Dosud: Oxfendazolum 22,65 mg, Acidum sorbicum 1,50 mg, Acidum citricum 4,31 mg, Aqua ad 1 ml.**Nově:** 1 ml: Oxfendazolum 22,65 mg, Macrogoli 2000 stearas, Macrogolum 4000, Carmelosum, Silica praeparata, Acidum sorbicum, Acidum citricum monohydricum. Natrii citras, Aqua purificata.**PE:** Dosud: 36 měsíců.**Nově:** 36 měsíců. Po odběru první dávky skladovat v chladu a spotřebovat do 3 dnů.**RČ:** 96/976/94-C**PR:** 09/2004**LOPATOL 100 tbl. ad us. vet.****LOPATOL 500 tbl. ad us. vet.****DR:** Novartis Czech Republic, s. r. o., Česká republika.**B:** Dosud: Lopatol 100: 1 x 10 tbl., 10 x 10 tbl.

Lopatol 500: 1 x 4 tbl., 15 x 4 tbl., 25 x 4 tbl.

Nově: Lopatol 100: 1 x 6 tbl., 10 x 10 tbl., 24 x 6 tbl.

Lopatol 500: 1 x 4 tbl., 24 x 4 tbl., 25 x 4 tbl.

RČ: 96/196/91-C**PR:** 06/2006**METRICURE susp. ad us. vet.****DR:** Intervet International B. V., Nizozemsko.**PE:** Dosud: 24 měsíců.**Nově:** 48 měsíců.**RČ:** 96/329/96-C**PR:** 06/2006**MYXOREN inj. sicc. ad us. vet.****DR:** Bioveta, a. s., Česká republika.**IÚ:** Dosud: Délka imunity 4 měsíce.**Nově:** Délka imunity 12 měsíců.**PE:** 24 měsíců. Po naředění 4 hodiny.**RČ:** 97/191/91-C**PR:** 06/2006**NOBILIS FC INAC inj. ad us. vet.****DR:** Intervet International B. V., Nizozemsko.**DO:** Dosud: Skleněná lékovka s pryžovou propichovací zátkou, hliníkovým uzávěrem. Příbalová informace.**Nově:** Lékovka z polyethylentereftalátu (PET) o obsahu 500 ml (1000 dávek) uzavřená gumovou zátkou zajištěnou kódovou hliníkovou pertlí. Příbalová informace připojena.**RČ:** 97/1184/94-C**PR:** 11/2004**OVARID 5 mg tbl. ad us. vet.****DR:** Schering – Plough Central East Ag, Švýcarsko.**B:** Dosud: 25 x 8 tbl.**Nově:** 5 x 8 tbl., 25 x 8 tbl.**I:** Dosud: Oddálení estru u fen (aplikace se provádí ve stadiu anestrus a další estrus se objeví asi do 3 měsíců, maximálně do 6 měsíců). Potlačení estru u fen (příznaky proestrus obvykle vymizí během 2 – 3 dnů a následný oestrus se objeví o 4 – 6 týdnů dříve, než tomu bylo bez medikace). Oddálení estru u koček (nástup dalšího estru po léčbě může být různý, většinou se objeví o něco později než by se očekávalo; v průměru asi 4 týdny po poslední dávce). Miliární ekzém u koček (zlepšení se projevuje během pěti dní). Eosinofilická granulomatóza u koček.**Nově:** Oddálení estru fen, potlačení estru fen, kontrola reprodukčního cyklu koček, miliární ekzém koček, eosinofilní granulomatóza koček (viz schválená příbalová informace). Nežádoucí chování psů: agresivita (dominantní i submisivní), unikání, značkování teritoria močí, hluchost, excitace, destruktivní chování.**RČ:** 96/1019/95-C**PR:** 12/2005**PERACEF susp. ad us. vet.****DR:** Pfizer Animal Health, Česká republika.**RČ:** 96/1032/95-C**PR:** 12/2005**PROBICAN pasta ad us. vet.****DR:** Medipharm CZ, s. r. o., Česká republika.**B:** 1 x 15 g.**I:** Dosud: Čílový druh zvířat: Psi a kočky.

Kolonizace gastrointestinálního traktu mléčnou mikroflórou, prevence průjemových onemocnění v období mléčné výživy; zvýšení odolnosti ke stresům. Rekolonizace střevního traktu po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky.

Nově: Čílový druh zvířat: Psi a kočky.

Pozitivní kolonizace střevního aparátu mláďat (štěňat, koťat) symbiotickou laktacidoprodukční mikroflórou v období bezprostředně po narození a v době kojení.
Prevence gastrointestinálních poruch a střevních infekcí mláďat v období sání mateřského mléka nebo při podávání mléčné náhražky.
Posílení obranných schopností organismu mláďat ve stresových situacích jako je odstav, změna prostředí nebo diety, přesun, imunizace, odčervování atd.,
Rekonvalescence psů a koček po prodělaných onemocněních gastrointestinálního traktu, infekcích, dlouhodobých nechutenstvích atd.,
Rekolonizace střevního traktu pozitivní symbiotickou mikroflórou po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky.
Při zvýšené námaze, výcviku, výkonostních zkouškách, k zlepšení tělesné kondice a srsti před výstavami.
U fen a koček ve finálních fázích gravidity a v průběhu laktace (kojení).

RČ: 96/945/95-C

PR: 11/2005

PRURIVET sol. ad us. vet.

DR: Chassot, s. r. o., Česká republika.

RČ: 96/203/96-C

PR: 04/2006

RIMOX L.A. inj. ad us. vet.

DR: Richter Pharma AG, Rakousko.

B: 100 ml

RČ: 96/205/95-C

03/2005

ROMETAR 2 % inj. ad us. vet.

DR: Spofa, a. s., Česká republika.

OL: Dosud: Maso, mléko 3 dny.

Nově: Maso bez ochranné láhuty. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou výživu.

PE: Dosud: 24 měsíců.

Nově: 24 měsíců. Po prvním otevření 28 dnů.

RČ: 99/192/85-C

PR: 10/2005

ROSSOVET RECOVERY ORAL gel ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

S: Dosud: L-Carnitini hydrochloridum 1,23 g, Cyanocobalaminum 1,50 mg, L-Arginini hydrochloridum 0,72 g, N-Acetylmethioninum 0,39 g, Acidum asparticum (ut Kalii, Magnesii aut Natrii sal) 0,25 g, Fructosum 3,0 g, Aqua ad 15,0 g.

Nově: Levocarnitinum 8,61 g, Cyanocobalaminum 0,011 g, Arginini hydrochloridum 5,04 g, Acetylmethioninum 2,73 g, Acidum asparticum 1,78 g, Fructosum 20,4 g, Kalii hydroxidum 0,34 g, Magnesii oxidum 0,15 g, Natrii hydroxidum solutio 30 % 0,32 g, Acidum sorbicum 0,22 g, Propylenglycolum 25,0 g, Carmellosum naticum 1,8 g, Aqua purificata ad 100 g.

B: Dosud: 1 x 15 g.

Nově: 1 x 15 g, 1 x 100 g.

DO: Dosud: Příbalová informace a etiketa odděleně.

Nově: Příbalová informace na etiketě.

OL: Dosud: Bez ochranných láhůt.

Nově: Není určeno pro potravinová zvířata.

RČ: 86/895/94-C

PR: 08/2004

RUVAX inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Rhone Merieux, Francie.

Nově: Merial SAS, Francie.

RČ: 97/030/95-C

PR: 01/2005

SPECTAM INJ. AD US. VET.

DR: Dosud: Sanofi, Francie.

Nově: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.

V: Dosud: Sanofi, Francie.

Nově: Ceva Santé Animale S.A., Francie.

RČ: 96/025/94-C

PR: 01/2004

VANGUARD 5/L inj. sicc. ad us. vet.

DR: Dosud: Smith Kline Beecham, USA.

Nově: Pfizer Animal Health, Česká republika.

V: Dosud: Smith Kline Beecham, USA.

Nově: Pfizer Animal Health, USA.

B: Dosud: 25 x 1 dávka.
Nově: 5 x 1 dávka, 25 x 1 dávka.
RČ: 97/874/94-C
PR: 07/2004

VERMITAN 20 % gran. ad us. vet.

DR: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.
V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale, Francie.
Nově: Ceva Phylaxia, Maďarsko.
I: Dosud: Cílová zvířata: Skot, prasata, ovce, kozy.
Nově: Cílová zvířata: Skot, ovce, kozy.
RČ: 96/022/94-C
PR: 01/2004

VETRIMOXIN L.A. inj. ad us. vet.

DR: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.
V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale, Francie.
Nově: Ceva Phylaxia, Maďarsko.
B: Dosud: 100 ml.
Nově: 100 ml, 250 ml.
RČ: 96/033/94-C
PR: 01/2004

Změny registrace

ACIPROGENTIN plv. ad us. vet.

DR: Mevak, a. s., Slovenská republika.
RČ: 99/043/76-S/C
B: Dosud: 20 x 320 g.
Nově: 1 x 320 g, 10 x 320 g, 20 x 320 g.

ALFAFER 10% inj. ad us. vet.

DR: Alfasan International B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/003/99-C
B: Dosud: 12 x 100 ml
Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 6 x 250 ml

ATROPIN BIOTIKA MITTE inj. ad us. vet.

DR: Biotika, a.s., Slovenská republika.
RČ: 96/086/98-C
PE: Dosud: 24 měsíců.
Nově: 36 měsíců, po prvním otevření skladovat při teplotě 2 – 8 °C, použitelnost 28 dní.

AUREOMYCIN 1 % ung. ophth. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 96/472/91-S/C
I: Dosud: Primární oční infekce (konjunktivitidy, keratitidy, blefaritidy, keratokonjunktivitidy) a prevence infekcí po chirurgickém ošetření.
Nově: Cílový druh zvířat: Kůň, skot, prase, ovce, pes, kočka. Pro lokální ošetření domácích a hospodářských zvířat. Jde zejména o ošetření primárních očních infekcí konjunktivitidy, keratitidy, blefaritidy, keratokonjunktivitidy a prevenci infekcí po chirurgickém zákroku.
DO: Dosud: Etiketa a příbalová informace odděleně.
Nově: Příbalová informace na etiketě.
ZS: Dosud: Na chladném a suchém místě.
Nově: Při teplotě 8 – 15 °C, v suchu.
PE: 36 měsíců, po 1. otevření spotřebovat ihned.

AUREOMYCIN G.V. spray ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 96/466/91-S/C
I: Dosud: Ošetření řezných a tržných ran a odřenin.
Nově: Cílový druh zvířat: Koně, skot, ovce, kozy, prasata, psi a kočky.
K ošetření řezných a tržných ran, odřenin, poranění končetin, otevřených abscesů, pupečních pahýlů a povrchových infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na tetracyklin.
DO: Dosud: Etiketa a příbalová informace odděleně.
Nově: Příbalová informace na etiketě.
ZS: Dosud: Nevystavovat vyšším teplotám než 50 °C.
Nově: Při teplotě 15 – 25 °C, chránit před sluncem a teplotami nad 50 °C.

Dosud: VIRBAGEN CANIS SHA2PPI/L inj. sicc. ad us. vet.

Nově: CANIGEN DHA2PPI/L inj. sicc. ad us. vet.

DR: Virbac SA, Francie.

RČ: 97/106/98-C

B: Dosud: 1 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka, 100 x 1 dávka.

Nově: 1 x 1 dávka, 10 x 1 dávka, 25 x 1 dávka, 50 x 1 dávka, 100 x 1 dávka.

Dosud: VIRBAGEN CANIS SHA2PPI/LT inj. sicc. ad us. vet.

Nově: CANIGEN DHA2PPI/LR inj. ad us. vet.

DR: Virbac SA, Francie.

RČ: 97/962/94-C

B: Dosud: 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.

Nově: 10 x 1 dávka, 25 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.

CESTAL CAT tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: – Sanofi Animal Health Slovakia, s. r. o., Slovenská republika.

Nově: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.

RČ: 96/1203/97-C

CESTAL PLUS tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: – Sanofi Animal Health Slovakia, s. r. o., Slovenská republika.

Nově: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.

RČ: 96/1204/97-C

Dosud: CLOTEID inj. ad us. vet.

Nově: CLOTEID 4 inj. ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 97/197/91-C

B: Dosud: 1 x 2 ml, 10 x 2 ml.

Nově: 2 x 1 ml, 10 x 1 ml.

S: Dosud: 2 ml: Anatoxinum tetanicum purificatum 600 KBL 0,1 ml, Algedrati suspensio 0,2 ml, Thiomersalum 0,3 ml, Natrii chlorati solutio isotonicia ad 2 ml.

Nově: 1 ml: Anatoxinum tetanicum purificatum 300 KBL, Algedrati suspensio, Thiomersalum, Natrii chloridi solutio.

COBACTAN inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Hoechst Roussel Vet, Německo.

Nově: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 96/732/96-C

B: Dosud: 1 x 50 ml.

Nově: 1 x 50 ml, 1 x 100 ml.

COMBI-KEL 40 inj. ad us. vet.

DR: Kela Laboratoria N.V., Belgie.

RČ: 96/1198/97-C

B: Dosud: 12 x 100 ml, 6 x 250 ml.

Nově: 1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 250 ml.

I: Dosud: Cílová zvířata – koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi a kočky.

Nově: Cílová zvířata – skot, prasata, ovce, psi a kočky.

DIFTOSEC CT inj. sicc. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.

RČ: 97/040/00-C

PE: Dosud: 21 měsíců.

Nově: Viz údaj vyznačený na obalu.

DIRIGESTRAN inj. ad us. vet.

DR: Ferring-Léčiva, a. s., Česká republika.

RČ: 99/115/83-C

ZS: Dosud: Při teplotě 5 – 15 °C, chránit před světlem.

Nově: Při teplotě 2 – 8 °C, chránit před světlem.

DUPHACYCLINE 300 LA inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 96/048/98-C

B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.

Nově: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.

PE: 24 měsíců. Po prvním otevření 28 dnů.

DURAMUNE DA2P + Pv - DURAMUNE BASIC inj. sicc. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/799/96-C

B: Dosis: 1 x 1 dávka, 25 x 1 dávka.

Nově: 1 x 1 dávka, 5 x 1 dávka, 25 x 1 dávka.

DURAMUNE PC inj. ad. us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/548/97-C

B: Dosis: 25 x 1 ml, 1 x 10 ml

Nově: 10 x 1 dávka (10x1 ml), 25x 1 dávka (25x 1 ml), 1x 10 dávek (1x 10 ml)

DURAMUNE CV - K inj. ad. us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/017/98-C

B: Dosis: 1 ml, 5 ml, 10 ml

Nově: 1x 1 dávka (1x1 ml), 5x1 dávka (5x1 ml), 10x1 dávka (10x1 ml).

Dosis: DURAMUNE DA2PP + CvK inj. sicc. ad us. vet.

Nově: DURAMUNE DA2PP + CvK inj. sicc. ad us. vet.

(PUPPYSHOT)

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/803/96-C

B: Dosis: 1 x 1 dávka + 1 x 1 ml zředovače, 25 x 1 dávka + 25 x 1 ml zředovače.

Nově: 1 x 1 dávka (1 x 1 ml), 5 x 1 dávka (5 x 1 ml), 25 x 1 dávka (25 x 1 ml).

Dosis: DURAMUNE DA2PP + CvK/LCI inj. sicc. ad us. vet.

Nově: DURAMUNE DA2PP + CvK/LCI inj. sicc. ad us. vet.

(PUPPYSHOT BOOSTER)

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/802/96-C

B: Dosis: 1 x 1 dávka + 1 x 1 ml zředovače, 25 x 1 dávka + 25 x 1 ml zředovače.

Nově: 1 x 1 dávka (1 x 1 ml), 5 x 1 dávka (5 x 1 ml), 25 x 1 dávka (25 x 1 ml).

DURAMUNE DA2PPv + R-DURAMUNE BASIC R inj. sicc. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/547/97-C

B: Dosis: 25 x 1 dávka

Nově: 1x 1 dávka (1x1 ml), 5x1 dávka (5x1 ml), 25x1 dávka (25x1 ml)

DURAMUNE DA2LP-Pv + DURAMUNE BASIC L inj. sicc. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/800/96-C

B: Dosis: 1x 1 dávka, 25x 1 dávka

Nově: 1 x 1 dávka (1x 1 ml), 5x1 dávka (5x1 ml), 25 x 1 dávka (25x 1).

DURAMUNE LCI inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/1075/97-C

B: Dosis: 1 x 1 ml, 25 x 1 ml.

Nově: 1 x 1 dávka (1 ml), 10 x 1 dávka (10 x 1 ml), 25 x 1 dávka (25 x 1 ml), 50 x 1 dávka (50 x 1 ml).

EGOCIN 20 plv. ad us. vet.

DR: Krka, d. d., Slovinsko.

RČ: 96/675/95-C

I: Dosis: Léčení gastrointestinálních, respiračních, urogenitálních infekcí a septicémie způsobených mikroorganismy citlivými na oxytetracykliny. Specifické indikace: Drůbež: kolinfekce; cholera drůbeže, pulorová nákaza, hemofilová rýma, infekční sinusitida a synovitida, mykoplazmóza, pseudotuberkulóza, aviární monocytóza, stafylokokóza, streptokokóza, sekundární infekce při CRD a virózách. Prasata: enzootická pneumonie, pleuropneumonie, syndrom MMA, atrofická rinitida (v kombinaci se sulfonamidy), leptospiróza, listerióza. Telata: sekundární infekce při virové pneumonii, kolibacilóza, transportní tetanie. Jehňata, kozlata a hříbata: infekce trávicího a respiračního traktu.

Nově: Léčení gastrointestinálních infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na oxytetracykliny. Specifické indikace: Drůbež: kolinfekce, cholera drůbeže, pulorová nákaza, hemofilová rýma, infekční sinusitida a synovitida, mykoplazmóza, pseudotuberkulóza, aviární monocytóza, stafylokokóza, streptokokóza, sekundární infekce při CRD a virózách. Prasata: enzootická pneumonie, pleuropneumonie, syndrom MMA, atrofická rinitida (v kombinaci se sulfonamidy), leptospiróza, listerióza. Telata: sekundární infekce při virové pneumonii, kolibacilóza, transportní tetanie. Hříbata: Infekce trávicího a respiračního traktu.

OL: Dosis: Maso a orgány savců a drůbeže 5 dní.

Nově: Maso drůbeže, telat a prasat : 5 dní; nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum; nepoužívat u koní, jejich maso je určeno pro lidský konzum.

EURICAN DHPPi₂-L**DR:** Merial SAS, Francie.**RČ:** 97/005/98-C**S:** Dosud: Lyofilizovaná složka (Eurican DHPPi₂): Virus febris contagiosae canis min. 10^{4,0} CCID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis min. 10^{2,5} CCID₅₀, Parvovirus enteritidis canis min. 10^{4,9} CCID₅₀, Virus parainfluenzae canis min. 10^{4,7} CCID₅₀. Tekutá složka (Leptodog): Leptospira canicola inact., Leptospira icterohaemorrhagiae inact., v dostatečné dávce dle Evropského lékopisu.Nově: 1 ml: Lyofilizovaná složka (Eurican DHPPi₂): Virus febris contagiosae canis min. 10^{4,0} CCID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis min. 10^{2,5} CCID₅₀, Parvovirus enteritidis canis min. 10^{4,9} CCID₅₀, Virus parainfluenzae canis min. 10^{4,7} CCID₅₀. Tekutá složka (Leptodog): Leptospira canicola inact., Leptospira icterohaemorrhagiae inact., v dostatečné dávce dle Evropského lékopisu. Polypeptides, Glucids aqua, vypuštění pomocné látky Thiomersalum.**Dosud: VIRBAGEN FELIS RCP inj. sicc. ad us. vet.****Nově: FELIGEN CRP inj. sicc. ad us. vet.****DR:** Virbac SA, Francie.**RČ:** 97/964/94-C**B:** Dosud: 10 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.

Nově: 10 x 1 dávka, 25 x 1 dávka, 50 x 1 dávka.

FEL-O-VAX IV inj. ad us. vet.**DR:** Fort Dodge Animal Health, USA.**RČ:** 97/606/97-C**B:** Dosud: 10 x 1 ml, 50 x 1 ml.

Nově: 2 x 1 dávka (2 x 1 ml), 10 x 1 dávka (10 x 1 ml), 50 x 1 dávka (50 x 1 ml).

FEL-O-VAX PCT inj. ad us. vet.**DR:** Fort Dodge Animal Health, USA.**RČ:** 97/680/97-C**B:** Dosud: 10 x 1 ml, 50 x 1 ml.

Nově: 2 x 1 dávka (2 x 1 ml), 10 x 1 dávka (10 x 1 ml), 50 x 1 dávka (50 x 1 ml).

FENBION 2,5 % plv. ad us. vet.**DR:** Mevak, a. s., Slovenská republika.**RČ:** 96/433/97-C**PE:** Dosud: 24 měsíců.

Nově: 36 měsíců.

FINADINE RP inj. ad us. vet.**DR:** Schering - Plough Central East AG, Švýcarsko.**RČ:** 96/103/85-C**PE:** Dosud: 24

Nově: 36 měsíců, po první aplikaci přípravku 4 týdny.

FLUVAC EHV 4/1 PLUS inj. ad us. vet.**DR:** Fort Dodge Animal Health, USA.**RČ:** 97/890/97-C**B:** Dosud: 12 x 1 ml, 25 x 1 ml

Nově: 1 x 1 dávka, 2 x 1 dávka, 12 x 1 dávka, 25 x 1 dávka.

FRONTLINE SPOT ON CAT sol. ad us. vet.**DR:** Dosud: Rhone Merieux, Francie.

Nově: Merial SAS, Francie.

V: Dosud: Rhone Merieux, Francie.

Nově: Merial SAS, Francie.

RČ: 96/186/97-C**B:** Dosud: 3 x 0,5 ml, 6 x 0,5 ml.

Nově: 1 x 0,5 ml, 3 x 0,5 ml, 6 x 0,5 ml.

I: Dosud: Léčebné a preventivní ošetření koček napadených blechami.

Nově: Léčebné a preventivní ošetření koček napadených blechami, klíšťaty a všenkami. Léčebné a preventivní ošetření alergií na bleší kousnutí.

FRONTLINE SPOT ON DOG L sol. ad us. vet.**DR:** Dosud: Rhone Merieux, Francie.

Nově: Merial SAS, Francie.

V: Dosud: Rhone Merieux, Francie.

Nově: Merial SAS, Francie.

RČ: 96/184/97-C**B:** Dosud: 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x 2,68 ml.

Nově: 1 x, 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x, 2,68 ml.

- I:** Dosud: Léčebné a preventivní ošetření psů napadených blechami a klíšťaty.
Nově: Cílový druh zvířat: Psi. Léčba a prevence při napadení blechami (*Ctenocephalides* sp.) a s tím spojené alergie na bleší kousnutí a dále při napadení klíšťaty (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp. a *Ixodes* spp.) a všenkami (*Trichodectes canis*).

FRONTLINE SPOT ON DOG M sol. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
RČ: 96/184/97-C
B: Dosud: 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x 1,34 ml.
Nově: 1 x, 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x 1,34 ml.
I: Dosud: Léčebné a preventivní ošetření psů napadených blechami a klíšťaty.
Nově: Cílový druh zvířat: Psi. Léčba a prevence při napadení blechami (*Ctenocephalides* sp.) a s tím spojené alergie na bleší kousnutí a dále při napadení klíšťaty (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp. a *Ixodes* spp.) a všenkami (*Trichodectes canis*).

FRONTLINE SPOT ON DOG S sol. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
RČ: 96/184/97-C
B: Dosud: 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x 0,67 ml.
Nově: 1 x, 2 x, 3 x, 4 x, 6 x, 8 x 0,67 ml.
I: Dosud: Léčebné a preventivní ošetření psů napadených blechami a klíšťaty.
Nově: Cílový druh zvířat: Psi. Léčba a prevence při napadení blechami (*Ctenocephalides* sp.) a s tím spojené alergie na bleší kousnutí a dále při napadení klíšťaty (*Rhipicephalus* spp., *Dermacentor* spp. a *Ixodes* spp.) a všenkami (*Trichodectes canis*).

GENTAMOX inj. ad us. vet.

- DR:** Laboratorios Hipra, S.A., Španělsko.
RČ: 96/1163/97-C
OL: Dosud: maso 45 dní, mléko 3 dny.
Nově: maso 45 dní, mléko 3 dny, nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

LEPTODOG inj. ad us. vet.

- DR:** Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
V: Dosud: Rhone Merieux, Francie.
Nově: Merial SAS, Francie.
RČ: 97/339/97-C
S: Nově: Vypuštění thiomersalu.

LEPTORABISIN inj. ad us. vet.

- DR:** Merial SAS, Francie.
RČ: 97/340/97-C
B: Dosud: 100 x 1 ml.
Nově: 10 x 1 ml, 100 x 1 ml.

LYMEVAX inj. ad us. vet.

- DR:** Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 97/798/96-C
B: Dosud: 1 x 1 ml, 25 x 1 ml, 50 x 1 ml, 1 x 10 ml, 10 x 10 ml.
Nově: 1 x 1 dávka (1 x 1 ml), 2 x 1 dávka (2 x 1 ml), 10 x 1 dávka (10 x 1 ml), 25 x 1 dávka (25 x 1 ml), 50 x 1 dávka (50 x 1 ml), 1 x 10 dávek (1 x 10 ml).

MEFLOSYL inj. ad us. vet.

- DR:** Fort Dodge Animal Health, USA.
RČ: 96/087/98-C
OL: Dosud: Maso skotu a koní 7 dní, maso prasat 15 dní. Mléko 1 den.
Nově: Maso skotu 7 dní, maso prasat 15 dní. Mléko 1 den. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.
DO: Dosud: Příbalová informace a etiketa odděleně.
Nově: Příbalová informace na etiketě.
PE: 24 měsíců. Po 1. otevření 28 dní.

NOBIVAC DHP inj. ad us. vet.

- DR:** Intervet International B. V., Nizozemsko.
RČ: 97/080/92-S/C
S: Dosud: Virus febris canis contagiosae (*Ondestepoort* phyl.) 10^{3,0} TCID₅₀ CDV, Virus hepatitis canis contagiosae (*Manhattan*

LPV₃phyl.) 10³ p.f.u. CAV₂, Parvovirus canis (CPV, Intervet 154) 10^{7.0}TCID₅₀, CPV, Sorbitolum 25 mg B.P., Dinatrium hydrogophosphoricum 0,125 mg, Ph.Eur. Gelatinum hydrolysatum 12,5 mg Ph.Eur., N-Z Amin 12,5 mg Monograph v 1 dávce.
Nově: Virus febris contagiosae canis (CDV, Ondestepoort) min. 10^{4.0}TCID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis (CAV₂, Manhattan LPV₃) min. 10^{4.0}TCID₅₀, Parvovirus enteritidis canis (CPV, Intervet 154) min. 10^{7.0}TCID₅₀ v 1 dávce (1 ml).

Pomocné látky: Sorbitolum, Gelatina hydrolyzata, Caseinum pancreatino hydrolysatum, Natrii hydrogenophosphas, Aqua pro injectione. (Zředovač Nobivac Diluent: Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Aqua pro injectione.)

NOBIVAC DHPPI inj. sicc. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 97/427/92-C

S: Dosud: Virus febris contagiosae canis (CDV) min. 10³TKID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis (CAV₂) 10³PFU, Parvovirus enteritidis canis (CPV) 10⁷TKID₅₀, Virus parainfluenzis canis (CPI) min. 10⁵PFU, Sorbitolum 50 mg, Gelatina hydrolyzata 25 mg, Peptonum caseinum 25 mg, Natrii hydrogenophosphas anhydricus 0,681 mg, Kalii dihydrogenophosphas 0,17 mg, Aqua pro injectione 1 ml.

Nově: Virus febris contagiosae canis (CDV, Ondestepoort) min. 10^{4.0}TCID₅₀, Virus laryngotracheitidis contagiosae canis (CAV₂, Manhattan LPV₃) min. 10^{4.0}TCID₅₀, Parvovirus enteritidis canis (CPV, Intervet 154) min. 10^{7.0}TCID₅₀, Virus parainfluenzis canis (Cpi, Cornell) min. 10^{5.5}TCID₅₀ v 1 dávce (1 ml). Pomocné látky: Sorbitolum, Gelatina hydrolyzata, Caseinum pancreatino hydrolysatum, Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Aqua pro injectione. (Zředovač Nobivac Diluent: Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Aqua pro injectione.)

NUFLOR inj. ad us. vet.

DR: Schering-Plough Central East Ag, Švýcarsko.

RČ: 96/069/99-C

D: Dosud: Skot: Dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti (10 ml na 150 kg) intramuskulárně (krční svalovina). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48 hodin a to silnou jehlou.

Prasata: Dávka je 15 mg/kg tělesné hmotnosti intramuskulárně (krční svalovina). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48 hodin a to silnou jehlou. Aplikovaný objem nemá převýšit 10 ml na jakékoli aplikační místo.

Nově: Skot: Intramuskulární dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti (10 ml na 150 kg) intramuskulárně (krční svalovina). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48 hodin a to silnou jehlou. Subcutánní dávka je 40 mg/kg tělesné hmotnosti (20 ml na 150 kg) jednorázově. Aplikaci provádějte pouze do oblasti krku. Aplikuje se pouze jedenkrát. Aplikovaný objem nemá převýšit 10 ml na jedno aplikační místo.

Prasata: Dávka je 15 mg/kg tělesné hmotnosti intramuskulárně (krční svalovina). Aplikuje se dvakrát v intervalu 48 hodin a to silnou jehlou. Aplikovaný objem nemá převýšit 5 ml na jedno aplikační místo.

OL: Dosud: Skot: Maso 30 dnů. Mléko – nepoužívat u krav jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. Prasata: Maso 14 dnů. Nově: Skot: Maso 30 dnů po intramuskulární aplikaci, 44 dnů po subkutánní aplikaci. Mléko – nepoužívat u krav jejichž mléko je určeno pro lidský konzum. Prasata: Maso 14 dnů.

PARAQUISTEL PLUS tbl. ad us. vet.

DR: M + H Vet, s. r. o., Česká republika.

RČ: 96/061/99-C

Dosud: Přípravek je vázán na předpis veterinárního lékaře.

Nově: Přípravek není vázán na předpis veterinárního lékaře.

B: Dosud: 1 x 10 tbl., 25 x 10 tbl..

Nově: 1 x 2 tbl., 1 x 10 tbl., 25 x 10 tbl..

ZS: Dosud: Při teplotě 8 – 15 °C, chránit před světlem, v suchu.

Nově: Při teplotě 15 – 25 °C, v suchu a temnu, chránit před světlem.

PENIKEL L.A. 15 + 15 inj. ad us. vet.

DR: Kela Laboratoria N.V., Belgie.

RČ: 96/1301/97-C

B: Dosud: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml.

Nově: 12 x 100 ml, 12 x 250 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.

PENSTREPTEN inj. sicc. ad us. vet.

DR: Biotika, a. s., Slovenská republika.

RČ: 15/062/72-C

PE: Dosud: 24 měsíců.

Nově: 36 měsíců.

PILLKAN 20 tbl. ad us. vet.

DR: Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.

Nově: Ceva Animal Health Slovakia, spol. s r. o., Slovenská republika.

V: Dosud: Sanofi Santé Animale S. A., Francie.

Nově: Ceva Santé Animale, Francie.

RČ: 96/018/94-C

POULVAC CHICK V.A. inj. sicc. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/735/92-C

B: Dosud: 10 x 1000 dávek.

Nově: 1 x 1000 dávek + zředovač 1 x 200 ml, 10 x 1000 dávek + zředovač 10 x 200 ml.

POULVAC CHICK -N-POX inj. sicc. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/423/92-C

B: Dosud: 10 x 1000 dávek + 10 x 10 ml zředovač.

Nově: 1 x 1000 dávek + 1 x 10 ml zředovač, 10 x 1000 dávek + 10 x 10 ml zředovač.

PROBICAN pasta ad us. vet.

DR: Medipharma CZ, s. r. o., Česká republika.

RČ: 96/945/95-C

B: Dosud: 10 x 15 g.

Nově: 1 x 15 g.

SEDAZINE 100 mg/ml inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 96/1347/97-C

B: Dosud: 12 x 50 ml

Nově: 1 x 50 ml, 12 x 50 ml.

STREPTONAMID plv. ad us. vet.

DR: Infuzia a.s. Hořátek, Česká republika.

RČ: 98/840/69-C

OL: Dosud: Maso 15 dnů.

Nově: Maso 15 dnů. Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.

SUVAXYN ERYSIPELAS inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 97/050/98-C

B: Dosud: 100 ml.

Nově: 10 dávek (20 ml), 50 dávek (100 ml), 10 x 50 dávek (10 x 100 ml).

TAD SALMONELLA vac. E lyof. ad us. vet.

DR: Lohmann Animal Health GmbH & CO. KG, Německo.

RČ: 97/082/00-C

B: Dosud: 1 x 100 dávek, 10 x 1000 dávek.

Nově: 1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 1 x 2000 dávek, 10 x 2000 dávek.

TIAMUTIN BIO 2 % premix ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 98/154/98-C

DO: Dosud: a) Uzavřený PE sáček vložený do PE válcovité krabice s vnitřním víkem a šroubovacím uzávěrem. b) PE pytel vložený do kartonového válcovitého sudu s víkem a uchem. Příbalová informace uvedena na etiketě.

Nově: a) 500 g – Uzavřený PE sáček vložený do PE válcovité krabice s vnitřním víkem a šroubovacím uzávěrem.

b) 3 kg, 5 kg – PE pytel vložený do lepenkového kbelíku s PE nástřikem nebo do PE kbelíku s víkem a uchem.

c) 10 kg, 15 kg – PE pytel vložený do PE soudku s víkem, nebo do lepenkového bubnu s PE nástřikem a víkem.

d) 25 kg – PE pytel vložený do lepenkového bubnu s PE nástřikem a víkem. Příbalová informace uvedena na etiketě.

PE: 24 měsíců. Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

TIAMUTIN BIO 10 % premix ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 98/153/98-C

DO: Dosud: a) Uzavřený PE sáček vložený do PE válcovité krabice s vnitřním víkem a šroubovacím uzávěrem.

b) PE pytel vložený do kartonového válcovitého sudu s víkem a uchem. Příbalová informace uvedena na etiketě.

Nově: a) 500 g – Uzavřený PE sáček vložený do PE válcovité krabice s vnitřním víkem a šroubovacím uzávěrem.

b) 3 kg, 5 kg – PE pytel vložený do lepenkového kbelíku s PE nástřikem nebo do PE kbelíku s víkem a uchem.

c) 10 kg, 15 kg – PE pytel vložený do PE soudku s víkem, nebo do lepenkového bubnu s PE nástřikem a víkem.

d) 25 kg – PE pytel vložený do lepenkového bubnu s PE nástřikem a víkem. Příbalová informace uvedena na etiketě.

PE: 24 měsíců. Po zamíchání do krmiva spotřebovat ihned.

TINKANIUM inj. ad us. vet.

DR: Fort Dodge Animal Health, USA.

RČ: 96/285/94-C

I: Dosud: Cílová zvířata: Koně, skot, prasata, ovce. Akutní a chronická infekční onemocnění koní, skotu, prasat a ovcí, vyvo-

lané bakteriální mikroflórou citlivou na sulfadimidin a trimetoprim (např. pneumonie, bronchitidy, gastroenteritidy, puerperální infekce, omfaloflebitidy, mastitidy, dále influenza, salmonelóza, pastereulóza apod.)
Nově: Cílový druh zvířat: Kůň, skot, prase. Přípravek Tinkanium inj. ad us. vet. je určen k léčbě a prevenci akutních a chronických infekčních onemocnění koní, skotu a prasat způsobených bakteriemi citlivými k trimetoprim/sulfadimidinu. Jde například o pneumonie, bronchitidy, influenzu, gastroenteritidy, mastitidy, puerperální infekce, omfaloflebitidy, pasteurelózu, salmonelózu aj.

B: Dosud: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 10 x 100 ml, 1 x 250 ml.
OL: Dosud: Maso 15 dnů, mléko 15 dnů.
Nově: Maso 10 dnů, mléko 72 hodin.

TETRAVET L.A. inj. ad us. vet.

DR: Dosud: Sanofi Animal Health Slovakia, s. r. o., Slovenská republika.
Nově: Ceva Animal Health Slovakia, s. r. o., Slovenská republika.
V: Dosud: Sanofi Santé Nutrition Animale, Francie.
Nově: Ceva Santé Animale S. A., Francie.
RČ: 96/027/94-C
ZS: Dosud: Při teplotě 5 – 15 °C.
Nově: Při teplotě 15 – 25 °C.

TRISULMIX LIQUIDE sol. ad us. vet.

DR: Dosud: Merial SAS, Francie.
Nově: COOPHAVET, B. P., Francie.
RČ: 96/016/98-C

TRIVETRIN inj. ad us. vet.

DR: Schering-Plough Central East AG, Švýcarsko.
V: Dosud: Malinckrodt Veterinary, Velká Británie.
Nově: Essex Animal Health Friesoythe, Německo.
RČ: 96/677/96-C
B: Dosud: 10 x 100 ml.
Nově: 1 x 100 ml, 10 x 100 ml.

dosud: **NOVALGIN inj. ad us. vet.**

nově: **VETALGIN inj. ad us. vet.**

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/724/95-C

XYLAZINE 2% ALFASAN inj. ad us. vet.

DR: Alfasan International B.V., Nizozemsko.
RČ: 96/025/00-C
OL: Dosud: Bez ochranných lhůt.
Nově: Maso bez ochranné lhůty. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidskému konzumu.

Zrušení registrace

AMPROL PLUS prm. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
RČ: 98/243/92-C

AMPROLMIX 25 % plv. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.
RČ: - 98/1064/97-C

ANPRODAZOLO 200 prm. ad us. vet.

DR: Chemifarma SPA, Itálie.
IČ: 98/249/96-C

APIVAR proužky ad us. vet.

DR: Laboratories Biové, Francie.
RČ: - 96/146/97-C

AVATEC 15 % CC prm. ad us. vet.

DR: Alpharma, Norsko.
RČ: 98/206/92-C

AVIAX 5 % premix ad us. vet.

DR: Pfizer Animal Health, ČR.
RČ: 98/735/96-C

BIOPROL E prm. ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 96/163/98-C

CLINACOX 0.5 % plv. ad us. vet.

DR: Novartis CZ, Česká republika.

RČ: 96/205/92-C

COLINAK inj. ad us. vet.

DR: Mevak a.s. Nitra, Slovenská republika.

RČ: 97/430/91-S/C

COLIPRIM sol. ad us. vet.

DR: Abic Ltd, Israel.

RČ: 96/734/96-C

COXISTAC 12 % premix ad us. vet.

DR: Pfizer Animal Health, Belgie.

RČ: 96/057/98-C

CYCOSTAT ROBENIDINE 6.6 % prm. ad us. vet.

DR: Alpharma, Norsko.

RČ: 98/263/91-C

CYGRO ANTICOCCIDIAL 1 % prm. ad us. vet.

DR: Alpharma, Norsko.

RČ: 98/288/90-C

DEXTRAN INFUZIA inj. ad us. vet.

DR: Infusia, a. s., Hořátev, Česká republika.

RČ: 96/105/80-C

DIHYDROSTREPTOMYCIN VETERIN inj. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/680/95-C

DIETAN T premix ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/113/80-C

DIMETAN sol. ad us. vet.

DR: Chemifarma S.p.A., Itálie.

RČ: 96/847/95-C

ELANCOBAN 100 premix ad us. vet.

DR: Eli Lilly-Elanco, Rakousko.

RČ: 98/216/85-C

EXCENEL RTU inj. ad us. vet.

DR: Pharmacia&Upjohn, Belgie.

RČ: 96/071/98-C

FARMED T premix ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/114/80-C

FLATULEX inj. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/726/95-C

FLAVOMYCIN 80 plv. ad us. vet.

DR: Hoechst Roussel Vet, SRN.

RČ: 98/008/91-S/C

FLUMEQUINE 20 % sol. ad us. vet.

DR: Invesa International S. A., Španělsko.

RČ: 96/152/97-C

GENTAMICIN KRKA inj. ad us. vet.

DR: Krka, Slovinsko.

RČ: 96/678/95-C

GENTAMICIN VETERIN 5 % inj. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/697/95-C

GROSAL 12 % gran. ad us. vet.

DR: Krka, Slovinsko.

RČ: 96/174/96-C

IVERGEN inj. ad us. vet.

DR: Biogenessis-Sintyal, Argentina.

RČ: 96/036/98-C

KOKCISAN 12 % gran. ad us. vet.

DR: Krka, Slovinsko.

RČ: 96/997/95-C

LERBEK 20 % prm. ad us. vet.

DR: Merial SAS, Francie.

RČ: 98/117/92-C

LS 22 ply. ad us. vet.

DR: Biofaktory Praha, spol. s r. o.

RČ: 96/551/96-C

LS 44 ply. ad us. vet.

DR: Biofaktory Praha, spol. s r. o.

RČ: 96/552/96-C

LYDIUM-KLP 2 mg inj. ad us. vet.

DR: Streuli, Švýcarsko.

RČ: 96/631/96-C

LYDIUM-KLP 5 mg inj. ad us. vet.

DR: Streuli, Švýcarsko.

RČ: 96/632/96-C

MAXIBAN G 160 prm. ad us. vet.

DR: Eli Lilly - Elanco, Rakousko.

RČ: 98/529/94-C

MAXUS 100 premix ad us. vet.

DR: Eli Lilly - Elanco, Rakousko.

RČ: 99/147/86-C

MEDICINÁLNÍ LIZ PRO PŘEŽVÝKAVCE ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 98/187/82-C

MEDICINÁLNÍ LIZ SE SÍROU ad us. vet.

DR: Bioveta, a. s., Česká republika.

RČ: 98/109/82-C

MONTEBAN premix ad us. vet.

DR: Eli Lilly, Elanco, Rakousko.

RČ: 98/172/85-C

NEO VAGINAL endofoam ad us. vet.

DR: Industrial Veterinaria SA-Invesa, Španělsko.

RČ: 96/044/98-C

NO-SPA inj. ad us. vet.

DR: Sanofi-Phylaxia, Maďarsko.

RČ: 96/034/94-C

OPTIPRIME PIGLET susp. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/865/95-C

OPTIPRIME plv. sol. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/867/95-C

OPTIPRIME oral susp. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/864/95-C

OPTIPRIME 48 % inj. ad us. vet.

DR: Veterin SA, Recko.

RČ: 96/866/95-C

OXYLA 20 % inj. ad us. vet.

DR: Códifar, Belgie.

RČ: 96/1011/95-C

PENBEX inj. ad us. vet.

DR: Invesa International S. A., Španělsko.

RČ: 96/151/97-C

PRAJANA plv. ad us. vet.

DR: Indian Herbs Research and Supply Co. Pvt. Ltd., Indie.

RČ: 96/543/97-C

PRAJANA HS kapsle ad us. vet.

DR: Indian Herbs Research and Supply Co. Pvt. Ltd., Indie.

RČ: 96/542/97-C

PRODIGESTAN granulát ad us. vet.

DR: Slovakoarma a. s., Slovenská republika.

RČ: 75/923/69-S/C

PULMOTIL 100 premix ad us. vet.

DR: Elanco, Rakousko.

RČ: 98/126/96-C

QUINABIC 7 % inj. ad us. vet.

DR: Abic Ltd., Israel.

RČ: 96/1346/93-C

QUINABIC 14 % inj. ad us. vet.

DR: Abic Ltd., Israel.

RČ: 96/1347/93-C

QUINABIC plv. sol. ad us. vet.

DR: Abic Ltd., Israel.

RČ: 96/1345/93-C

REPLANTA plv. ad us. vet.

DR: Indian Herbs Research and Supply Co. Pvt. Ltd., Indie.

RČ: 96/544/97-C

ROBENIDIN 6.6 % prm. ad us. vet.

DR: W. Rothel GmbH, Německo.

RČ: 98/032/93-C

RUMENSIN 100 prm. ad us. vet.

DR: Eli Lilly - Elanco, Rakousko.

RČ: 98/766/94-C

RUMINATORIO-H plv. ad us. vet.

DR: Laboratorios Hipra, S. A., Španělsko.

RČ: 96/103/97-C

SACOX 120 mikrogram. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 98/496/91-S/C

SALOCIN 120 mikrogram. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 98/1128/91-C

STENOROL prm. ad us. vet.

DR: Intervet International B.V., Nizozemsko.

RČ: 98/501/93-C

STRESSCARE plv. ad us. vet.

DR: Indian Herb Research and Supply Co Pvt. Ltd., Indie.

RČ: 96/1223/97-C

TAMOX GRANULÁT

DR: Lohmann Animal Health GmbH, Německo.

RČ: 96/332/96-C

TRIMETOX VEYX inj. ad us. vet.

DR: Veyx-Pharma GmbH, Německo.

RČ: 96/946/94-C

TYLAN 50 inj. ad us. vet.

DR: Elanco, Eli Lilly, Rakousko.

RČ: 96/249/70-C

UNI-BIOVIT 100 plv. ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 96/983/95-C

UNI-CTC 40 prm. ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/043/95-C

UNI-MAG premix ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/722/95-C

UNI-TIAMUTIN 1 % premix ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/091/96-C

UNI-TIAMUTIN 2 % plv. ad us. vet.

DR: Univit, s. r. o., Česká republika.

RČ: 98/673/95-C

XYLAVET inj. ad us. vet.

DR: Lavet Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko.

RČ: 96/467/96-C

ZEETRESS plv. ad us. vet.

DR: Indian Herb Research and Supply Co Pvt. Ltd., Indie.

RČ: 96/1222/97-C

Ing. Stanislav Kozák, v. r.
ředitel odboru zemědělských komodit

Doc. MVDr. Alfred Hera, CSc., v. r.
ředitel ÚŠKVBL

Ministerstvo zemědělství
Odbor zemědělských komodit – 7010
Čj.: 33024/2001–7010

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně
Odbor krmiv
Čj.: 374/01/RKK

**Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných
výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných
podle zákona o krmivech
stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001**

- 1) Ministerstvo zemědělství a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“), Hroznová 2, 656 06 Brno, odbor krmiv v Praze, vydávají Seznam výrobců a dovozců registrovaných podle § 10 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, stav za období od 1. 9. 1996 do 30. 6. 2001. Tento seznam je totožný se Seznamem výrobců a dovozců registrovaných podle citovaného zákona, stav za období od 1. 9. 1996 do 31. 12. 2000, který je uveden ve Věstníku Ministerstva zemědělství – částka 3 z června 2001, s výjimkou výrobců a dovozců, kteří již požádali o registraci podle § 8 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. a čl. II, bod 1 a výrobců a dovozců registrovaných podle zákona o krmivech, jimž byla na vlastní žádost zrušena registrace podle § 9 odst. 5 citovaného zákona. Jmenovaní výrobci a dovozci jsou uvedeni v následujících seznamech.

Seznam

výrobců, kterým byla na vlastní žádost zrušena registrace podle § 9 odst. 5 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) výrobce</i>	<i>Název a adresa výrobního provozu</i>
578V Agroslužby Třinec s. r. o. 739 61 Třinec	Závod krmiv Oldřichovice, 739 58 Třinec – Oldřichovice
809V Evžen Pokrupa. 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší čp. 85	Pojízdná míchárna krmiv – trvalé stanoviště Vlčkovice v Podkrkonoší čp. 85, 544 44
751V SKOKANOVÁ, spol. s r. o. 675 73 Březník 254	Mlýn Březník
85V Vlastimil Vápeník Brožíkova 431 530 09 Pardubice	Dašice v Čechách
562 V Zemědělské družstvo „Chovatel“ Stříbrná Skalice 281 67 Stříbrná Skalice, okr. Kolín	VKS Stříbrná Skalice

Seznam

dovozců, kterým byla na vlastní žádost zrušena registrace podle § 9 odst. 5 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) dovozce</i>	
34D EFZET, s. r. o. S. K. Neumanna 2009/3 182 00 Praha 8	793D GARA Sezemice, s. r. o. Žižkova 576 533 04 Sezemice
459D Jiří Rambousek – ARKE – KAMION SCANIA – SPEDITION – TRANSPORT Malé Pásky 1348 263 01 Dobříš	903D Oldřich Kuchař – OK TRADING Pod vinohrady 1180 696 81 Bzenec

- 2) Ministerstvo zemědělství a ÚKZÚZ dále vydávají Seznam výrobců, osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv, dovozců, dodavatelů a distributorů registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., stav za období od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2001:

Seznam
výrobků registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

1. Seznam registrovaných výrobců na druh výroby: Výroba krmiv

a) Výrobci krmných surovin¹⁾

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) výrobce</i>	<i>Evidenční číslo výrobního provozu Název a adresa výrobního provozu</i>
10003 AVICENTRA, s. r. o. Stropešín 675 55 p. Hrotovice	10003-1 AVICENTRA s. r. o. Stropešín 675 55 Hrotovice
10012 Březnický mlýn s. r. o. 675 74 Březník 254	10012-1 Březník 254
10010 EUROSERUM s. r. o. Na Poříčí 25 110 00 Praha 1	10010-1 EUROSERUM, s. r. o. Revoluční 845 349 22 Stříbro
10006 Ing. Pavel Kucián Havelkova 23 625 00 Brno	10006-1 Ing. Pavel Kucián provoz Mořice 798 28 Mořice
10011 J. A. C., spol. s r. o. Přerovská 761 769 01 Holešov	10011-1 J. A. C., spol. s r. o. Přerovská 761 769 01 Holešov
10007 Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. 543 61 Kunčice nad Labem	10007-1 Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. 543 61 Kunčice nad Labem
10013 Krnovská škrobárna spol. s r. o. ČSA 52 794 01 Krnov	10013-1 Krnovská škrobárna spol. s r. o. divize mlýn ČSA 52, 794 01 Krnov
10002 Měšťanský pivovar PLATAN s. r. o. Pivovar 168 398 11 Protivín	10002-1 Sladovna pivovaru
10009 PLZEŇSKÉ MLÝNY s. r. o. Prokopova 26 303 92 Plzeň	10009-1 Kalikovský mlýn, Radčická 40, 303 92 Plzeň 10009-2 Soukupův mlýn, Malesice 17, 330 33 Město Touškov 10009-3 Parní mlýn, Resslova 15a, 303 92 Plzeň
10005 Vladimír Mráz Nad Lomnicí 1256 388 01 Blatná	10005-1 LYCKEBY AMYLEX, a. s. Strakonická 946 341 00 Horažďovice
10001 Zemědělské družstvo Borotín Borotín	10001-1 Lisovna Borotín 391 35 Borotín

b) Výrobci krmných směsí bez použití doplňkových látek

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) výrobce</i>	<i>Evidenční číslo výrobního provozu Název a adresa výrobního provozu</i>
10004 Továrna na krmiva MÍKA, a spol. s r. o. Jateční 470/II Veselí nad Lužnicí	10004-1 Továrna na krmiva MÍKA a spol. s r. o. Jateční 470/II 391 82 Veselí nad Lužnicí
10005 Vladimír Mráz Nad Lomnicí 1256 388 01 Blatná	10005-1 LYCKEBY AMYLEX, a. s. Strakonická 946 341 00 Horažďovice

c) Výrobci krmných směsí s doplňkovými krmiv

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) výrobce</i>	<i>Evidenční číslo výrobního provozu Název a adresa výrobního provozu</i>
10008 Josef Ešpand 561 53 Dolní Čermná 312	10008-1 VKS Dolní Čermná 561 53 Dolní Čermná 312

¹⁾ včetně výrobců směsí krmných surovin

d) Výrobci určitých proteinových krmiv

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) výrobce</i>	<i>Evidenční číslo výrobního provozu Název a adresa výrobního provozu</i>
10005 Vladimír Mráz Nad Lomnicí 1256 388 01 Blatná	10005-1 LYCKEBY AMYLEX, a. s. Strakonická 946 341 00 Horažďovice

Seznam

osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

Seznam registrovaných osob provozujících výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv:

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) registrované osoby</i>	<i>Evidenční číslo výrobního provozu SPZ</i>
60001 Libor Dvořák Lipovec 308 679 15 Lipovec u Blanska	60001-1 JHA 02-42
60003 Vladimír Pecl Štefánikova 74 664 53 Újezd u Brna	60003-1 BIA 09-15
60002 Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Štichovice 331 41 Kralovice	60002-1 ST 89-78

Seznam

dovozců registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) dovozce</i>	
20072 AGROMA TRADE s. r. o. Šaldova 34 180 00 Praha 8	20046 Agropol Trading, s. r. o. Opletalova 4 113 76 Praha 1
20080 Agroservis Tachov, a. s. Nádražní 779 347 23 Tachov	20007 ALCEDOR, s. r. o. U Stadionu 502 373 44 Zlín
20061 A L M I K A společnost s ručením omezeným Veverkova 14 Praha 7	20066 AN Brno, spol. s r. o. Koníleckova 11 625 00 Brno
20045 ANIMACO, s. r. o. nám. Petra Bezruče 18. 690 02 Břeclav	20011 ANIMO – MORAVIA, spol. s r. o. Divadelní 9 741 01 Nový Jičín
20022 ANKA CZ s. r. o. Nový Dvůr 138 783 71 Olomouc – Holice	20029 A-VET s. r. o. Plzeňská 169/240 150 00 Praha 5
20038 BIOFAKTORY PRAHA spol. s r. o. Na Chvalce 2049 Praha 9	20013 BIOHEMA CZ, s. r. o. Náchodská 866 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
20040 Bioveta, a. s. Komenského 22 683 23 Ivanovice na Hané	20055 Bohemia Safari s. r. o. 471 29 Brniště

20058	B O R, s. r. o. Na Bílé 1231 565 01 Choceň	20003	CIMEX, spol. s r. o. Nad Opatovem 2140 Praha 4
20006	CYMEDICA, spol. s r. o. Pod nádražím 654 268 01 Hořovice	20005	Dagmar Jonášová DALUB L. Kuny 542 272 04 Kladno – Rozděllov
20079	Danisco Cultor Bohemia, a. s. Palackého 6 Smířice	20081	DELACON Biotechnik ČR, spol. s r. o. Bohdíkovská 7 787 01 Šumperk
20054	E C P spol. s r. o. Kralovická 11 Praha 10	20076	EIVO Czech Pet, s. r. o. Lidická 26 Praha 5
20030	ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo Brněnská 634 Měříčice	20001	EQUUS spol. s r. o. Smetanova 13 Český Těšín
20059	FERROPORT s. r. o. 687 53 Suchá Lož 37	20071	FITMIN a.s. Helvíkovice čp. 90 564 01 Žamberk
20031	František Mokřý 252 03 Lískovice 0295	20027	GIMBORN Česká republika s. r. o. V mokřinách 283/8 147 00 Praha 4
20032	GROLMANN, s. r. o. Olomoucká 89 627 00 Brno	20070	GUYOKRMA, spol. s r. o. U Zahradního města 1794/4 106 00 Praha 10
20024	HAAS s. r. o. Čejč 30	20014	HANAGRAIN J. T. J. s. r. o. Čapky Dráhlovského 18 Přerov
20047	HEEL a. s. Tyřšova 196 Benešov	20075	HSM servis s. r. o. Radiová 1 102 24 Praha 10
20041	HYDRO CZECH REPUBLIC, s. r. o. Dušní 10 Praha 1	20017	Chassot s. r. o. Zámečnická 411 288 02 Nymburk
20053	„IDEA Praha, společnost s ručením omezeným“ U družstva práce 82 140 00 Praha 4	20042	IBV TREND, spol. s r. o. Na strání 597 686 01 Uherské Hradiště
20049	IDEX Z. spol. s r. o. Hotel – Lázně Kostelec 763 14 Zlín – Kostelec	20063	IFC FOOD spol. s r. o. Nad Kelerkou 33/8 Praha 9
20050	Indian Herbs (CZ) s. r. o. S. K. Neumannova 2009/3 180 00 Praha 8	20020	Ing. Milan Janoušek Dělnická 77, Sedláčanky 250 88 Čelákovice
20056	Ing. Radim Prášek Dědická 30 627 00 Brno 27	20060	JaM Servis, s. r. o. Nádražní 437 Kutná Hora
20062	Jamenská a. s. 561 65 Jamné nad Orlicí 289	20039	Jan Salač Borek 40 277 14 Dřívý
20033	JH AGROCOM, spol. s r. o. Prvomájová 288 Plzeň – Křimice	20084	Kali + Salz spol. s r. o. Novodvorská 1010/14 Praha 4
20023	Kanadská obchodní společnost spol. s r. o. Kamzíková 9 110 00 Praha 1	20067	KARLOV, a.s. místní část Karlov Dačice
20085	KAVEX – GRANIT HOLDING a. s. Houškova 35 301 54 Plzeň	20077	KONFIRM, spol. s r. o. Purkyňova 45 612 00 Brno

20016	KUPSON spol. s r. o. Hradecká 14 Opava	20010	LAKTOS PRAHA spol. s r. o. Nová cesta 17 Praha 4
20057	LEUCHTER s. r. o. Milevů čp. 37 349 01 Stříbro	20051	LUKROM, spol. s r. o. Lípa – sílo 763 11 Zlín
20044	Marcela Žďárská 9. května 1807 440 01 Louny	20021	Martin Hruška – „CRS Marketing“ 411 12 Čížkovice 83
20036	Master Foods, kom. spol. Pražská 320 257 21 Poříčej nad Sázavou	20073	METOP AQUARIUM, společnost s ručením omezeným Střelecký vřeh 690 463 31 Chrastava
20083	Miroslav Weber – MLÝN Masarykova 1268 268 01 Hořovice	20068	NET spol. s r. o. Čechyňská 23 602 00 Brno
20015	NEUBER BRENNTAG spol. s r. o. Mezi Úvozy 1850 Praha 9	20087	Novartis Czech Republic s. r. o. V Olšinách 75 100 00 Praha 10
20043	OLEASPOL, a. s. Americká 18 Praha 2	20002	OMYA obchodní společnost s r. o. Apolinářská 6 Praha 2
20035	Popak, spol. s r. o. Kolofíkovo nář. 52 747 05 Opava	20064	Provit, s. r. o. Dědinská 29 160 00 Praha 6
20052	ROCHE s. r. o. Dukelských hrdinů 52 170 00 Praha 7	20008	RÖTHEL Praha, spol. s r. o. Pod Kavalírkou 18 150 00 Praha 5
20065	SALINEN PRAHA s. r. o. Tiskařská 10/257 108 28 Praha 10	20018	SAMOHÝL a spol., v. o. s. Poděbradova 1300 Lomnice nad Popelkou
20048	SAXO, spol. s r. o. Kudlov 329 760 01 Zlín	20074	SCHAUMANN ČR s. r. o. nám. Svobody 35 387 01 Volyně
20012	Slavkovské krmné směsi a. s. 685 01 Marešy	20082	SLOV MLÝN, spol. s r. o. 696 74 Velká nad Veličkou 476
20028	Solsan, a. s. 1. pluku 8 – 10 Praha 8	20037	TENESCO s. r. o. Mělnická 114 Libiř
20019	Unicoop spol. s r. o. Revoluční 13 110 00 Praha 1	20009	UNIVIT s. r. o. Na Vlčinci 3 779 00 Olomouc
20086	Vebor s. r. o. 341 01 Velký Bor 114	20004	Zemědělská agentura, s. r. o. Pod Terebkou 4/15 140 00 Praha 4 – Nusle
20025	Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Štichovice 331 41 Kralovice	20078	Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Kolinci Kolinec
20034	ZETEN spol. s r. o. Husova 276 336 01 Blovice	20069	ZOO – PET Praha, s. r. o. Naskové 1/1189 150 00 Praha 5
20026	ZNZ Přeštice, a. s. Husova 438 334 22 Přeštice		

Seznam

dodavatelů registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) dodavatele</i>	<i>Název a adresa dodavatelského provozu</i>
30004 AGROPROGRES – SERVIS s. r. o. Zábřežská 41 789 85 Mohelnice	Ing. Křížek Josef – Dubicko 204 789 72 Dubicko
30005 BIOFAKTORY PRAHA spol. s r. o. Na Chvalce 2049 Praha 9	BIOFAKTORY PRAHA spol. s r. o. Na Chvalce 2049, Praha 9 – Horní Počernice BIOFAKTORY PRAHA spol. s r. o. provoz Pečky, P. Bezruč 476, Pečky
30002 BIOCHEMA CZ, s. r. o. Náchodská 866 193 00 Praha 9	Božanovská 1759 193 00 Praha 9
30009 HANSA obchodní s.r.o. Suchomelská 7 370 10 České Budějovice	HANSA obchodní s. r. o. Suchomelská 7, 370 10 České Budějovice
30001 INTER TRAB CENTRUM, spol. s r. o. Dr. Eduarda Beneše 572 763 61 Napajedla	MIVITA, s. r. o. Dolní náměstí 308 755 01 Vsetín
30007 Martin Paroulek Komenského 41 747 91 Štítina	Areál ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice Mokré Lazce, 747 62
30003 UNIVIT s. r. o. Na Vlčinci 3 779 00 Olomouc	UNIVIT, s. r. o., Sadová 5, 783 91 Olomouc
30006 Vladimír Dostál Olbramice 46 783 22 Cholina, Olbramice	Areál ZD Senice na Hané středisko Vilémov 783 22
30008 ZEA Sedmihorky, spol. s r. o. Radvanovice 98 512 62 Karlovice u Turnova	Roudný 53 512 62 Karlovice u Turnova

Seznam

distributorů registrovaných podle § 4 odst. 1 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech,
ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

stav od 1. 1. do 30. 6. 2001

<i>Registrační číslo, obchodní jméno (nebo jméno a příjmení), sídlo (nebo bydliště) distributora</i>	
40002 Agropol Trading, s.r.o. Opletalova 4 113 76 Praha 1	40011 AGROSERVIS, 1. zemědělská a. s. Višňové Višňové 358
40009 AGROSLUŽBY NOVÝ JIČÍN – – ODBYTOVÉ CENTRUM a. s. Divadelní 9 741 11 Nový Jičín	40013 ČESKÉ SANO spol. s r. o. Npor. O. Bartoška 15 344 01 Domažlice
40001 Genoservis, a. s. J. Jabůrkové 1 Olomouc	40019 Ing. Bronislav Gloga 747 55 Litultovice 91
40016 Ing. František Slepíčka Na Štěpánce 458 322 00 Plzeň	40015 Ing. Jiří Cikryt Dlouhé 56 592 55 Bobrová

40014	Ing. Jiří Kadera Hlávkova 1102 334 01 Přeštice	40018	Ing. Luděk Štůra 742 54 Bartošovice 276
40003	Ing. Milan Masopust 289 33 Křinec č. 361	40006	Ing. Pavel BYDŽOVSKÝ POD STRAŠNICKOU VINICÍ 32/1023 100 00 Praha 10
40004	Ing. Petr Hobza 285 76 Choťusice 283	40010	Ing. Petr Sobola Havlíčkova 26 568 02 Svitavy 2
40017	Martin Paroulek Komenského 41 747 91 Štítina	40020	MERIAL SAS – organizační složka Zelený pruh 99 140 02 Praha 4
40007	MVDr. Libor Kacbunda Staré Sedlo 90 398 07 Orlík nad Vltavou	40008	MVDr. Pavla LÖWENTHALOVÁ Hlubčická 154 794 01 KRNOV
40005	PAVEL NEČESANÝ STOCHOVSKÁ 29 161 00 PRAHA 6	40022	PRECOLOR a. s. nář. dr. Ed. Beneše 24 Přerov
40021	Vladimír Dostál Olbramice 46 783 22 Cholina; Olbramice	40012	ZETEN spol. s r. o. Husova 276 336 01 Blatná

ÚKZÚZ
ředitel odboru krmiv
Ing. Jiří Zedník, CSc., v. r.

Ministerstvo zemědělství
ředitel odboru zemědělské výroby
Ing. Stanislav Kozák, v. r.

Ministerstvo zemědělství
Odbor zemědělských komodit - 7010
Č.j. 32385/01-7010

Oznámení Ministerstva zemědělství

o stanovení druhů, jejichž rozmnožovací materiál lze uvádět do oběhu po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku Ministerstva zemědělství jako obchodní, při dodržení stanovených vlastností

Ministerstvo zemědělství, (dále jen „Mze“) odbor zemědělských komodit, s ohledem na situaci způsobenou nepříznivými klimatickými podmínkami v době sklizně semenných porostů obilovin, a ohrožení zásobení trhu certifikovaným rozmnožovacím materiálem v kvalitě předepsané zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb. (dále jen „zákon“) a Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 191/1996 Sb., (dále jen „vyhláška“), po projednání s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským

stanovuje

podle § 32 odst. 1 zákona, že druhy, jejichž rozmnožovací materiál ozimých forem lze po dobu jednoho roku ode dne oznámení ve Věstníku Mze uvádět do oběhu jako obchodní jsou

pšenice obecná
žito seté

Rozmnožovací materiál uvedených druhů lze uvádět do oběhu za těchto podmínek:

- 1) musí být vyroben z množitelských porostů uznaných podle § 22, odst. 4 zákona.
- 2) nesmí mít klíčivost nižší než:
 - u žita 80 %
 - u pšenice 83 %
- 3) obchodní rozmnožovací materiál nesmí být přeskládán pro následující sezónu 2002/2003
- 4) v ostatním musí splňovat požadavky stanovené zákonem a vyhláškou pro kategorii certifikované osivo

Kontrola vlastností obchodního rozmnožovacího materiálu uvedených druhů se provádí podle zákona a vyhlášky.

Ing. Stanislav Kozák
ředitel odboru zemědělských komodit v.r.

Ministerstvo zemědělství
Odbor zemědělských komodit - 7010
Č.j. 32 331/01 - 7014

Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský v Brně
Odbor odrůdového zkušebnictví

Oznámení o zápisech, změnách a doplňujících zápisech do Státní odrůdové knihy za období od 2. července 2000 do 31. května 2001

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně, Odbor odrůdového zkušebnictví podle § 12 odst. 5 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin ve znění zákona č. 357/1999 Sb., (dále jen „zákon“) oznamuje všechny zápisy, změny a doplňky zápisů do Státní odrůdové knihy za období od 2. července 2000 do 31. května 2001.

Kapitoly:

- 1) Odrůdy rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona v období od 2. července 2000 do 31. května 2001.
- 2) Popisy odrůd registrovaných podle § 11 zákona v období od 2. července 2000 do 31. května 2001.
- 3) Odrůdy rostlin, u kterých byla zrušena registrace podle § 16 zákona v období od 2. července do 31. května 2001.
- 4) Odrůdy rostlin registrovaných podle § 11, u kterých byla změna údaje o udržovateli v období od 2. července 2000 do 31. května 2001.
- 5) Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců.

Ing. Stanislav K o z á k, v. r.
ředitel odboru zemědělských komodit

O z n á m e n í
o zápisech, změnách a doplňcích zápisů do Státní odrůdové knihy
podle § 12 odst. 5 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za období od 2. července 2000 do 31. května 2001

1. Odrůdy rostlin, které byly registrovány podle § 11 zákona v období od 2. července 2000 o 31. května 2001

Ve sloupcích uvedeny následující údaje:

- 1 – identifikační číslo odrůdy
- 2 – udržovatel a žadatel (je-li žadatel jiný než udržovatel, je uveden v závorce)
- 3 – zmocněný zástupce
- 4 – název odrůdy
- 5 – označení odrůdy v řízení o registraci
- 6 – datum podání žádosti o registraci
- 7 – datum nabytí právní moci rozhodnutí o registraci

Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů a zmocněných zástupců uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Zemědělské plodiny

Obilniny

Ječmen

Hordeum vulgare L.

– jarní

HRV04827	77	196	Annabell	NORD 92 K 0012 D 14	07. 01. 1997	29. 03. 2001
HRV05153	380	636	Sabel	NFC 495-17	01. 12. 1997	29. 03. 2001

– ozimý

HRV05043	675	172	Alissa	NIC-93 5000	21. 08. 1997	01. 02. 2001
HRV04407	736	158	Angela	90/189	26. 08. 1996	01. 02. 2001
HRV05044	373	172	Camera	NSL 92-6336 C	21. 08. 1997	01. 02. 2001
HRV05062	77	255	Carola	NORD 90502/30	25. 08. 1997	01. 02. 2001
HRV05060	66 (77)	255	Nelly	NORD 90507/15	25. 08. 1997	01. 02. 2001
HRV05030	292	636	Vilna	Cebeco 95246	18. 08. 1997	01. 02. 2001

Kukuřice

Zea mays L.

ZEA05429	711	268	Abundance	CGS 6106	21. 01. 1998	12. 04. 2001
ZEA04930	781	500	Anjou 248	A 4611	29. 01. 1997	23. 03. 2001
ZEA05446	781	500	Anjou 268	A 4623	28. 01. 1998	23. 03. 2001
ZEA05481	777	493	Benicia	X0914A	02. 02. 1998	23. 03. 2001
ZEA05411	670	535	Birko	SK 284062	19. 01. 1998	09. 04. 2001
ZEA05482	777	493	Calimera	X0805H	02. 02. 1998	23. 03. 2001
ZEA05403	196		Cemet 260	CE 6397	16. 01. 1998	29. 03. 2001
ZEA05453	69	645	Cocagne	KX 6365	29. 01. 1998	03. 04. 2001
ZEA05473	362	662	Esprit	SN 9850	30. 01. 1998	23. 3. 2001
ZEA05428	711	268	Fatima	CGS 6374	21. 01. 1998	12. 04. 2001
ZEA05449	69	645	Fjord	KX 6312	29. 01. 1998	09. 04. 2001
ZEA05448	69	645	Fuego	KX 6109	29. 01. 1998	03. 04. 2001
ZEA04733	670	535	Graf	Graf	08. 01. 1997	09. 04. 2001
ZEA05477	777	493	Justina	X0806A	02. 02. 1998	23. 03. 2001
ZEA05475	357	662	Kampala	SN 9424	30. 01. 1998	23. 03. 2001
ZEA05478	777	493	Lambada	X0806B	02. 02. 1998	23. 03. 2001
ZEA05469	362	145	LG 2195	LZM 147/31	28. 01. 1998	12. 04. 2001
ZEA05465	362	145	LG 2213	LZM 146/52	28. 01. 1998	12. 04. 2001
ZEA05464	362	145	LG 2229	LZM 247/32	28. 01. 1998	03. 04. 2001
ZEA05489	427	147	Meduse	VDH 5143	29. 01. 1998	23. 03. 2001
ZEA05450	69	645	Pedro	KX 6134	29. 01. 1998	03. 04. 2001
ZEA05474	357	662	Trento	SN 9517	30. 01. 1998	23. 03. 2001
ZEA05490	427	147	Winston	VDH 5150	29. 01. 1998	23. 03. 2001

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Oves

Avena sativa L.

AVS05166	172		Azur	SG-K 961010	12. 12. 1997	23. 03. 2001
AVS05174	444	147	Dagny	SW 923838	15. 12. 1997	16. 03. 2001
AVS05176	526	636	Leo	BAUB 24. 89. 07	16. 12. 1997	23. 03. 2001

Pohanka obecná

Fagopyrum esculentum (L.) Moench

FGE05847	615	158	Kara-Dag	Kara-Dag	21. 12. 1998	24. 04. 2001
----------	-----	-----	----------	----------	--------------	--------------

Pšenice obecná

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

– jarní

TTA05181	444	147	Vinjet	SW 32470	15. 12. 1997	09. 04. 2001
----------	-----	-----	--------	----------	--------------	--------------

– ozimá

TTA05058	528	469	Windsor	Windsor	25. 08. 1997	20. 04. 2001
----------	-----	-----	---------	---------	--------------	--------------

Pšenice špalda

Triticum spelta L.

TTS05613	163		Rubiota	RU 11-S	25. 08. 1998	29. 03. 2001
----------	-----	--	---------	---------	--------------	--------------

Tritikale

Triticosecale Wittm.

– ozimé

XTS04431	283	786	Sekundo	SZD 1834/91	26. 08. 1996	17. 07. 2000
----------	-----	-----	---------	-------------	--------------	--------------

Žito

Secale cereale L.

SCC05068	31	271	Fernando	LPH 34	25. 08. 1997	23. 03. 2001
SCC05070	31	271	Picasso	LPH 36	25. 08. 1997	23. 03. 2001

Krmné plodiny

Trávy

Bojínek luční

Phleum pratense L.

PLP04686	497	171	Barfleo	BAR PHL 6712	30. 12. 1996	29. 03. 2001
----------	-----	-----	---------	--------------	--------------	--------------

Jílek mnohokvětý italský

Lolium multiflorum Lam. subsp. *italicum* (A. Br.) Volkart

LLI04688	497	171	Barprisma	BAR LMD 6591	30. 12. 1996	29. 03. 2001
LLI05023	306	160	Fabio	Fabio	30. 07. 1997	17. 05. 2001

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

LLP04689	497	171	Barcredo	Barcredo	30. 12. 1996	29. 03. 2001
LLP04705	115	201	Ferrari	DP 1305	23. 12. 1996	03. 05. 2001
LLP02184	514	495	Charger	Charger	08. 02. 1999	04. 08. 2000
LLP04706	115	201	Mathilde	DP 88-54	23. 12. 1996	25. 04. 2001
LLP04708	115	201	Merci	GG LPG 057	23. 12. 1996	20. 04. 2001
LLP04629	292	636	Option	Cebeco 2012	10. 12. 1996	17. 05. 2001
LLP02185	514	495	Quickstart	Quickstart	08. 02. 1999	04. 08. 2000
LLP04633	292	636	Respect	EER 1390	10. 12. 1996	17. 05. 2001

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Kostrava červená

Festuca rubra L.

FSR04709	115	201	Aniset	Aniset	23. 12. 1996	20. 04. 2001
FSR04736	497	171	Barcorsa	BAR FRR 5305	30. 12. 1996	29. 03. 2001
FSR04710	115	201	Echo	Echo	23. 12. 1996	25. 04. 2001
FSR04711	115	201	Gondolin	Rot 240	23. 12. 1996	25. 04. 2001
FSR04712	115	201	Smirna	Smirna	23. 12. 1996	20. 04. 2001
FSR04713	115	201	Tatjana	72134	23. 12. 1996	20. 04. 2001

Lipnice luční

Poa pratensis L.

PAP04739	497	171	Baronie	Baronie	30. 12. 1996	29. 03. 2001
PAP04717	115	201	Compact	Compact	23. 12. 1996	20. 04. 2001
PAP04691	1032	147	Cynthia	Mom Pp 1765	20. 12. 1996	09. 04. 2001
PAP04635	292	636	Enprima	EVb 295	10. 12. 1996	25. 04. 2001
PAP04551	25	464	Lily	DSV-N 551	11. 12. 1996	24. 04. 2001
PAP04718	115	201	Mardona	DP 37-61. 1	23. 12. 1996	20. 04. 2001

Psárka luční

Alopecurus pratensis L.

AOP04541	158		Zuberská	Alpra 92	11. 12. 1996	17. 05. 2001
----------	-----	--	----------	----------	--------------	--------------

Psineček výběžkatý

Agrostis stolonifera L.

AGS04720	115	201	Prominent	Prominent	23. 12. 1996	20. 04. 2001
----------	-----	-----	-----------	-----------	--------------	--------------

Luskoviny

Bob

Vicia faba L. (partim)

VCF05191	880		Albi	HM-260-BK	17. 12. 1997	25. 05. 2001
VCF05169	172		Merlin	SG-C 8	12. 12. 1997	25. 04. 2001

Hrách

Pisum sativum L. (partim)

PSS05363	213	147	Jackpot	Jackpot	05. 12. 1997	09. 04. 2001
PSS05100	172		Kamelot	SG-L 23	19. 11. 1997	25. 04. 2001

peluška

– jarní

PSS05764	292	636	Racer	Racer	28. 12. 1998	09. 04. 2001
----------	-----	-----	-------	-------	--------------	--------------

Jeteloviny

Jetel luční

Trifolium pratense L.

TFP04353	171		Suez	SE-54	30. 08. 1996	09. 04. 2001
----------	-----	--	------	-------	--------------	--------------

Jetel plazivý

Trifolium repens L.

TFR04356	171		Král	SE-121	30. 08. 1996	09. 04. 2001
TFR04639	292	636	Riesling	EWCK 3	10. 12. 1996	09. 04. 2001

Jiné krmné plodiny

Kapusta krmná

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell. + var. *viridis* L.

BRM04357	171		Pavla	SE-513	30. 08. 1996	23. 11. 2000
----------	-----	--	-------	--------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Olejníky a prádné rostliny

Hořčice sareptská (syn.: Brukev sítinovitá)

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.

BRJ06070	158		Opaleska	OP-BJ-1	26. 02. 1999	17. 05. 2001
----------	-----	--	----------	---------	--------------	--------------

Len

Linum usitatissimum L.

LNU05232	222		Venica	SU 29-2/93	19. 12. 1997	25. 05. 2001
----------	-----	--	--------	------------	--------------	--------------

Řepka

Brassica napus L. (partim)

– jarní

BRN03997	25	464	Licolly	Licolly	05. 12. 1997	17. 05. 2001
----------	----	-----	---------	---------	--------------	--------------

– ozimá

BRN04994	944	469	Cando	MLCH 056	15. 07. 1997	25. 05. 2001
BRN04986	788	636	Jesper	PRO 9616-BN	08. 07. 1997	25. 05. 2001
BRN04326	24	463	Marabu	SLM 058	17. 07. 1996	17. 07. 2000
BRN05009	753	255	Pilot	RG-131/96	16. 07. 1997	25. 05. 2001

Slunečnice

Helianthus annuus L.

HLA05161	339	124	Aladin	Aladin	12. 12. 1997	03. 04. 2001
HLA05162	339	124	Alzan	Alzan	12. 12. 1997	03. 04. 2001
HLA05443	670	535	DK 3806	DK 3806	28. 01. 1998	03. 05. 2001
HLA04451	276	657	GEN 2000	NS-H-459	16. 10. 1996	03. 05. 2001
HLA05406	362	145	LG 5385	LHA 147/01	16. 01. 1998	09. 04. 2001
HLA05358	777	493	Lucil	XF 432	07. 01. 1998	09. 04. 2001
HLA05359	777	493	Olstaril	XF 462 HO	07. 01. 1998	03. 05. 2001
HLA05445	427	500	Pilar	VDP 33542	28. 01. 1998	12. 04. 2001

Brambor a jiné okopaniny

Brambor

Solanum tuberosum L.

SLT04564	219		Apolena	VY 107/7	09. 12. 1996	17. 07. 2000
SLT05105	653	948	Camilla	L 320/88	12. 12. 1997	23. 03. 2001
SLT05260	423 (311)	158	Cicero	Crebas 82 077 62	23. 12. 1997	09. 04. 2001
SLT05305	42	1061	Delikat	2. 1 696-87	23. 12. 1997	23. 03. 2001
SLT05308	310	151	Innovator	RZ 89-2693	27. 12. 1997	23. 03. 2001
SLT04966	784	785	Inova	VR 88-108	11. 12. 1997	14. 03. 2001
SLT05156	519		Kornelie	KE 36/71	12. 12. 1997	07. 03. 2001
SLT05106	653	948	Laura	L 546/89	12. 12. 1997	23. 03. 2001
SLT04727	216		Magda	VE 98/6	23. 12. 1996	17. 07. 2000
SLT04978	45	948	Milva	P 1158	12. 12. 1997	23. 03. 2001
SLT05218	216		Westamyl	VE 94/17	19. 12. 1997	23. 03. 2001

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. *altissima* Döll

BTA05444	16	1015	Assist	S 1703	29. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05319	279	1015	Bolonia	H 4673	30. 12. 1997	07. 03. 2001
BTA05485	316	500	Bronkos	MK 9808	11. 02. 1998	07. 03. 2001
BTA05202	447	268	Compact	HM 1757	19. 12. 1997	07. 03. 2001
BTA05203	447	268	Dream	HM 5430	19. 12. 1997	07. 03. 2001
BTA05420	68	498	Economy	DEL 8636 CZ	19. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05460	69	628	Jolanda	KWS-CZ 8216	30. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05419	68	498	Lord	DEL 8622 CZ	19. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05437	110	482	Mondial	DS 4006	26. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA04643	279	1015	Norfolk	H 66249	31. 12. 1996	17. 07. 2000
BTA05459	46	180	Profil	STRU 1816	30. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05457	46	180	Takt	STRU 1812	30. 01. 1998	07. 03. 2001
BTA05434	110	482	Tower	DS 2002	26. 01. 1998	07. 03. 2001

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Réva

Réva

Vitis L.

– moštové

VIT03327	982		Veritas	RČBH-I-5/3	10. 11. 1994	25. 05. 2001
----------	-----	--	---------	------------	--------------	--------------

Zeleniny

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

BRY05717	708	231	Dannor	Dannor	10. 12. 1998	25. 05. 2001
BRY05749	278	183	Lucky	Bejo 1705	17. 12. 1998	25. 05. 2001
BRY05716	708	231	Winnor	Winnor	10. 12. 1998	25. 05. 2001

Celer bulvový

Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.) Gaud.

APG05660	239		Neon	SM-MB	29. 10. 1998	20. 04. 2001
----------	-----	--	------	-------	--------------	--------------

Cibule

Allium cepa L.

– jarní

ALC05903	299	193	Barito	Barito	11. 01. 1999	14. 03. 2001
ALC05902	299	193	Candy	Candy	11. 01. 1999	14. 03. 2001
ALC05263	552	158	Gialla di Santarcangelo	Gialla di Santarcangelo	23. 12. 1997	14. 03. 2001
ALC05752	278	183	Hyfield	BGS 47	17. 12. 1998	16. 03. 2001
ALC05751	278	183	Legend	Legend	17. 12. 1998	16. 03. 2001
ALC05784	140		Olina	Olina	21. 12. 1998	16. 03. 2001
ALC05785	301	268	Selhurst	Selhurst	21. 12. 1998	14. 03. 2001

– ozimá

ALC05340	278	183	Swift	BGS 70	30. 12. 1997	16. 03. 2001
ALC05527	320	231	Wolf	NIZ 3700	20. 07. 1998	16. 03. 2001

Česnek

Allium sativum L.

– ozimý

ALS05658	562		Anin	P 11 A	16. 10. 1998	19. 10. 2000
ALS05659	562		Anton	N 9 A	16. 10. 1998	19. 10. 2000
ALS05657	562		Elin	P 10 E	16. 10. 1998	19. 10. 2000

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Aschers.

PHV05901	299	193	Alicante	RS 1510	11. 01. 1999	05. 02. 2001
PHV05904	299	193	Grenoble	RS 1384	11. 01. 1999	05. 02. 2001

Fazol obecný pnoucí

Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris

PHV01476	256		Belmonte	Belmonte	08. 10. 1999	05. 02. 2001
PHV02633	256		Goldmarie	Goldmarie	08. 10. 1999	05. 02. 2001
PHV04659	256		Jitka	FP-1/96	23. 12. 1996	05. 02. 2001
PHV05798	256		Neckargold	Neckargold	06. 01. 1999	05. 02. 2001
PHV05797	256		Neckarkönigin	Neckarkönigin	06. 01. 1999	05. 02. 2001
PHV05799	256		Pardola	Pardola	06. 01. 1999	05. 02. 2001

Hrách setý cukrový

Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. emend C. O. Lehm

PSS05796	923	140	Ilowiecki	Ilowiecki	31. 12. 1998	21. 02. 2001
----------	-----	-----	-----------	-----------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *sabauda* L.

BRS05862	301	268	Denver	Denver	21. 12. 1998	07. 03. 2001
BRS05677	634	186	Jocoma	GZG 176	16. 11. 1998	07. 03. 2001
BRS05861	301	268	Siberia	Siberia	21. 12. 1998	07. 03. 2001

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. convar. *oleracea* var. *gemmifera* DC.

BRG05185	140		Dolores	Dora	16. 12. 1997	21. 02. 2001
----------	-----	--	---------	------	--------------	--------------

Kedluben

Brassica oleracea L. convar. *acephala* (DC.) var. *gongylodes*

BRD05142	950	951	Baltik	HP-KB/1	04. 12. 1997	03. 04. 2001
BRD05671	313	186	Eder	Eder	16. 11. 1998	02. 01. 2001
BRD05750	278	183	Kongo	Bejo 1684	17. 12. 1998	02. 01. 2001

Kukuřice setá cukrová

Zea mays L. convar. *saccharata* Koern.

ZEA05907	299	193	Candle	RS 19	11. 01. 1999	25. 05. 2001
ZEA06071	678	103	Mv. Sugár	Mv. Sugár	02. 03. 1999	25. 05. 2001

Květák

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) var. *botrytis* L.

BRB05890	299	193	Beauty	Beauty	11. 01. 1999	14. 03. 2001
BRB05673	313	186	Brabant	Brabant	16. 11. 1998	16. 03. 2001
BRB05674	313	186	Gregor	Gregor	16. 11. 1998	16. 03. 2001

Mrkev

Daucus carota L.

DCC05854	301	268	Amazon	Amazon	21. 12. 1998	20. 04. 2001
DCC05892	299	193	Antares	Antares	11. 01. 1999	20. 04. 2001
DCC05891	299	193	Cesaro	Cesaro	11. 01. 1999	20. 04. 2001
DCC04955	992	558	Maruška	AGX 38-101	17. 02. 1997	20. 04. 2001

Okurka

Cucumis sativus L.

– nakládačka

CCS05905	299	193	Berlinda	RS 93 166	11. 01. 1999	28. 02. 2001
CCS05787	140		Dalila	Dalila	21. 12. 1998	05. 02. 2001
CCS05663	239		Elisabet	SM-P-5288	29. 10. 1998	05. 02. 2001
CCS05726	789		Jitka	BH-106	14. 12. 1998	05. 02. 2001
CCS04950	231		Klárka	LY-RU 8013	14. 02. 1997	05. 02. 2001
CCS05727	789		Lada	BH-105	14. 12. 1998	05. 02. 2001

– salátová

CCS05788	950	951	Desana	HP-UŠ/2	28. 12. 1998	05. 02. 2001
CCS05675	313	186	Media	Media	16. 11. 1998	05. 02. 2001
CCS05728	789		Natalie	BH-303	14. 12. 1998	16. 03. 2001
CCS03021	904	193	Nebraska	Nebraska	23. 12. 1999	05. 02. 2001

Paprika

Capiscum annum L. (partim)

CPA05793	475		Anežka	OL 55	30. 12. 1998	05. 02. 2001
CPA06056	273		Bajka	JMK 92	09. 02. 1999	05. 02. 2001
CPA05791	301	268	Jupiter	Jupiter	21. 12. 1998	05. 02. 2001
CPA05325	475		Ludmila	OL 90 M	30. 12. 1997	05. 02. 2001
CPA02423	273		Meika	JMK 89	03. 02. 1999	05. 02. 2001
CPA05877	293	916	Monte	DRP 181	06. 01. 1999	05. 02. 2001
CPA05326	475		Stávka	OL 248 R	30. 12. 1997	12. 12. 2000

Pažitka

Allium schoenoprasum L.

ALE05230	140		Moravia	Moravia	19. 12. 1997	21. 02. 2001
----------	-----	--	---------	---------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Pór

Allium porrum L.

ALP04473	301,313,320	186,231,268	Blauwgroene Herfst	Alvito	01. 11. 1996	16. 03. 2001
ALP05753	278	183	Blauwgroene Winter	Forrest (Bejo 1762)	17. 12. 1998	14. 03. 2001
ALP05342	278	183	Bulgaarse Reuzen	Lincoln (Bejo 1414)	30. 12. 1997	14. 03. 2001
ALP05789	140		Titus	Gaba	21. 12. 1998	16. 03. 2001
ALP04583	278	183	Zwitserse Reuzen	Swiss Giant/ Marina	30. 12. 1996	14. 03. 2001

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

– indeterminantní

LYC05288	313	186	Aromata	Aromata	23. 12. 1997	05. 02. 2001
LYC05906	299	193	Ildiko	Ildiko	11. 01. 1999	05. 02. 2001
LYC05504	515	916	Lusita	862480	12. 03. 1998	21. 02. 2001
LYC05287	313	186	Petula	Petula	23. 12. 1997	05. 02. 2001

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

RPS04588	301	268	Balkar	Balkar	30. 12. 1996	06. 09. 2000
RPS05894	299	193	Masterred	Masterred	11. 01. 1999	06. 09. 2000
RPS05714	140		Poloneza	Polka	10. 12. 1998	16. 03. 2001
RPS06358	996	183	Rudi	JW 88	17. 12. 1999	06. 09. 2000
RPS05893	299	193	Summerred	Summerred	11. 01. 1999	06. 09. 2000

Řepa salátová

Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

BTO05678	634	186	Monalisa	GZG 208	16. 11. 1998	03. 04. 2001
----------	-----	-----	----------	---------	--------------	--------------

Salát hlávkový

Lactuca sativa L. var. capitata L.

LCS05566	239		Brilant	SM 213	29. 07. 1998	02. 01. 2001
LCS05567	239		Děvín	SM 238	29. 07. 1998	21. 02. 2001
LCS05718	320	231	Dickinson	NIZ 44-065	10. 12. 1998	02. 01. 2001
LCS05896	299	193	Fulica		11. 01. 1999	02. 01. 2001
LCS05662	239		Maximo	SM 112	29. 10. 1998	21. 02. 2001
LCS05661	239		Miniko	SM 109	29. 10. 1998	21. 02. 2001
LCS05895	299	193	Singers		11. 01. 1999	02. 01. 2001
LCS06486	301	268	Whitna	S 3190	29. 12. 1999	02. 01. 2001

Salát listový

Lactuca sativa L. var. crispa L.

LCS05715	140		Rosela		10. 12. 1998	02. 01. 2001
----------	-----	--	--------	--	--------------	--------------

Špenát

Spinacia oleracea L.

SPO05898	299	193	Laska	RS 910051	11. 01. 1999	27. 09. 2000
SPO05897	299	193	Limbo	RS 910055	11. 01. 1999	27. 09. 2000
SPO05754	278	183	Space	Bejo 1299	17. 12. 1998	27. 09. 2000

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

BRC05269	708	231	Ama - Dan	Early Amager 3163	23. 12. 1997	25. 05. 2001
BRC05386	299	193	Amukos	Amukos	15. 01. 1998	25. 05. 2001
BRC05679	634	186	Ancora	GZG 216	16. 11. 1998	25. 05. 2001
BRC05272	320	231	Burton	NIZ 95-438	23. 12. 1997	17. 07. 2000
BRC05680	634	186	Carolina	GZG 212	16. 11. 1998	25. 05. 2001
BRC05855	140		Kalibro	HT x S	21. 12. 1998	25. 05. 2001
BRC05681	634	186	Marcello	GZG 210	16. 11. 1998	25. 05. 2001
BRC04060	301	268	Santorino	SG 3118	08. 01. 1996	03. 04. 2001
BRC05755	278	183	Score	Bejo 1674	17. 12. 1998	25. 05. 2001
BRC05337	278	183	Tigre	Bejo 1754	30. 12. 1997	25. 05. 2001

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

BRC04874	299	193	Anoxa	RS 904008	20. 01. 1997	25. 05. 2001
BRC05304	634	186	Redma	GZG 220	23. 12. 1997	25. 05. 2001
BRC05682	634	186	Róccoma	GZG 202	16. 11. 1998	25. 05. 2001
BRC05266	708	231	Rosu Daneza	Roodkop 3419	23. 12. 1997	25. 05. 2001
BRC05900	299	193	Zelox	Zelox	11. 01. 1999	25. 05. 2001

Léčivé a kořeninové rostliny

Měsíček lékařský

Calendula officinalis L.

MED04552	256		Plamen plus	Plamen plus	06. 12. 1996	17. 07. 2000
----------	-----	--	-------------	-------------	--------------	--------------

Ovocné druhy

Angrešt

Ribes uva-crispa L.

RIU03767	231		Dekor	LS 2/12	10. 04. 1995	16. 03. 2001
----------	-----	--	-------	---------	--------------	--------------

Broskvoň

Prunus persica (L.) Batsch

PRP02357	588		Michaela	KM 2/1	28. 07. 1992	21. 02. 2001
----------	-----	--	----------	--------	--------------	--------------

Hrušeň

Pyrus communis L.

PYR01455	231		Alice	HL-17/16-6	18. 01. 1990	17. 05. 2001
PYR01283	231		David	HL-17/11-63	20. 12. 1988	17. 05. 2001
PYR05421	231		Decora	TE - 3099	23. 12. 1997	17. 08. 2000
PYR01338	231		Jizera	TE-H-87	20. 12. 1988	17. 08. 2000
PYR01285	231		Manon	HL-17/4-81	20. 12. 1988	17. 05. 2001
PYR01339	231		Morava	TE-H-88	20. 12. 1988	17. 08. 2000
PYR02445	231		Vonka	TE-H-26	18. 06. 1998	21. 02. 2001

Jabloň

Malus Mill.

MAL03781	578		Biogolden	ÚEB 2468/1	09. 09. 1996	21. 02. 2001
MAL03447	157		Gold Bohemia	TH-2/91	29. 12. 1994	21. 02. 2001
MAL02326	578		Nela	ÚEB 1744/2	29. 05. 2000	21. 02. 2001
MAL05111	738		Sparjon	Spärjon	25. 09. 1997	21. 02. 2001

Jahodník

Fragaria L.

FRA06775	1033	231	Evita	89A24	22. 03. 2000	16. 03. 2001
----------	------	-----	-------	-------	--------------	--------------

Kdouloň

Cydonia oblonga Mill.

– podnož

CDO04063	231		MA-SE	MA	08. 01. 1996	17. 08. 2000
----------	-----	--	-------	----	--------------	--------------

Okrasné druhy

Astra čínská

Callistephus chinensis (L.) Nees

ORN07131	140		Ivana	Ivana	14. 01. 1999	03. 04. 2001
ORN07132	140		Pavla	Pavla	14. 01. 1999	03. 04. 2001

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Jiřinka proměnlivá

Dahlia pinnata Cav. (syn.: *Dahlia variabilis* (Willd.) Desf.)

ORN07126	242		Berta	VUOZ 375/94	09. 12. 1999	17. 05. 2001
ORN07135	242		Hana	VUOZ 271/94	09. 12. 1999	03. 04. 2001
ORN07134	242		Harmonia	VUOZ 267/94	09. 12. 1999	03. 04. 2001
ORN07041	1039		Ludmila	Forrestal - Sport 16/92	25. 04. 2000	23. 03. 2001
ORN07136	242		Půvab	VUOZ 438/94	09. 12. 1999	03. 04. 2001
ORN07133	242		Urania	VUOZ 115/94	09. 12. 1999	17. 05. 2001

Metlice trsnatá

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

ORN07213	722		Palava	Liliput	30. 12. 1997	17. 07. 2000
----------	-----	--	--------	---------	--------------	--------------

Paprika (okrasná)

Capsicum baccatum L.

ORN07154	256		Zvoneček	SF/P - 111	16. 12. 1997	3. 4. 2001
----------	-----	--	----------	------------	--------------	------------

2. Popisy odrůd registrovaných podle § 11 zákona v období od 2. července 2000 do 31. května 2001

Zemědělské plodiny

Obilniny

Ječmen

Hordeum vulgare L.

– jarní

Annabell

Sladovnická polopozdní odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké až malé, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním a rzí ječnou, středně až méně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, méně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně vysoký až vysoký, v řepařské a obilnářské vysoký, v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a pšeničnické velmi vysoký.

Sladovnická jakost výběrová (bodové hodnocení).

Sabel

Sladovnická poloraná odrůda.

Rostliny nízké, odrůda středně odolná až odolná proti poléhání. Zrno středně velké až velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká až vysoká.

Odolná proti napadení padlím travním (obsahuje gen odolnosti Mlo), středně odolná proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí, méně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí.

Výnos v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné středně vysoký až vysoký, v řepařské a obilnářské středně vysoký, v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a pšeničnické nízký.

Sladovnická jakost výběrová (bodové hodnocení).

– ozimý

Alissa

Nesladovnická víceřadá polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování a proti poléhání. Zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou a hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos vysoký.

Angela

Nesladovnická víceřadá poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování a proti poléhání. Zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním a hnědou skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos vysoký.

Camera

Nesladovnická dvouřadá polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti vyzimování, středně odolná až odolná proti poléhání. Zrno velké, výtěžnost předního zrna vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou a hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos vysoký.

Carola

Nesladovnická víceřadá polopozdní až pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování a proti poléhání. Zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Odolná proti napadení padlím travním, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou a středně odolná proti napadení hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos vysoký.

Nelly

Nesladovnická víceřadá polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování a proti poléhání. Zrno středně velké až velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou a hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos velmi vysoký.

Vilna

Nesladovnická dvouřadá polopozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti vyzimování a proti poléhání. Zrno velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká.

Středně odolná proti napadení padlím travním, rzí ječnou a hnědou a rhynchosporiovou skvrnitostí.

Výnos vysoký.

Kukuřice

Zea mays L.

Abundance

Tříliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 210 S, 230 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny nízké až středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty a suché hmoty palic vysoké, při pěstování na zrno výnos zrna středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské, možné je i využití na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Anjou 248

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Anjou 268

Tříliniový (Tc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Benicia

Dvouliniový (Sc), středně raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 280 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

Birko

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 200 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos suché hmoty palic vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské.

Calimera

Dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S, 230 Z).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký, při pěstování na zrno výnos zrna středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské, možné je i využití na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Cemet 260

Třiliniový (Tc), raný až středně raný hybrid (číslo ranosti cca 260 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn nízký až středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty středně vysoký, výnos celkové zelené hmoty vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělské výrobní oblasti obilnářské a řepařské.

Cocagne

Dvouliniový (Sc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 320 Z).

Rostliny středně vysoké, palice nasazeny nízkou až středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na zrna v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

Esprit

Třiliniový hybrid (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské.

Fatima

Třiliniový (Tc), středně raný hybrid (číslo ranosti cca 280 S, 300 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny nízkou až středně vysoko, počet řad zrn vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Při pěstování na zrna výnos zrna vysoký, při pěstování na siláž výnosy celkové suché hmoty a suché hmoty palic středně vysoké.

Odrůda určena pro pěstování zrna v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné, možné je i využití na siláž ve stejných zemědělských výrobních oblastech.

Fjord

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty a suché hmoty palic středně vysoké.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Fuego

Dvouliniový (Sc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Graf

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 200 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny nízkou až středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské.

Justina

Dvouliniový (Sc), raný až velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 220 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny nízkou až středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty nízký, výnos suché hmoty palic vysoký.

Odrůda určena pro systémy dělených sklizní a silážování vlhkého zrna v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské a řepařské.

Kampala

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 250 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký až vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Lambada

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S, 260 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna tvrdý.

Výnosy celkové suché hmoty a suché hmoty palic vysoké, při pěstování na zrna výnos zrna vysoký.

Odrůda určena ke kombinovanému využití, a to pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské, na zrna v zemědělské výrobní oblasti řepařské.

LG 2195

Třiliniový (Tc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 210 S).

Rostliny vysoké, palice nasazeny středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské.

LG 2213

Dvouliniový (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazené středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské.

LG 2229

Tříliniový (Tc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 240 S).

Rostliny vysoké, palice nasazené středně vysoko až vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos celkové suché hmoty vysoký, výnos suché hmoty palic středně vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské, obilnářské a řepařské.

Meduse

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 290 Z).

Rostliny středně vysoké, palice nasazené nížko až středně vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp až koňský zub.

Výnos zrna vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

Pedro

Tříliniový (Tc), velmi raný až raný hybrid (číslo ranosti cca 230 S, 230 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazené středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna tvrdý až mezityp.

Výnosy celkové suché hmoty a suché hmoty palic vysoké, při pěstování na zrno výnos zrna vysoký.

Odrůda určena ke kombinovanému využití, a to pro pěstování na siláž v zemědělských výrobních oblastech bramborářské a obilnářské, pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Trento

Dvouliniový hybrid (Sc), velmi raný hybrid (číslo ranosti cca 230 Z).

Rostliny středně vysoké až vysoké, palice nasazené středně vysoko, počet řad zrn středně vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na zrno v zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Winston

Dvouliniový (Sc), raný hybrid (číslo ranosti cca 290 Z).

Rostliny středně vysoké, palice nasazené středně vysoko, počet řad zrn vysoký až velmi vysoký, typ zrna mezityp.

Výnos zrna vysoký.

Odrůda určena pro pěstování na zrno v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

Oves

Avena sativa L.

Azur

Potravinářská, středně raná, žlutozrná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně až méně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím travním, odolná proti napadení rzí travní.

Výnos „ovesné rýže“ (vyloupané obilky) v zemědělské výrobní oblasti obilnářské středně vysoký až vysoký, v zemědělské výrobní oblasti bramborářské středně vysoký až vysoký.

Objemová hmotnost a hmotnost tisíce zrn středně vysoké. Pluchatost nízká. Výtěžnost „ovesné rýže“ na průmyslové loupáče, podíl předního zrna a obsah bílkovin středně vysoké.

Daggy

Potravinářská, středně pozdní, bělozrná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí a padlím travním, odolná proti napadení rzí ovesnou a rzí travní.

Výnos „ovesné rýže“ (vyloupané obilky) v zemědělské výrobní oblasti obilnářské středně vysoký, v zemědělské výrobní oblasti bramborářské středně vysoký až vysoký.

Objemová hmotnost a hmotnost tisíce zrn středně vysoké. Výtěžnost „ovesné rýže“ na průmyslové loupáče, podíl předního zrna a obsah bílkovin středně vysoké.

Leo

Potravinářská, středně raná, bělozrná odrůda.

Rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí, rzí ovesnou a padlím travním, odolná proti napadení rzí travní.

Výnos „ovesné rýže“ (vyloupané obilky) v zemědělské výrobní oblasti obilnářské velmi vysoký, v zemědělské výrobní oblasti bramborářské vysoký.

Objemová hmotnost a hmotnost tisíce zrn středně vysoká. Výtěžnost „ovesné rýže“ na průmyslové loupáče, podíl předního zrna a obsah bílkovin středně vysoké.

Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum (L.) Moench.

Kara-Dag

Středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, olistění středně husté. Barva stonku světle zelená. Tvar listu srdčité trojúhelníkovitý. Povrch listu vlnitý, barva listu zelená. Květenství diskovitá, hustá. Barva květu bílorůžová. Semeno hnědé.

Pšenice obecná

Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.

– jarní

Vinjet

Pekařská poloraná odrůda.

Rostliny vysoké, odrůda středně odolná až odolná proti poléhání. Zrno středně velké až velké.

Odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení padlím travním v klasu, středně odolná proti napadení braničnatkami na listu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšeničnou.

Výnos velmi vysoký.

Pekařská jakost kvalitní (kategorie A). Objem pečiva vysoký, obsah N-látek vysoký, hodnota SDS testu vysoká, vaznost mouky středně vysoká, hodnota čísla poklesu velmi vysoká, objemová hmotnost vysoká.

– ozimá

Windsor

Polopozdní až pozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití.

Rostliny nízké, odrůda dle provokačních testů méně odolná proti vyzimování, odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení padlím travním a braničnatkami na listu a v klasu a rzí pšeničnou. Dle provokačních testů odolná proti napadení rzí plevovou.

Výnos v zemědělských výrobních oblastech řepařské a bramborářské velmi vysoký, v zemědělské výrobní oblasti obilnářské vysoký.

Pšenice špalda

Triticum spelta L.

– ozimá

Rubiota

Pozdní odrůda.

Rostliny velmi vysoké, antokyanové zbarvení oušek praporcevitého listu velmi slabé. Klas jehlancovitý, řídký, dlouhý až velmi dlouhý s krátkými osinkami. Zrno červené.

Tritikale

Triticosecale Wittm.

– ozimé

Sekundo

Krmná, středně pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké, středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Odrůda středně odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním, listovými skvrnitostmi a rzí žitnou.

Výnos ve všech výrobních zemědělských oblastech vysoký.

Odolná až středně odolná proti porůstání. Krmná jakost dobrá.

Žito

Secale cereale L.

– ozimé

Fernando

Zrnová, hybridní, středně pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké, odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení plísní sněžnou, padlím travním, listovými skvrnitostmi, rzí žitnou a rzí travní. Splňuje ukazatele pro obsah námele v zrně.

Výnos zrna ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký.

Odolná proti porůstání. Potravinářská jakost. Hodnota čísla poklesu velmi vysoká. Obsah N-látek a objemová hmotnost středně vysoké. Podíl předního zrna vysoký.

Picasso

Zrnová, hybridní, středně pozdní odrůda.

Rostliny středně vysoké až nízké; odrůda středně odolná proti poléhání. Zrno středně velké.

Středně odolná proti napadení plísňí sněžnou, padlím travním, listovými škvrnitostmi, rzí žitnou a rzí travní. Splňuje ukazatele pro obsah námele v zrna.

Výnos ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký.

Odolná proti porůstání. Potravinářská jakost. Hodnota čísla poklesu velmi vysoká. Obsah-N-látek a objemová hmotnost středně vysoké. Podíl předního zrna vysoký.

Krmné plodiny

Trávy

Bojínek luční

Phleum pratense L.

Barfleo

Hexaploidní, raná až středně raná odrůda pro luční využití.

Rostliny v době metání polovzpřímené až středně rozkladité. Odrůda odolná proti poléhání před první sečí.

Odrůda méně odolná proti napadení listovými škvrnitostmi.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce nízký, ve druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitkovém roce vysoký. Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce nízký, ve druhém a třetím užitkovém roce vysoký.

Jarní růst rychlý, hustota porostu na jaře vysoká. Po sečích středně hustě obrůstá.

Jílek mnohokvětý italský

Lolium multiflorum Lam. subsp. *italicum* (A. Br.) Volkart

Barprisma

Diploidní, raná až středně raná odrůda pro využití v monokultuře i jetelotravních směskách.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Odrůda středně odolná proti poléhání před první sečí.

Středně odolná až odolná proti napadení plísňí sněžnou, méně odolná proti napadení listovými škvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce nízký, v druhém a třetím užitkovém roce středně vysoký. Výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém a třetím užitkovém roce vysoký.

Jarní růst rychlý, hustota porostu na jaře vysoká. Po sečích středně hustě až hustě obrůstá.

Fabio

Tetraploidní raná až středně raná odrůda pro využití v monokultuře i jetelotravních směskách.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Odrůda středně odolná proti poléhání před první sečí.

Středně až méně odolná proti napadení plísňí sněžnou, méně odolná proti napadení listovými škvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech středně vysoký, výnos suché hmoty v prvním a třetím užitkovém roce vysoký, v druhém roce středně vysoký.

Jarní růst rychlý, hustota porostu na jaře vysoká. Po sečích středně hustě až hustě obrůstá.

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

Barcredo

Diploidní, pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké. Barva listu středně zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda středně odolná proti napadení plísňí sněžnou a listovými škvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Ferrari

Diploidní, velmi raná až raná trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listu tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda středně odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně až méně odolná proti napadení listovými škvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Charger

Diploidní velmi raná až raná trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listů tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení rzí, středně odolná proti napadení plísňí sněžnou a středně odolná proti až náchylná k napadení listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Mathilde

Tetraploidní, středně raná odrůda pro pastevní využití.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Odrůda méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech vysoký.

Jarní růst rychlý. Po sečích středně hustě obrůstá.

Merci

Diploidní, pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání nízké až středně vysoké. Barva listů středně až tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda středně odolná proti napadení plísňí sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Option

Diploidní, středně raná odrůda pro pastevní využití.

Rostliny v době metání středně vysoké.

Odrůda méně odolná proti napadení plísňí sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené hmoty v prvním užitkovém roce středně vysoký, v druhém a třetím užitkovém roce vysoký. Výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce středně vysoký, ve třetím užitkovém roce vysoký.

Jarní růst středně rychlý. Po sečích středně hustě až hustě obrůstá.

Quickstart

Diploidní raná trávnicková odrůda.

Rostliny v době metání středně vysoké. Barva listů tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení rzí, středně odolná proti až náchylná k napadení plísňí sněžnou a listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro zatěžované sportovní trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Respect

Diploidní, raná až středně raná odrůda pro pastevní využití.

Rostliny v době metání středně vysoké až vysoké.

Odrůda méně odolná proti napadení plísňí sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené hmoty v prvním a třetím užitkovém roce středně vysoký, v druhém užitkovém roce vysoký.

Jarní růst středně rychlý až rychlý. Po sečích středně hustě obrůstá.

Kostrava červená

Festuca rubra L.

Aniset

Oktoploidní, pozdní výběžkatá trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listů středně až tmavě zelená. Trávník jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou a rzí a středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Barcorsa

Oktoploidní, středně raná výběžkatá trávnicková odrůda.

Rostliny polovzpřímené. Barva listů tmavě až velmi tmavě zelená. Trávník jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou a rzí a středně odolná až odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout střední až vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Echo

Oktoploidní, pozdní výběžkatá odrůda pro pastevní využití.

Rostliny polorozkladité.

Odrůda středně odolná proti napadení plísňí sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech vysoký.

Jarní růst rychlý. Po sečích středně hustě obrůstá.

Gondolin

Oktoploidní, pozdní výběžkatá odrůda pro pastevní využití.

Rostliny středně rozkladité až polorozkladité.

Odrůda středně odolná proti napadení plísňí sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech vysoký.

Jarní růst středně rychlý až rychlý. Po sečích středně hustě obrůstá.

Smirna

Hexaploidní, středně raná až pozdní krátce výběžkatá trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listu středně až tmavě zelená. Trávník jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou a rzí a odolná až středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Tatjana

Hexaploidní, pozdní, středně raná trsnatá trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listu středně zelená. Trávník jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou a rzí a středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro jemné okrasné trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Lipnice luční

Poa pratensis L.

Baronie

Pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité až polorozkladité. Barva listu středně až tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně odolná až odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Compact

Středně raná trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité až polorozkladité. Barva listu středně zelená. Trávník středně jemný.

Odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, odolná až středně odolná proti napadení rzí.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Intenzivním kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Cynthia

Středně raná až pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité až polorozkladité. Barva listu středně až tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Enprima

Středně raná až pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listu středně až tmavě zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Lily

Pozdní trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listu středně zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně až méně odolná proti napadení rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Mardona

Středně raná trávnicková odrůda.

Rostliny středně rozkladité. Barva listu středně zelená. Trávník středně jemný.

Odrůda odolná proti napadení plísňí sněžnou, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.

Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.

Vhodný komponent do směsí pro sportovní zatěžované trávníky i pro ostatní trávnickové plochy.

Psárka luční
Alopecurus pratensis L.

Zuberská

Středně raná odrůda pro luční využití.
Rostliny v době metání středně vysoké. Délka osinek střední.
Odrůda středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, méně odolná proti napadení rzí.
Výnos zelené hmoty ve všech užitkových letech nízký, výnos suché hmoty v prvním užitkovém roce nízký, v druhém a třetím užitkovém roce středně vysoký.
Jarní růst rychlý, hustota porostu na jaře vysoká. Po první seči hustě obrůstá.

Psineček výběžkatý
Agrostis stolonifera L.

Prominent

Tetraploidní, středně raná trávníková odrůda.
Rostliny rozkladité. Barva listu světle až středně zelená. Trávník jemný.
Odrůda odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí a odolná až středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku.
Vhodný komponent do směsí pro jemné trávníky golfových hřišť a ostatní speciální trávníkové plochy.

Luskoviny

Bob
Vicia faba L.

Albi

Poloraná bělokvětá odrůda.
Rostliny nízké. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až nízká.
Odrůda odolná proti lámání lodyh, odolná proti poléhání před sklizní, vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.
Středně odolná proti napadení strupovitostí a rzí bobovou, středně odolná až odolná proti napadení kořenovými chorobami, méně odolná proti napadení hnědou skvrnitostí.
Výnos semene středně vysoký, ve srovnání s bíle kvetoucí odrůdou Amazon vysoký.
Obsah N-látek středně vysoký až vysoký, semeno neobsahuje tanin.

Merlin

Poloraná bělokvětá odrůda.
Rostliny nízké. Hmotnost tisíce semen středně vysoká.
Odrůda odolná proti lámání lodyh, odolná proti poléhání před sklizní, vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.
Středně odolná až odolná proti napadení strupovitostí a středně odolná proti napadení kořenovými chorobami, bobovou a hnědou skvrnitostí.
Výnos semene středně vysoký, ve srovnání s bíle kvetoucí odrůdou Amazon vysoký.
Obsah N-látek středně vysoký až vysoký, semeno neobsahuje tanin.

Hrách
Pisum sativum L. (partim)

Jackpot

Polopozdní odrůda typu semi-leafless.
Rostliny středně dlouhé, barva květu bílá, barva semene žlutá, semeno kulovité, Hmotnost tisíce semen středně vysoká.
Odrůda odolná proti poléhání před sklizní, vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.
Středně odolná proti napadení plísní hrachovou, středně až méně odolná proti napadení plísní šedou a kořenovými chorobami, odolná proti napadení chorobami Ascochyta-komplexu.
Výnos semene vysoký.
Obsah N-látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká. Technologická jakost středně vysoká.

Kamelot

Polopozdní odrůda typu semi-leafless.
Rostliny středně dlouhé, barva květu bílá, barva semene žlutá, semeno kulovité. Hmotnost tisíce semen středně vysoká.
Odrůda středně odolná proti poléhání před sklizní, vhodná pro přímou kombajnovou sklizeň.
Středně odolná proti napadení plísní hrachovou, odolná proti napadení plísní šedou a chorobami Ascochyta-komplexu, středně odolná až odolná proti napadení kořenovými chorobami.
Výnos semene vysoký.
Obsah N-látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká. Technologická jakost středně vysoká.

peluška

– jarní

Racer

Poloraná odrůda typu semi-leafless.

Rostliny středně vysoké až nízké, méně odolné proti poléhání. Snížená vhodnost ke kombajnové sklizni. Semeno hnědozelené. Hmotnost tisíce semen nízká.

Výnos ve srovnání s odrůdami hrachu setého nízký.

Obsah N-látek středně vysoký až vysoký, aktivita trypsin-inhibitoru nízká.

Odrůda určena jako komponent k výrobě krmných směsí nejen pro výživu poštovních, ale i užitkových a okrasných plemen holubů.

Jeteloviny

Jetel luční

Trifolium pratense L.

Suez

Diploidní, raná až středně raná odrůda.

Rostliny středně vysoké, lodyha tenká až středně silná, listy středně dlouhé a středně široké až široké. Středně odolná proti poléhání.

Odrůda středně odolná proti napadení rakovinou jetele, spálou jetele lučního a listovými skvrnitostmi; středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů, méně odolná proti napadení padlím rdesnovým; středně odolná proti virózám.

Výnos zelené hmoty v obou užitkových letech vysoký, výnos suché hmoty v obou užitkových letech střední.

Počáteční růst a obrůstání po sečích středně rychlé.

Jetel plazivý

Trifolium repens L.

Král

Raná až středně raná odrůda botanického typu holandicum.

Rostliny středně vysoké, řapíky tenké až středně silné, listy krátké až středně dlouhé a středně široké.

Odrůda středně odolná proti napadení rakovinou jetele, listovými skvrnitostmi, patogeny způsobujícími odumírání kořenů a virózám, méně odolná proti napadení plísňí jetelovou.

Výnos zelené a suché hmoty ve všech užitkových letech vysoký.

Rostliny s kyanogenními glykosidy málo četné.

Počáteční růst a obrůstání po sečích středně rychlé.

Riesling

Raná až středně raná odrůda botanického typu přechodného mezi holandicum a giganteum.

Rostliny středně vysoké, řapíky středně silné až silné, listy středně dlouhé a středně široké.

Odrůda odolná proti napadení rakovinou jetele, středně odolná proti napadení patogeny způsobujícími odumírání kořenů a virózám, méně odolná proti napadení plísňí jetelovou a listovými skvrnitostmi.

Výnos zelené a suché hmoty ve třetím užitkovém roce vysoký, v druhém užitkovém roce středně vysoký, v prvním užitkovém roce výnos suché hmoty středně vysoký, výnos zelené hmoty nízký.

Rostliny s kyanogenními glykosidy středně četné.

Počáteční růst a obrůstání po sečích rychlé.

Jiné krmné plodiny

Kapusta krmná

Brassica oleracea L. *convar. acephala* (DC.) Alef. *var. medullosa* Thell. + *var. viridis* L.

Pavla

Diploidní krmná odrůda přechodného typu.

Rostliny středně vysoké, s krátkým až středně dlouhým košťálem, středně olistěné. Barva listu světle zelená. Listy středně velké, středně ojířené. Listová čepel mírně převislá, krátká až středně dlouhá. Okraje listů málo až středně vlnité. Košťál středně tlustý, barva košťálu bělavě zelená.

Olejníny a přádné rostliny

Hořčice sareptská (syn.: Brukev sítinovitá)

Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.

Opaleska

Raná až velmi raná odrůda s tmavohnědou barvou semene.

Rostliny středně vysoké. Listy středně dlouhé, úzké až středně široké, s velkým počtem laloků. Korunní plátky žluté. Šešule krátké až středně dlouhé, úzké až středně široké s krátkým zobanem.

Odrůda určena pro pěstování na semeno pro potravinářské účely.

Len

Linum usitatissimum L.

Ilona (dosud nepublikováno)

Modrokvětá odrůda předního lnu.

Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání, středně raný až pozdní začátek kvetení, středně dlouhá až dlouhá vegetační doba.

Středně odolná proti napadení komplexem chorob kořenů a pat stonků.

Výnos neroseného stonku středně vysoký, výnos semene středně vysoký.

Obsah celkového i dlouhého vlákna ve stonku velmi vysoký, vlákno dobré kvality.

Vhodná do intenzivnější oblasti pěstování lnu.

Venica

Modrokvětá odrůda předního lnu.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání, středně raný až pozdní začátek kvetení, středně dlouhá vegetační doba.

Středně odolná proti napadení komplexem chorob kořenů a pat stonků.

Výnos neroseného stonku středně vysoký, výnos semene středně vysoký.

Obsah celkového i dlouhého vlákna ve stonku velmi vysoký, vlákno dobré kvality.

Vhodná do intenzivnější oblasti pěstování lnu.

Řepka

Brassica napus L. (partim)

– jarní

Licolly

Raná až středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování vyhovující.

Středně odolná proti napadení chorobami.

Výnos semene vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká, obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

– ozimá

Cando

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování vyhovující.

Středně odolná až odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení ostatními chorobami.

Výnos semene vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký. Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Jesper

Polopozdní odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná až odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování vyhovující.

Středně odolná až odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení ostatními chorobami.

Výnos semene vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Marabu

Polopozdní až pozdní pylově fertilní hybrid s minimálním obsahem kyseliny erukové a velmi nízkým obsahem glukosinolátů.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování vysoká.

Středně odolná až odolná proti napadení fomovým černáním stonku, středně odolná proti napadení ostatními chorobami.

Výnos semene vysoký.

Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Pilot

Středně raná odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů.
Rostliny středně vysoké. Odrůda středně odolná proti poléhání, odolnost proti vyzimování vyhovující.
Středně odolná proti napadení chorobami.
Výnos semene v zemědělských výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a obilnářské velmi vysoký, v zemědělské výrobní oblasti bramborářské vysoký.
Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni vysoký. Zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

Slunečnice

Helianthus annuus L.

Aladin

Středně raný hybrid.
Rostliny vysoké, úbor velký, v plné zralosti převíslý. Jazykovité květy žluté. Nažky malé, široce vejčité, černé s šedivým okrajovým proužkováním.
Výnos nažek vysoký, obsah oleje středně vysoký.
Odrůda vhodná pro pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné a v teplejších podmínkách zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Alzan

Raný hybrid.
Rostliny vysoké až velmi vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Jazykovité květy žluté. Nažky středně velké až velké, široce vejčité, černé s šedivým okrajovým i bočním proužkováním.
Výnos nažek vysoký, obsah oleje středně vysoký.
Odrůda vhodná pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

DK 3806

Raný hybrid.
Rostliny středně vysoké až vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevíslý. Jazykovité květy žluté. Nažky malé až středně velké, široce vejčité, černé s fialovošedým okrajovým i bočním proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký, obsah oleje vysoký.
Odrůda vhodná pro pěstování v zemědělských výrobních oblastech řepařské a kukuřičné.

GEN 2000

Středně raný hybrid.
Rostliny středně velké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Jazykovité květy žluté. Nažky malé až středně velké, podlouhle vejčité, černé s šedým okrajovým i bočním proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký, obsah oleje středně vysoký.
Odrůda vhodná pro pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné.

LG 5385

Velmi raný hybrid.
Rostliny středně vysoké až vysoké, úbor velký, v plné zralosti polopřevíslý. Jazykovité květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky středně velké, široce vejčité, černé s šedivým okrajovým proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký, obsah oleje vysoký.
Odrůda vhodná především do chladnějších oblastí pěstování slunečnice - zemědělských výrobních oblastí řepařské a obilnářské.

Lucil

Velmi raný až raný hybrid.
Rostliny vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Jazykovité květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky středně velké, podlouhle vejčité, černé bez proužkování.
Výnos nažek vysoký, obsah oleje středně vysoký.
Odrůda vhodná především do chladnějších oblastí pěstování slunečnice - zemědělských výrobních oblastí řepařské a obilnářské.

Olstaril

Dvouliniový středně raný hybrid.
Rostliny vysoké, úbor středně velký až velký, v plné zralosti polopřevíslý. Jazykovité květy žluté. Stonek pod úborem nelámavý. Nažky středně velké, podlouhle vejčité, černé s hnědým okrajovým i bočním proužkováním.
Výnos nažek středně vysoký, obsah oleje středně vysoký, podíl kyseliny olejové vysoký.
Odrůda vhodná pro pěstování v zemědělské výrobní oblasti kukuřičné a v teplejších podmínkách zemědělské výrobní oblasti řepařské.

Pilar

Velmi raný hybrid.
Rostliny vysoké, úbor velký, v plné zralosti polopřevíslý až převíslý. Jazykovité květy žluté. Nažky malé až středně velké, podlouhle vejčité, černé s šedivým okrajovým i bočním proužkováním.
Výnos nažek vysoký, obsah oleje středně vysoký.
Odrůda vhodná především do chladnějších oblastí pěstování slunečnice - zemědělských výrobních oblastí řepařské a obilnářské.

Brambor a jiné okopaniny

Brambor

Solanum tuberosum L.

Apolena

Polopozdní odrůda pro výrobu lupínků a pro výrobu škrobu.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až vysoký. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka mělká, slupka červenostrakatá, dužnina světle žlutá.

Odrůda náchylná k napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rezistentní proti napadení rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná proti virovým chorobám a odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí a středně odolná proti napadení plísni bramborovou.

Výnos hlíz středně vysoký až nízký, škrobnatost vysoká.

Velmi dobrá kvalita smažených lupínků.

Camilla

Raná odrůda pro výrobu hranolků, lze ji využít i pro přímý konzum, varný typ BC.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy oválné, středně velké, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a náchylná k napadení rakovinou brambor. Odolná proti virovým chorobám, středně odolná proti napadení plísni bramborovou, odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí.

Výnos hlíz středně vysoký až nízký, podíl tržních hlíz vysoký.

Škrobnatost středně vysoká až vysoká, obsah redukujících cukrů nízký.

Kvalita hranolků velmi dobrá. Vařené hlízy moučnaté, středně hrubé až hrubé struktury.

Cicero

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ BC.

Počáteční růst natě středně rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. Hlízy oválné, středně velké, vyrovnané velikostí, vzhledné, očka velmi mělká až mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá až světle žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a náchylná k napadení rakovinou brambor. Středně odolná proti virovým chorobám a proti napadení obecnou strupovitostí, odolná proti napadení plísni bramborovou.

Výnos hlíz vysoký, podíl tržních hlíz vysoký.

Vařené hlízy středně moučnaté, středně hrubé struktury, příjemně vlhké.

Delikat

Raná odrůda pro zpracování na hranolky, lupínky a suché výrobky.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. Hlízy oválné, středně odolné mechanickému poškození, středně velké, očka středně hluboká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná až středně odolná proti virovým chorobám, středně odolná proti napadení plísni bramborovou a obecnou strupovitostí.

Výnos hlíz středně vysoký, vysoký podíl tržních hlíz.

Škrobnatost středně vysoká až vysoká, obsah redukujících cukrů středně vysoký až nízký.

Innovator

Poloraná odrůda pro zpracování na speciální světlé hranolky.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem nízký. Hlízy dlouze oválné, středně velké až velké, očka mělká až středně hluboká, slupka žlutá, dužnina krémová.

Odrůda náchylná k napadení hádátkem bramborovým Ro1 a rezistentní proti napadení rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná proti napadení plísni bramborovou a obecnou strupovitostí, náchylná k virovým chorobám.

Výnos hlíz nízký, výtěžnost tržních hlíz vysoká.

Škrobnatost středně vysoká až vysoká, obsah redukujících cukrů nízký.

Inova

Velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. Hlízy dlouze oválné, odolné proti mechanickému poškození, vzhledné, očka mělká, slupka žlutá a jemná, dužnina žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí, středně odolná proti až náchylná k virovým chorobám, středně odolná proti napadení plísni bramborovou.

Výnos hlíz v prvních dvou termínech předčasných sklizní středně vysoký až vysoký, při konečné sklizni středně vysoký až nízký.

Vařené hlízy z předčasných sklizní jsou chutné, příjemně vlhké, slabě moučnaté, jemné struktury, po uvaření neimavnou.

Kornelie

Raná odrůda pro přímý konzum, varný typ BC.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. Hlízy oválné, odolné proti mechanickému poškození, středně velké, očka středně hluboká až mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná proti virovým chorobám, středně odolná až odolná proti napadení obecnou strupovitostí, středně odolná proti napadení plísni bramborovou.

Výnos hlíz středně vysoký až vysoký, výtěžnost tržních hlíz vysoká.

Vařené hlízy jsou středně moučnaté, středně hrubé struktury, příjemně vlhké a chutné.

Laura

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ B - BC.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký. Hlízy dlouze oválné, středně velké, velikostně vyrovnané, velmi vzhledné, očka velmi mělká, slupka červená, jemná, dužnina tmavě žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a slabě náchylná s polní rezistencí k napadení rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná proti virovým chorobám, odolná až středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí a plísňí bramborovou.

Výnos hlíz středně vysoký až nízký, výtěžnost tržních hlíz středně vysoká až vysoká.

Vařené hlízy středně moučnaté, středně hrubé struktury, chutné, příjemně vlhké, barevně stabilní.

Magda

Velmi raná odrůda pro přímý konzum, varný typ B.

Počáteční růst natě velmi rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký až nízký. Hlízy krátce oválné, středně velké, dosti odolné mechanickému poškození, očka mělká, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Odrůda náchylná k napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rezistentní proti napadení rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná proti virovým chorobám, středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí, náchylná k napadení plísňí bramborovou.

Výnosy hlíz v nejranějších termínech sklizní vysoké, při konečné sklizni středně vysoké až nízké.

Vařené hlízy z předčasných sklizní středně pevné, velmi chutné.

Milva

Poloraná odrůda pro přímý konzum, varný typ AB.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký. Hlízy krátce oválné, středně velké, očka mělká, slupka žlutá, dužnina tmavě žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a náchylná k napadení rakovinou brambor. Odolná proti napadení obecnou strupovitostí, odolná až středně odolná proti napadení plísňí bramborovou, středně odolná proti až náchylná k virovým chorobám.

Výnos hlíz vysoký, výtěžnost tržních hlíz středně vysoká až vysoká.

Vařené hlízy slabě moučnaté, pevné, jemné struktury, příjemně vlhké, barevně stabilní a chutné.

Westamyl

Polopozdní odrůda pro zpracování na škrob.

Počáteční růst natě rychlý, počet hlíz pod trsem středně vysoký. Hlízy krátce oválné, středně velké, slupka žlutá, dužnina žlutá.

Odrůda rezistentní proti napadení hádátkem bramborovým patotypu Ro1 a rakovinou brambor patotypu 1 (D1). Odolná až středně odolná proti virovým chorobám, odolná proti napadení plísňí bramborovou a středně odolná proti napadení obecnou strupovitostí.

Výnos hlíz středně vysoký až nízký. Výnos škrobu vysoký.

Škrobnatost velmi vysoká.

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. altissima Döll

Assist

Triploidní odrůda přechodného NC typu.

Postavení listů polovzpřímené, kořen kónickooválný s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene, cukernatost, výtěžnost rafinády a výnos polarizačního cukru středně vysoké až vysoké, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin je nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Bolonia

Triploidní odrůda přechodného NC typu tolerantní k rizománii.

Postavení listů polovzpřímené, kořen kónickooválný s mělkou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Při napadení rizománií výnos kořene vysoký až velmi vysoký, výtěžnost rafinády a cukernatost nízké až středně vysoké, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády vysoké.

Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Bronkos

Diploidní odrůda přechodného NC typu tolerantní k rizománii.

Postavení listů vzpřímené, kořen kónický s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Při napadení rizománií výnos kořene nízký, cukernatost a výtěžnost rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoké.

Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Compact

Diploidní odrůda přechodného NC typu.

Postavení listů polovzpřímené, kořen kuželovitý s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene středně vysoký až nízký, výtěžnost rafinády vysoká, cukernatost a výnos rafinády středně vysoké až vysoké, výnos polarizačního cukru středně vysoký.

Obsah popelovin a obsah škodlivého dusíku nízké až velmi nízké.

Dream

Triploidní odrůda cukernatého C typu.

Postavení listu polovzpřímené, kořen kuželovitý s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene středně vysoký až nízký, cukernatost, výtěžnost rafinády a výnos rafinády vysoké až velmi vysoké, výnos polarizačního cukru středně vysoký.

Obsah popelovin a škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Economy

Triploidní odrůda cukernatého C typu tolerantní k rizománii.

Postavení listu polovzpřímené, kořen kónický s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu, středně odolná až odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene nízký až středně vysoký, cukernatost a výnos rafinády vysoké, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký.

Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Při napadení rizománií výnos kořene středně vysoký, cukernatost, výtěžnost rafinády a výnos rafinády vysoké až velmi vysoké, výnos polarizačního cukru středně vysoký až vysoký.

Obsah popelovin velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký.

Jolanda

Triploidní odrůda přechodného NC typu

Postavení listu polovzpřímené, kořen kónicko-oválný s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene nízký až středně vysoký, cukernatost a výtěžnost rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoké až vysoké.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký.

Lord

Triploidní odrůda přechodného NC typu.

Postavení listu polovzpřímené, kořen kónický s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Výnos kořene, výnos polarizačního cukru a výtěžnost rafinády středně vysoké až vysoké, cukernatost středně vysoká, výnos rafinády vysoký.

Obsah popelovin středně vysoký, obsah škodlivého dusíku nízký až velmi nízký.

Mondial

Diploidní odrůda přechodného NC typu tolerantní k rizománii.

Postavení listu polorozkleslé, kořen kónický až oválný s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Při napadení rizománií výnos kořene nízký až středně vysoký, cukernatost vysoká, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoké.

Obsah popelovin a obsah škodlivého dusíku nízké až velmi nízké.

Norfolk

Triploidní odrůda normálního N typu.

Postavení listu rozkleslé až ohnuté, kořen dlouhý kuželovitý se středně hlubokou spirálovitou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná ke středně rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a proti napadení padlím, středně odolná proti napadení cercosporou.

Výnos kořene středně vysoký až nízký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výnosy polarizačního cukru a rafinády středně vysoké a výtěžnost rafinády vysoká.

Obsah popelovin nízký, obsah škodlivého dusíku středně vysoký až vysoký.

Profil

Triploidní odrůda cukernatého C typu.

Postavení listu polovzpřímené, kořen kónický s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu, středně až méně odolná proti napadení cercosporou a středně odolná proti napadení padlím.

Výnos kořene nízký, cukernatost a výtěžnost rafinády vysoké, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoké.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až středně vysoký

Takt

Triploidní odrůda cukernatého C typu tolerantní k rizománii.

Postavení listu polovzpřímené, kořen kónicko-oválný s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu a středně odolná proti napadení cercosporou a padlím.

Při napadení rizománií výnos kořene středně vysoký až nízký, cukernatost vysoká, výtěžnost rafinády vysoká až velmi vysoká, výnos polarizačního cukru středně vysoký, výnos rafinády středně vysoký až vysoký.

Obsah popelovin nízký až velmi nízký, obsah škodlivého dusíku nízký až střední.

Tower

Diploidní odrůda přechodného NC typu.

Postavení listu vzpřímené, kořen kónický s mělkou rovnou rýhou a hladkým povrchem. Vhodná i k velmi rané sklizni.

Odrůda odolná proti vyblhání do květu a středně odolná proti napadení cerkosporou a padlím.

Výnos kořene nízký až středně vysoký, cukernatost středně vysoká až vysoká, výtěžnost rafinády vysoká, výnos polarizačního cukru a výnos rafinády středně vysoké,

Obsah popelovin a škodlivého dusíku nízké až velmi nízké.

Réva

Vitis L.

– moštové

Veritas

Bílá mošťová středně raná odrůda révy vinné, plná zralost začíná v druhé polovině září.

Dospělý list středně velký, pětilaločný, srdcovitého tvaru. Hrozen menší, hustý. Bobule středně velká kulatá. Barva slupky zelenožlutá.

Odrůda středně odolná až náchylná k napadení plísní šedou.

Výnos hroznů vysoký.

Víno harmonické se svěží kyselinou, s jemným ovocným aroma.

Zeleniny

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *cymosa* Duch.

Dannor

Poloraný hybrid.

Rostliny nízké s jedním stonkem. Listy středně až tmavě šedozelené s modravým odstínem, středně až silně ojínné se středně zvlněným okrajem. Růžice středně velká až velká, středně pevná až pevná, tmavě zelená, příčně eliptického tvaru se středním až dlouhým větvením na bázi, střední hrbolovitostí a středně hrubou až hrubou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic vysoký.

Odrůda středně odolná proti vyběhání do květu.

Lucky

Polopozdní hybrid.

Rostliny středně vysoké s jedním stonkem. Listy středně až tmavě šedozelené, silně ojínné se středně zvlněným okrajem. Růžice středně velká, pevná, středně až tmavě šedozelená, příčně široce eliptického tvaru s krátkým větvením na bázi, jemnou až střední hrbolovitostí a zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic nízký až střední.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu.

Winnor

Raný hybrid.

Rostliny středně vysoké s jedním stonkem. Listy středně zelené, silně ojínné se středně zvlněným okrajem. Růžice středně velká až velká, středně pevná, středně šedozelená, příčně eliptického tvaru se středním větvením na bázi, jemnou hrbolovitostí a hrubou zrnitostí povrchu. Počet sekundárních růžic střední.

Odrůda málo odolná proti vyběhání do květu.

Celer bulvový

Apium graveolens L. var. *rapaceum* (Mill.) Gaud.

Neon

Raná až poloraná odrůda.

Rostliny středně vysoké s polovzpřímenou až vzpřímenou, středně až tmavě zelenou natí. Bulva velká, kulovitá se středně vysokou nasazenými a středně silnými kořeny. Povrch bulvy bílý, středně hrbolovitý. Hlava jen ojediněle nepatrně zelená. Dužnina bílá, kompaktní, bez změny barvy po vaření.

Odrůda středně odolná proti napadení septoriózou.

Cibule

Allium cepa L.

- jarní

Barito

Raný až poloraný hybrid určený pro jarní výsevy semene.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně až silně ojínné. Cibule středně velká, široce vejčitého tvaru, s tmavě hnědou barvou horních suchých, středně až silně přiléhajících suknic.

Obsah sušiny nízký až střední. Období rašení ve skladu rané až střední.

Candy

Raný až poloraný hybrid určený pro jarní výsevy semene.

Listy vzpřímené, světlé až středně zelené, slabě ojínné. Cibule velká, široce opakvejčitého tvaru, s tmavě hnědou barvou horních suchých, slabě až středně přiléhajících suknic.

Obsah sušiny nízký. Období rašení ve skladu rané.

Gialla di Santarcangelo

Poloraná až pozdní odrůda vhodná pro jarní výsevy semene.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, světlé zelené, slabě ojínné. Cibule velká, ploše elipsovitého tvaru se světlou hnědou barvou a s narůžovělým odstínem horních suchých, slabě přiléhajících suknic.

Obsah sušiny nízký až střední. Období rašení ve skladu velmi rané až rané.

Hyfield

Poloraný hybrid určený pro jarní výsevy semene.

Listy vzpřímené, středně až tmavě zelené, středně ojínné. Cibule středně velká, kulovitého tvaru, se středně žlutou barvou horních suchých, středně až silně přiléhajících suknic.

Obsah sušiny nízký až střední. Období rašení ve skladu polorané.

Legend

- Pozdní hybrid určený pro jarní výsevy semene.
- Listy vzpřímené až polovzpřímené, světle až středně zelené, slabě až středně ojínné. Cibule velká, kulovitěho tvaru, s tmavě hnědou barvou horních suchých, středně až silně přiléhajících sukní.
- Obsah sušiny nízký až střední. Období rašení ve skladu pozdní.

Olina

- Raná až poloraná odrůda určená pro jarní výsevy semene.
- Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně ojínné. Cibule středně velká, kulovitěho tvaru, se středně až tmavě hnědou barvou horních suchých, silně přiléhajících sukní.
- Obsah sušiny střední až vysoký. Období rašení ve skladu polorané.

Selhurst

- Poloraný hybrid určený pro jarní výsevy semene.
- Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, se středně žlutou barvou horních suchých, středně až silně přiléhajících sukní.
- Obsah sušiny střední. Období rašení ve skladu polorané.

- ozimá

Swift

- Poloraná odrůda určená pro letní výsevy semene a přezimování.
- Listy polovzpřímené, světle až středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho až mírně ploše kulovitěho tvaru, středně hnědou barvou horních suchých, slabě až středně přiléhajících sukní.
- Obsah sušiny nízký. Tendence k vyběhání do květu v produkčním roce slabá.

Wolf

- Raná až poloraná hybridní odrůda určená pro letní výsevy semene a přezimování.
- Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně zelené, středně ojínné. Cibule středně velká až velká, kulovitěho tvaru, středně až tmavě hnědou barvou horních suchých, slabě až středně přiléhajících sukní.
- Obsah sušiny velmi nízký až nízký. Tendence k vyběhání do květu v produkčním roce velmi slabá až slabá.

Česnek

Allium sativum L.

- ozimý

Anin

- Pozdní odrůda ozimého paličáku. Barva olístění středně zelená, cibule středně velká se středně vysokým až vysokým počtem vnějších stroužků. Základní barva cibule smetanová s fialovými skvrnami. Doba rašení raná - doporučená doba vyskladnění v průběhu prosince až ledna.

Anton

- Poloraná odrůda ozimého nepaličáku. Barva olístění modrozelená, cibule středně velká až velká se středně vysokým počtem vnějších stroužků. Základní barva horních sukní cibule smetanová s fialovými skvrnami. Doba rašení poloraná až pozdní - doporučená doba vyskladnění únor až březen.

Vlivem klimatických podmínek se může vyskytnout ojedinělá tvorba horních stroužků nad cibulí bez nebo s krátkým květním stvolem.

Elin

- Pozdní odrůda ozimého paličáku. Barva olístění středně zelená, cibule středně velká se středně vysokým až vysokým počtem vnějších stroužků bez vnitřních stroužků. Základní barva cibule smetanová s fialovými skvrnami. Doba rašení raná - doporučená doba vyskladnění v průběhu prosince až ledna.

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. *nanus* (L.) Aschers.

Alicante

- Raná až poloraná odrůda.
- Rostlina nízká až středně vysoká. Listy tmavě zelené, středně bublinaté, terminální lístek středně velký až velký, trojúhelníkovitého až okrouhlého tvaru s krátce až středně dlouhým hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně až tmavě zelený, středně dlouhý až dlouhý, úzký až středně široký, kruhovitěho tvaru na průřezu, tupě zakončený slabě konkávně zakřivený, na povrchu hladký, bez vlákniny. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS nízká až středně vysoká.

Grenoble

- Raná až poloraná odrůda.
- Rostlina středně vysoká. Listy středně až tmavě zelené, slabě až středně bublinaté, terminální lístek středně velký, čtyřúhelníkovitého tvaru se středně dlouhým hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně zelený, středně dlouhý, středně široký, srdcovitého tvaru na

průřezu, špičaté až tupě zakončený velmi slabě konkávně zakřivený, na povrchu středně drsný, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS středně vysoká.

Fazol obecný pnoucí

Phaseolus vulgaris L. var. vulgaris (L.) Aschers.

Belmonte

Poloraná odrůda.

Listy středně až tmavě zelené, silně bublinaté, terminální lístek velký, trojúhelníkovitého až okrouhlého tvaru s krátce hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně až tmavě zelený, dlouhý, široký, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, tupě zakončený, velmi slabě konkávně zakřivený, na povrchu středně drsný, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS vysoká.

Goldmarie

Raná až poloraná odrůda.

Listy středně zelené, středně bublinaté, terminální lístek středně velký až velký, okrouhlého tvaru s krátce hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně žlutý, dlouhý, široký, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, tupě zakončený, velmi slabě konkávně zakřivený, na povrchu hladký, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS středně vysoká.

Jitka

Velmi pozdní odrůda.

Listy světle zelené, středně až silně bublinaté, terminální lístek malý, okrouhlého až čtyřúhelníkovitého tvaru s krátce hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně zelený, krátký, středně široký až široký, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, tupě zakončený, velmi slabě konkávně zakřivený, na povrchu středně drsný, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno na polovině hnědé, na polovině bílé, HTS středně vysoká až vysoká.

Odrůda je náchylná k napadení virózy.

Neckargold

Poloraná odrůda.

Listy světle až středně zelené, středně bublinaté, terminální lístek středně velký, okrouhlého tvaru s krátce hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk tmavě žlutý, středně dlouhý, středně široký, srdcovitého tvaru na průřezu, špičaté až tupě zakončený, slabě konkávně zakřivený, na povrchu hladký, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS středně vysoká.

Neckarkönigin

Poloraná odrůda.

Listy tmavě zelené, silně bublinaté, terminální lístek velký, okrouhlého až čtyřúhelníkovitého tvaru s krátce až středně dlouze hrotitým koncem. Květ bílý. Lusk středně zelený, dlouhý, středně široký až široký, srdcovitého tvaru na průřezu, tupě zakončený, velmi slabě konkávně zakřivený, na povrchu hladký, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno bílé, HTS středně vysoká.

Pardola

Poloraná odrůda.

Listy světle až středně zelené, středně až silně bublinaté, terminální lístek středně velký, okrouhlého až čtyřúhelníkovitého tvaru s krátce hrotitým koncem. Květ růžový. Lusk středně zelený se středně hustým až hustým červeným žlábkem, středně dlouhý, středně široký až široký, elipsovitého až vejčitého tvaru na průřezu, špičaté až tupě zakončený, středně konkávně zakřivený, na povrchu středně drsný, bez vlákn. Polozralé semeno světle zelené, suché semeno hnědožluté s červenými skvrnkami, HTS vysoká.

Hrách setý cukrový

Pisum sativum L. convar. axiphium Alef. emend C.O. Lehm.

Ilowiecki

Velmi raná až raná odrůda cukrového hrachu. Rostlina nízká až středně vysoká, počet nodů nízký až střední, barva listů světle zelená, palisty plně vyvinuté, barva květu bílá, lusk světle zelený, velmi krátký až krátký, úzký až středně široký, bez pergamenové vrstvy se ztlusťou stěnou, slabě prohnutý, tupě zakončený, semeno kulovité se žlutými dělohami, škrobová zrna jednoduchá, HTS nízká.

Kapusta hlávková

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

Denver

Pozdní hybrid pro pozdní podzimní a časně zimní sklizeň pro přímou spotřebu a skladování.

Rostliny středně vysoké a středně široké s krátkým až středně dlouhým vnějším koštělem. Listy středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě šedozelené, slabě až středně zkadeřeně, středně silně až silně bublinaté a silně ojměné. Hlávka středně velká, přibližně eliptického tvaru, středně až tmavě zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštělem.

Odrůda odolná proti praskání hlávek a vyvracení koštělu.

Jocoma

Velmi pozdní hybrid pro podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a skladování.

Rostliny středně vysoké až vysoké a středně široké až široké se středně dlouhým vnějším koštělem. Listy středně velké až velké,

polovzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě až středně zkadeřené, slabě až středně bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka středně velká, okrouhlého až příčně eliptického tvaru, středně až tmavě zelená, středně hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti praskání hlávek a vyvracení koštělu.

Siberia

Pozdní hybrid pro pozdní podzimní a časné zimní sklizně pro přímou spotřebu a skladování.

Rostliny středně vysoké a středně široké s krátkým až středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké až velké, polovzpřímené až vzpřímené, okrouhlé až široce vejčité, středně až tmavě zelené, velmi slabě až slabě zkadeřené, středně bublinaté a středně ojínné. Hlávka středně velká, příčně eliptického tvaru, středně až tmavě zelená, středně hustá až hustá, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti praskání hlávek a vyvracení koštělu.

Kapusta růžičková

Brassica oleracea L. *convar. oleracea* var. *gemmifera* DC.

Dolores

Raný hybrid pro přímou spotřebu i zpracování.

Rostliny vysoké se středně zelenými, slabě ojínnými listy. Řapíky převislé. Listy na podzim pozvolna opadávají. Růžičky středně velké až velké, středně zelené, široce vejčitého tvaru s hladkým povrchem a dobrým uzavřením.

Odrůda odolná proti vyvracení koštělu.

Kedluben

Brassica oleracea L. *convar. acephala* (DC.) Alef. var. *gongylodes* L.

Baltik

Modrá poloraná odrůda pro jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny vysoké se středně velkými listy, tmavě až velmi tmavě modrozelené barvy a se středně silnými řapíky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou s ojedinělým výskytem slabých ligninových vláken.

Odrůda odolná proti dřevnatění a praskání bulev i vyběhání do květu.

Odrůda je přihlášená k právní ochraně.

Eder

Bílá poloraná hybridní odrůda pro jarní, letní i podzimní polní pěstování, vhodná i pro přirychlování.

Rostliny nízké až středně vysoké se středně velkými, tmavě zelenými listy s modravým odstínem a středně silnými řapíky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou, bez ligninových vláken.

Odrůda odolná proti dřevnatění a praskání bulev i vyběhání do květu.

Kongo

Bílá raná hybridní odrůda pro jarní nebo podzimní polní pěstování, vhodná i pro přirychlování.

Rostliny středně vysoké se středně velkými šedozelenými listy a středně silnými řapíky. Bulva středně velká, ploše kulovitá s kvalitní jemnou dužninou, bez ligninových vláken.

Odrůda odolná proti dřevnatění bulev a vyběhání do květu a středně odolná až odolná proti praskání bulev.

Kukuřice setá cukrová

Zea mays L. *convar. saccharata* Koern.

Candle

Velmi raný hybrid.

Rostliny středně vysoké, poměr výšky nasazení horní palice k výšce rostliny velmi malý až malý, palice dlouhá, počet řad semen nízký, typ zrna cukrový, barva zrna žlutá.

Mv. Sugár

Velmi raný hybrid.

Rostliny středně vysoké, poměr výšky nasazení horní palice k výšce rostliny malý, palice středně dlouhá až dlouhá, počet řad semen střední, typ zrna cukrový, barva zrna žlutá.

Květák

Brassica oleracea L. *convar. botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis* L.

Beauty

Poloraný hybrid pro podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, polovzpřímené, středně šedozelené, středně ojínné a slabě až středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a středně až hrubě zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění růžice. Ojediněle slabě mechovatí.

Brabant

Poloraný hybrid pro letní až podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně šedo zelené, středně až silně ojínné a středně bublinaté. Růžice částečně krytá až krytá, velká, příčně široce eliptická až okrouhlá, středně klenutá, pevná, bělavá, středně hrbolovitá a středně zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění a proti mechovatění růžice.

Gregor

Poloraný hybrid pro časně letní a zejména podzimní sklizně.

Rostliny středně vysoké až vysoké. Listy středně velké až velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně až tmavě šedo zelené, středně ojínné a slabě bublinaté. Růžice částečně krytá, středně velká až velká, příčně široce eliptická, středně až silně klenutá, pevná, bělavá s odstínem slonové kosti, středně hrbolovitá a jemně až středně zrnitá.

Odrůda odolná proti fialovění a proti mechovatění růžice.

Mrkev

Daucus carota L.

Amazon

Raný hybrid typu Nantes pro jarní a z pozdních výsevů i pro podzimní sklizně, vhodný na přímý konzum, jako svazková nebo mytá mrkev bez natě.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé, světle až středně zelené, středně až hrubě členité. Kořeny středně dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého tvaru s převážně tupým zakončením a hladkým až velmi slabě ryhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové. Hlava na povrchu i na řezu zelená velmi slabě. Nemá antokyanové zbarvení.

Odrůda odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí listů a odolná proti praskání kořenů.

Obsah karotenu střední a obsah sušiny nízký až střední.

Antares

Raný hybrid typu Nantes pro jarní a z pozdních výsevů i pro podzimní sklizně, vhodný na přímý konzum, jako svazková nebo mytá mrkev bez natě.

Listy vzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořeny středně dlouhé až dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě ryhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové. Hlava na povrchu i na řezu nezelená a nemá antokyanové zbarvení.

Odrůda středně odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí listů a odolná proti praskání kořenů.

Obsah karotenu nízký a obsah sušiny střední.

Cesaro

Poloraný hybrid typu Nantes pro jarní a letní sklizně, vhodný na přímý konzum, jako svazková a zejména mytá mrkev bez natě. Z pozdních výsevů i ke skladování.

Listy polovzpřímené, středně dlouhé až dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořeny středně dlouhé až dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě ryhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové. Hlava na povrchu i na řezu nezelená a nemá antokyanové zbarvení.

Odrůda odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí listů a odolná proti praskání kořenů.

Obsah karotenu nízký až střední a obsah sušiny střední.

Maruška

Raný až poloraný hybrid typu Nantes pro jarní a letní sklizně, vhodný na přímý konzum, jako mytá mrkev bez natě. Z pozdních výsevů i ke skladování.

Listy vzpřímené až polovzpřímené, středně dlouhé, středně zelené a středně členité. Kořeny středně dlouhé, středně široké, dlouze válcovitého až mírně kuželovitého tvaru s tupě špičatým zakončením a slabě ryhovaným povrchem. Zbarvení pokožky a korové části středně oranžové, dřevě středně až tmavě oranžové, dřevě je tmavší než korová část. Hlava na povrchu i na řezu nezelená a má ojedinělé slabě antokyanové zbarvení.

Odrůda odolná proti napadení alternariovou skvrnitostí listů.

Obsah karotenu nízký až střední a obsah sušiny střední.

Okurka

Cucumis sativus L.

– nakládačka

Berlinda

Raný nepartenokarpický hybrid.

Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody světle až tmavě zelené, krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Dalila

Poloraný nepartenokarpický hybrid.

Rostliny silně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody světle zelené, krátké s hrubou řidkou bradavičnatostí.

Elisabet

Poloraný partenokarpický hybrid.

Rostliny slabě až středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody středně zelené, krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Jitka

Poloraný nepartenokarpický hybrid.

Rostliny středně až silně vzrůstné s převážně samičími květy. Plody středně až tmavě zelené, krátké s hrubou řídkou bradavičnatostí.

Klárka

Poloraný nepartenokarpický hybrid.

Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody středně zelené, krátké s jemnou hustou bradavičnatostí.

Lada

Raný nepartenokarpický hybrid.

Rostliny středně až silně vzrůstné s převážně samičími květy. Plody středně zelené, krátké s hrubou řídkou bradavičnatostí.

– salátová**Desana**

Poloraný partenokarpický hybrid holandského typu vhodný pro pěstování ve vytápěných rychlínách. Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody dlouhé, středně zelené, hladké, středně žebnaté s krátkým krčkem.

Media

Poloraný partenokarpický hybrid tzv. "mini" typ vhodný pro rychlení.

Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody tmavě zelené, středně dlouhé, hladké, středně žebnaté se zahroceným stopkovým koncem.

Natalie

Raný až poloraný hybrid vhodný pro polní pěstování.

Rostlina silně vzrůstná s převážně samičími květy. Plody tmavě zelené, bradavičnaté, středně dlouhé, průměr plodů střední až velký.

Nebraska

Poloraný partenokarpický hybrid holandského typu vhodný pro rychlení.

Rostliny středně vzrůstné s téměř výlučně samičími květy. Plody středně zelené, dlouhé, hladké, středně žebnaté s krátkým krčkem.

Paprika

Capsicum annuum L.

Anežka

Raná až poloraná odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách.

Rostlina má polovzpřímené až rozkladité postavení větví, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod silně lesklý, na povrchu slabě zvrásněný, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti tmavě červený, středně dlouhý až dlouhý, středně široký, na podélném řezu převážně trojúhelníkovitého tvaru s mělkou stopěnou jamkou a zašpičatělým apikálním koncem. Perikarp v bazální části hladký, oplodí středně silné, placenta malá. Chuť sladká.

Bajka

Pozdní odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod silně lesklý, na povrchu slabě zvrásněný, před zralostí středně zelený, ve zralosti tmavě červený, dlouhý, široký, na podélném řezu převážně obdélníkovitého tvaru s mělkou stopěnou jamkou a vtlačeným apikálním koncem. Perikarp v bazální části slabě zvlněný, oplodí středně silné až silné, placenta malá. Chuť sladká.

Jupiter

Poloraná až pozdní odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení krátký až středně dlouhý. Plod silně lesklý, na povrchu slabě zvrásněný, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti středně červený, krátký až středně dlouhý, široký, na podélném řezu převážně čtvercovitého tvaru s středně hlubokou stopěnou jamkou a vtlačeným apikálním koncem. Perikarp v bazální části hladký, oplodí středně silné až silné, placenta středně velká. Chuť sladká.

Ludmila

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v rychlínách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení středně dlouhý až dlouhý. Plod středně až silně lesklý, na povrchu hladký, před zralostí světle až středně zelený, ve zralosti středně oranžový, krátký, středně široký až široký, na podélném řezu převážně kruhovitého tvaru s velmi mělkou stopěnou jamkou a vtlačeným apikálním koncem. Perikarp v bazální části hladký, oplodí silné, placenta středně velká až velká. Chuť sladká.

Meika

Pozdní odrůda vhodná pro pěstování v rychlímách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod silně lesklý, na povrchu slabě zvrásněný, před zralostí středně až tmavě zelený, ve zralosti tmavě červený, dlouhý, široký, na podélném řezu převážně obdélníkovitého tvaru s mělkou až středně hlubokou stopečnou jamkou a vtačeným apikálním koncem. Perikarp v bazální části slabě zvlněný, oplodí středně silné až silné, placenta středně velká. Chuť sladká.

Monte

Pozdní hybrid vhodný pro pěstování v rychlímách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení středně dlouhý. Plod silně lesklý, na povrchu slabě zvrásněný, před zralostí světle zelený, ve zralosti žlutý, středně dlouhý, středně široký až široký, na podélném řezu převážně obdélníkovitého tvaru se středně hlubokou až hlubokou stopečnou jamkou a vtačeným apikálním koncem. Perikarp v bazální části hladký, oplodí středně silné až silné, placenta středně velká. Chuť sladká.

Slávka

Poloraná odrůda vhodná pro pěstování v rychlímách.

Rostlina má polovzpřímené postavení větví, stonek po první větvení krátký. Plod silně lesklý, na povrchu hladký, před zralostí nažloutlý, ve středně červený, krátký, středně široký, na podélném řezu převážně srdčitého tvaru s mělkou stopečnou jamkou a zaobleným apikálním koncem. Perikarp v bazální části hladký, oplodí silné, placenta velká. Chuť sladká.

Pažitka

Allium schoenoprasum L.

Moravia

Rostlina středně vysoká, listy polovzpřímené, světle až středně zelené, středně dlouhé, středně silné, počet listů nízký, období začátku tvorby poupat rané až polorané.

Pór

Allium porrum L.

Blauwgroene Herfst

Polopozdní odrůda vhodná pro pozdní letní až podzimní sklizeň.

Rostlina středně vysoká. Listy vzpřímené až polovzpřímené, tmavě modrozelené, středně ojínné. Lodyha krátká až střední bez zesílení do cibule.

Blauwgroene Winter

Pozdní odrůda vhodná pro pozdní podzimní až zimní sklizeň.

Rostlina středně vysoká. Postavení listů polovzpřímené až horizontální, tmavě modrozelené, středně až silně ojínné. Lodyha krátká až střední, zesílení do cibule slabé.

Bulgaarse Reuzen

Velmi raná odrůda vhodná pro letní sklizeň.

Rostlina vysoká. Listy jsou vzpřímené až polovzpřímené, světle zelené, středně ojínné. Stvol je dlouhý bez zesílení do cibule.

Titus

Polopozdní až pozdní odrůda vhodná pro podzimní sklizeň až přezimování.

Rostlina středně vysoká až vysoká. Listy polovzpřímené, tmavě modrozelené, středně až silně ojínné. Lodyha středně dlouhá bez zesílení do cibule.

Zwitserse Reuzen

Poloraná odrůda vhodná pro pozdní letní sklizeň

Rostlina vysoká. Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené, silně ojínné. Stvol středně dlouhý bez zesílení do cibule.

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

Aromata

Pozdní indeterminantní hybrid vhodný pro pěstování v rychlímách.

Listy horizontální, středně dlouhé, středně široké, dvojitě členěné. Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký, u stopky velmi slabě žebrovaný, převážně slabě zploštělý, se středně hlubokou stopečnou jamkou, středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, na apikálním konci plochý s velmi malou květní jizvou, tří a čtyř komorový, před zralostí středně zelený bez žltnutí, ve zralosti červený.

Pevné plody lze po sklizni skladovat v neřízené atmosféře po dobu 2 až 3 týdnů bez ztráty kvality.

Ildiko

Poloraný semideterminantní hybrid vhodný pro pěstování v rychlínách.

Rostliny ukončují růst za 4 - 6 týdnem. Listy horizontální až převislé, středně dlouhé, středně široké, dvojité členěné. Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký až velký, u stopky středně žebrovaný, převážně slabě zploštělý se středně hlubokou stopečnou jamkou a velkou korkovou stopou u stopky, na apikálním konci plochý se středně velkou květní jizvou, více než čtyř komorový, před zralostí středně zelený bez žlhlání, ve zralosti červený.

Lusita

Poloraný indeterminantní hybrid vhodný pro pěstování v rychlínách.

Listy horizontální až převislé, středně dlouhé, středně široké, dvojité členěné. Květenství převážně jednoduché. Plod středně velký až velký, u stopky slabě žebrovaný, převážně slabě zploštělý se slabě až středně hlubokou stopečnou jamkou a se středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, na apikálním konci plochý s velmi malou květní jizvou, dvou a tří komorový, před zralostí světle zelený bez žlhlání, ve zralosti červený.

Pevné plody lze po sklizni skladovat v neřízené atmosféře po dobu 3 týdnů bez ztráty kvality.

Petula

Poloraný až pozdní indeterminantní hybrid vhodný pro pěstování v rychlínách.

Listy horizontální až převislé, středně dlouhé až dlouhé, středně široké, dvojité členěné. Květenství jednoduché i složené. Plod středně velký až velký, u stopky středně žebrovaný, převážně slabě zploštělý se středně hlubokou stopečnou jamkou a se středně velkou až velkou korkovou stopou u stopky, na apikálním konci prohloubený až plochý se středně velkou květní jizvou, tří a čtyř komorový, před zralostí středně zelený bez žlhlání, ve zralosti červený.

Pevné plody lze po sklizni skladovat v neřízené atmosféře po dobu 2 až 3 týdnů bez ztráty kvality.

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

Balkar

Poloraná hybridní diploidní odrůda pro jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny nízké. Listy polovzpřímené, široce vejčitého tvaru, světle až středně zelené, slabě laločnaté. Bulvičky velké, kulovité na bázi zakulacené, šarlatově červené barvy s matně bílou dužninou.

Odrůda odolná proti praskání bulviček, středně odolná až odolná proti houbovatění dužniny a vybíhání do květu.

Masterred

Raná hybridní diploidní odrůda pro rychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy polovzpřímené, vejčitého tvaru, středně až tmavě šedozelené, slabě až středně laločnaté. Bulvičky velké, kulovité na bázi zakulacené, šarlatově červené barvy s matně bílou až růžovou dužninou.

Odrůda odolná proti praskání bulviček a vybíhání do květu, málo až středně odolná proti houbovatění dužniny.

Poloneza

Raná, dvoubarevná diploidní odrůda pro rychlení a jarní nebo podzimní polní pěstování.

Rostliny středně vysoké. Listy polovzpřímené, vejčitého tvaru, středně až silně laločnaté. Bulvičky velké, převážně kulovité až oválné, na bázi zakulacené, červenobílé s malým až středním rozsahem bílé barvy s matně bílou až narůžovělou dužninou.

Odolnost proti praskání bulviček, houbovatění dužniny a vybíhání do květu vysoká.

Odrůda odolná proti praskání bulviček, houbovatění dužniny a vybíhání do květu.

Rudi

Raná až poloraná diploidní odrůda pro jarní nebo podzimní polní pěstování. ve volné půdě.

Rostliny nízké až středně vysoké. Listy polovzpřímené, vejčitého až široce vejčitého tvaru, středně až tmavě šedozelené, slabě laločnaté. Bulvičky středně velké až velké, kulovité na bázi zakulacené, šarlatově červené s matně bílou dužninou.

Odrůda odolná proti praskání bulviček, středně odolná až odolná proti houbovatění dužniny a vybíhání do květu.

Summerred

Raná diploidní odrůda pro jarní a letní polní pěstování.

Rostliny nízké. Listy polovzpřímené, krátké, široce vejčitého tvaru, světle až středně zelené, slabě laločnaté. Bulvičky střední až velké, kulovité na bázi zakulacené, šarlatově červené barvy s matně bílou dužninou.

Odrůda odolná proti praskání bulviček, středně odolná až odolná proti houbovatění dužniny a vybíhání do květu.

Řepa salátová

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Monalisa

Geneticky jednoklíčková poloraná odrůda pro letní až podzimní sklizně. pro přímou spotřebu a průmyslové zpracování.

Odrůda s nízkým až středně vysokým chrástem. Lístová čepel malá až středně velká, úzce eliptická, středně až tmavě zelená. Řepík krátký až středně dlouhý, červený. Bulva kulatá s purpurově červenou středně korkovitou pokožkou. Dužnina je stejnoměrně intenzivně karmínově červená, kroužky jsou neznatelné, vláknitost dužniny po vaření slabá.

Odrůda odolná proti vybíhání do květu.

Salát hlávkový

Lactuca sativa L. var. capitata L.

Brilant

Raná odrůda máslového typu, vhodná k rychlení.

Listy vodorovné až polovzpřímené, středně zelené barvy bez antokyanu, středně tlusté se slabým leskem, slabou bublinatostí a středně velkými bublinami a celokrajným okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, středně překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá se slabě až středně uzavřenou bází.

Vzhledem k tužším vnějším listům lze krátkodobě skladovat.

Odrůda středně odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Děvín

Raná odrůda máslového typu, vhodná k rychlení a přirychlování.

Listy vodorovné až polovzpřímené, středně zelené barvy bez antokyanu, tenké až středně tlusté se slabým leskem, bez bublinatosti a celokrajným okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, středně překrytá listy, středně pevná, středně hustá se slabě až středně uzavřenou bází.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu i za dlouhého dne.

Dickinson

Poloraná až pozdní odrůda ledového salátu typu, Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro časné letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně šedozeleň barvy bez antokyanu, tlusté se středním leskem, slabou až středně silnou bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, pevná, hustá, těžká, křehká se slabě uzavřenou bází.

Odrůda velmi odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Fulca

Raná až poloraná odrůda máslového salátu typu, vhodná k polnímu pěstování pro letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě zelené barvy bez antokyanu, středně tlusté se středním až silným leskem, slabou bublinatostí a velkými bublinami a slabě až středně zvlněným okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, středně překrytá listy, středně pevná až pevná, středně hustá se středně uzavřenou bází.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Maximo

Pozdní odrůda ledového salátu typu, Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě šedozeleň barvy bez antokyanu, tlusté se středním leskem, středně silnou bublinatostí, malými bublinami, středně zvlněným a středně až silně členitým okrajem čepele. Hlávka velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, pevná, středně hustá až hustá, těžká, křehká se slabě až středně uzavřenou bází.

Odrůda velmi vysoce odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Miniko

Pozdní odrůda ledového salátu typu, Saladin, vhodná k polnímu pěstování pro jarní, letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené, středně šedozeleň barvy bez antokyanu, tlusté se středním až silným leskem, slabou až středně silnou bublinatostí, malými bublinami, středně až silně zvlněným a středně členitým okrajem čepele. Hlávka malá až středně velká, okrouhlá, zcela překrytá listy, velmi pevná, hustá, křehká se středně až silně uzavřenou bází.

Odrůda velmi vysoce odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Singers

Raná až poloraná odrůda máslového salátu typu, vhodná k polnímu pěstování pro letní a podzimní sklizně.

Listy polovzpřímené až vodorovné, středně zelené barvy bez antokyanu, středně tlusté až tlusté se slabým leskem, slabou bublinatostí, středně velkými až velkými bublinami a velmi slabě až slabě zvlněným okrajem čepele. Hlávka středně velká, okrouhlá, středně překrytá listy, středně pevná, středně hustá se středně uzavřenou bází.

Odrůda středně odolná až odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Whitna

Raná odrůda máslového typu, vhodná k rychlení.

Listy polovzpřímené, středně až tmavě zelené barvy bez antokyanu, středně tlusté, bez lesku s velmi slabou bublinatostí, velkými bublinami a celokrajným okrajem čepele. Hlávka středně velká až velká, příčně široce eliptická, slabě až středně překrytá listy, středně pevná, volná až středně hustá se středně uzavřenou bází.

Odrůda středně odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Salát listový

Lactuca sativa L. var. crispa L.

Rosela

Raná odrůda listového salátu typu Lollo Rossa, vhodná k polnímu pěstování pro letní a podzimní sklizně.

Tvoří velký shluk tenkých až středně tlustých listů se středně až tmavě červeným zbarvením, silným až velmi silným leskem, velmi silnou bublinatostí a malými bublinami, silně zvlněným okrajem čepele a mělkými až středně hlubokými zářezy.

Odrůda odolná proti vyběhání do květu za dlouhého dne.

Špenát
Spinacea oleracea L.

Laska

Raný hybrid pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel středně žlutozelená, středně bublinatá, vejčitého tvaru se středním leskem. Řapík středně dlouhý, vzpřímený.

Po překročení sklizňové zralosti středně rychle vybíhá do květu.

Odrůda odolná proti napadení plísňí špenátovou.

Limbo

Raný hybrid pro jarní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel světle až středně žlutozelená a středně bublinatá, široce eliptického až vejčitého tvaru se slabým až středním leskem. Řapík středně dlouhý, vzpřímený až polovzpřímený.

Po překročení sklizňové zralosti středně rychle pozdě až pozdě vybíhá do květu.

Odrůda odolná proti napadení plísňí špenátovou.

Space

Poloraná hybridní odrůda pro jarní, letní nebo podzimní pěstování.

Listová čepel středně až tmavě žlutozelená a středně až silně bublinatá, široce vejčitého tvaru se středním leskem. Řapík středně dlouhý až dlouhý, vzpřímený až polovzpřímený.

Po překročení sklizňové zralosti pozdě a pozvolna vybíhá do květu.

Odrůda odolná proti napadení plísňí špenátovou.

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Ama – Dan

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně pro přímou spotřebu a zejména kruhárenské zpracování.

Rostliny velké se středně dlouhým vnějším košťálem. Listy velké, polovzpřímené až vodorovné, tmavě modrozelené, silně až velmi silně bublinaté a silně až velmi silně ojínné. Hlávka velká, příčně úzce eliptická, středně hustá až hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá s hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odrůda středně odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek.

Amukos

Raný hybrid pro jarní sklizně pro přímou spotřebu.

Rostliny malé s krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, polovzpřímené, středně šedozelelé, slabě bublinaté a středně ojínné. Hlávka malá, příčně eliptická až okrouhlá, volná až středně hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odrůda odolná proti vyvracení košťálu a středně odolná proti praskání hlávek při přezrávání.

Ancoma

Pozdní hybrid pro podzimní sklizně s univerzálním využitím pro přímou spotřebu, kruhárenské zpracování a skladování.

Rostliny středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené až vzpřímené, středně šedozelelé, velmi slabě bublinaté a středně ojínné. Hlávka středně velká, široce eliptická až okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá a na okraji zelená se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odrůda odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek.

Carolina

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizně pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy středně velké, polovzpřímené, středně šedozelelé, slabě bublinaté a silně ojínné. Hlávka středně velká, široce eliptická až okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním košťálem.

Odrůda středně odolná proti vyvracení košťálu a odolná proti praskání hlávek.

Kalibro

Poloraný hybrid pro letní sklizně pro přímou spotřebu.

Rostliny malé až středně velké s krátkým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, polovzpřímené až vodorovné, středně až tmavě šedozelelé, slabě bublinaté a středně až silně ojínné. Hlávka malá až středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odrůda odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek při přezrávání.

Marcello

Poloraný hybrid pro letní až podzimní sklizně pro přímou spotřebu.

Rostliny malé až středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším košťálem. Listy malé až středně velké, polovzpřímené, středně až tmavě zelené, slabě bublinaté a středně ojínné. Hlávka malá až středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, světle až středně žlutozelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním košťálem.

Odrůda odolná proti vyvracení košťálu a proti praskání hlávek při přezrávání.

Santorino

Raný hybrid pro jarní sklizeň pro přímou spotřebu.

Rostliny velmi malé s krátkým vnějším koštěm. Listy malé, polovzpřímené až vodorovné, středně šedo zelené, slabě až středně bublinaté a středně ojínené. Hlávka malá, okrouhlá, středně hustá, uzavřená, světle zelená, uvnitř žlutavá se středně hrubou vnitřní strukturou a středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti vyvracení koštělu a středně odolná proti praskání hlávek při přezrání.

Score

Polopozdní hybrid pro podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a zejména kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké až velké se středně dlouhým vnějším koštěm. Listy velké, polovzpřímené, středně zelené, slabě až středně bublinaté a slabě až středně ojínené. Hlávka velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně zelená, uvnitř bělavá se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti vyvracení koštělu a proti praskání hlávek.

Tigre

Pozdní hybrid pro podzimní sklizeň s univerzálním využitím pro přímou spotřebu, kruhárenské zpracování a skladování.

Rostliny středně velké až velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším koštěm. Listy velké, vzpřímené až polovzpřímené, středně šedo zelené, slabě bublinaté a silně až velmi silně ojínené. Hlávka středně velká až velká, okrouhlá, hustá až velmi hustá, uzavřená až polouzavřená, světle až středně šedo zelená, uvnitř bělavá s jemnou až středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti vyvracení koštělu a proti praskání hlávek.

Zelí hlávkové červené

Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

Anoxa

Raný až poloraný hybrid pro pozdně letní až podzimní sklizeň s univerzálním využitím pro přímou spotřebu, kruhárenské zpracování a skladování.

Rostliny velké se středně dlouhým až dlouhým vnějším koštěm. Listy velké, vzpřímené až polovzpřímené u báze vodorovné, středně až tmavě fialové, slabě až středně bublinaté a středně až silně ojínené. Hlávka středně velká, široce eliptická až obvejčitá, hustá, uzavřená, středně až tmavě fialová se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda středně odolná proti vyvracení koštělu a odolná proti praskání hlávek.

Redma

Raný až poloraný hybrid pro pozdně letní až podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké s krátkým až středně dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké, vzpřímené až polovzpřímené a u báze vodorovné, středně fialové, slabě až středně bublinaté a středně až silně ojínené. Hlávka malá, okrouhlá, středně hustá až hustá, uzavřená, světle až středně fialová se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda odolná proti vyvracení koštělu a proti praskání hlávek.

Roccoma

Poloraný hybrid pro pozdně letní až podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké až velké se středně dlouhým koštěm. Listy středně velké, vzpřímené u báze vodorovné, tmavě fialové, slabě až středně bublinaté a středně až silně ojínené. Hlávka středně velká, široce eliptická, hustá, uzavřená, středně fialová vně i uvnitř se středně hrubou vnitřní strukturou a krátkým vnitřním koštěm.

Odrůda středně odolná proti vyvracení koštělu a odolná proti praskání hlávek.

Rosu Daneza

Poloraný hybrid pro letní až podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké až velké s krátkým vnějším koštěm. Listy středně velké, polovzpřímené, tmavě fialové, středně bublinaté a slabě až středně ojínené. Hlávka malá, až středně velká, okrouhlá, hustá, uzavřená, středně až tmavě fialová se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda středně odolná až odolná proti vyvracení koštělu a proti praskání hlávek.

Zelox

Poloraný hybrid pro letní až podzimní sklizeň pro přímou spotřebu a kruhárenské zpracování.

Rostliny středně velké s dlouhým vnějším koštěm. Listy středně velké až velké, vzpřímené u báze vodorovné, středně až tmavě fialové, slabě až středně bublinaté a středně až silně ojínené. Hlávka malá až středně velká, široce eliptická, hustá, uzavřená, středně až tmavě fialová se středně hrubou až hrubou vnitřní strukturou a krátkým až středně dlouhým vnitřním koštěm.

Odrůda středně odolná až odolná proti vyvracení koštělu a odolná proti praskání hlávek.

Léčivé a kořeninové rostliny

Měsíček lékařský

Calendula officinalis L.

Plamen plus

Středně raná až pozdní odrůda pro sběr drogy.

Rostliny středně vysoké až vysoké, polovzpřímené. Stonek mohutný, silně větvený. Listy středně zelené. Květní úbory poloplňné až plné, středně velké, jazykovité květy tmavě oranžové, trubkovité květy žluté. Začátek kvetení středně raný až pozdní.

Drogou je květ (*Flos calendulae*) s vysokým obsahem beta karotenu.

Ovocné druhy

Angrešt

Ribes uva-crispa L.

Dekor

Raná odrůda.

Pravokohenný keř kulovitěho tvaru, slabě vzrůstný s nízkým počtem základních výhonů. Tvar korunky na podnoži meruzalky zlatě deštníkovitý. Plody velké, elipsoidního tvaru, v době fyziologické zralosti zelené barvy s bílým nádechem, slabě ojněné. Slupka slabá, slabě ochmýřená se středně výraznou nervaturou. Odrůda středně odolná proti napadení americkým padlím angreštovým.

Broskvoň

Prunus persica (L.) Batsch

Michaela

Středně raná žlutomasá odrůda.

Vzrůstnost silná, koruna polovzpřímená. Květ zvonkovitý. Plod velký, podlouhlý, nesouměrný. Velikostní vyrovnanost plodů dobrá. Slupka středně silná, hustě plstnatá, základní barva zelenavě žlutá z poloviny až ze dvou třetin překrytá červeným rozmytým líčkem. Slupka není dobře loupatelná. Dužnina žlutá, středně pevná, bez vláken. Dužnina na pecce středně ulpívá.

Zraje 7 dnů před odrůdou Redhaven.

Odolná proti padání plodů.

Hrušeň

Pyrus communis L.

Alice

Letní odrůda.

Vzrůstnost slabá, koruna rozložitěho habitu, plodí na krátkém dřevě. Plod baňkovitého tvaru, středně velký, ve velikosti vyrovnaný. Středně dlouhá a silná stopka napojená v ose plodu. Slupka tenká, suchá. Základní barva zelenožlutá, krycí světle červená ve formě žhání. Dužnina bílá, středně šťavnatá.

Sklizeň v polovině července, konzumně dozrává na přelomu července a srpna.

David

Zimní odrůda.

Vzrůstnost středně silná, koruna polovzpřímeněho habitu, letorosty mají zvlněný charakter růstu. Plod velký, hruškovitého tvaru, souměrný. Stopka středně silná, napojena v ose plodu. Slupka silná, hladká bez rzivosti. Zelená základní barva slupky v době zralosti přechází do světle žluté s nevýrazným červeným líčkem. Dužnina žlutobílá, jemné konzistence, šťavnatá.

Sklizeň v polovině října, konzumně dozrává v prosinci se skladovatelností do února.

Decora

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost střední až slabá, vzpřímeně rostoucí spur-typ, plodí na krátkém dřevě. Plod hruškovitého tvaru, střední velikosti. Stopka středně silná a středně dlouhá, napojena šikmo. Slupka hladká, lesklá, středně silná. Zelenožlutá základní barva slupky ze dvou třetin překrytá rozmytou červení. Dužnina bílá, šťavnatá, máslovité konzistence.

Sklizeň v druhé polovině září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do ledna.

Jizera

Podzimní odrůda.

Vzrůstnost silná, habitus rozložitý, plodí na krátkém dřevě. Plod baňkatého tvaru, velký. Stopka silná, středně dlouhá. Slupka hladká, suchá se zřetelnými zelenými lenticelami, středně silná. Zelenožlutá základní barva slupky v době zralosti zežloutne, krycí zbarvení chybí. Dužnina bílá, velmi šťavnatá, hrubší konzistence.

Sklizeň začátkem září, konzumně dozrává v listopadu, skladovatelnost do poloviny února.

Manon

Podzimní odrůda:

Vzrůstnost silná, habitus polovzpřímený, sklon k vyholování, plodf na krátkém dřevě. Plod velký, baňkovitého až hruškovitého tvaru, souměrný. Stopka silná, středně dlouhá, napojena šikmo k plodu. Slupka rzivá po celém povrchu. Zelená základní barva plodu v době zralosti přechází do žluté. Dužnina bělavá, jemná, šťavnatá.

Sklizeň koncem září, konzumně dozrává v říjnu, skladovatelnost do listopadu.

Morava

Podzimní odrůda:

Vzrůstnost střední, habitus vzpřímený, plodf na krátkém dřevě. Plod hruškovitého tvaru, velký. Stopka je dlouhá, silná, zahnutá, napojená šikmo. Slupka je hladká, lesklá, suchá, středně silná. Zelenožlutá základní barva slupky v době zralosti je hnědožlutá s červeným žháním. Dužnina bílá, šťavnatá, máslovitá.

Sklizeň začátkem září, konzumně dozrává v říjnu, skladovatelnost do ledna.

Vonka

Zimní odrůda:

Vzrůstnost střední, středně obrůstá, plodf na krátkém dřevě. Plod baňkovitého tvaru.

Slupka silná, rzivá; suchá. Základní barva zelená, krycí chybí. Dlouhá, silná stopka napojená v ose plodu. Dužnina bílá, středně šťavnatá.

Sklizeň začátkem října, konzumně dozrává v lednu, skladovatelnost do března.

Jabloň

Malus Mill.

Biogolden

Zimní odrůda:

Vzrůstnost silná, v plodnosti středně silná, dostatečně zahušťuje, plodf na krátkém dřevě. Plod kulovitý, velký. Slupka tenká, suchá, drsná. Základní barva zelenožlutá, krycí chybí, ve zralosti žlutá. Dužnina šťavnatá, žlutavé barvy.

Odrůda rezistentní proti napadení strupovitostí a středně odolná až odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklizeň začátkem října, konzumně dozrává v lednu, skladovatelnost do března.

Gold Bohemia

Zimní odrůda:

Vzrůstnost silná, nedostatečně zahušťuje, plodf na dlouhém dřevě. Plod kulovitý, velký. Slupka tenká, suchá s velkými lenticelami. Základní barva zelenožlutá, krycí chybí, ve zralosti žlutá. Dužnina šťavnatá, žlutavé barvy.

Odrůda středně odolná proti napadení strupovitostí, odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklizeň v polovině září, konzumně dozrává v říjnu, skladovatelnost do února.

Nela

Letní odrůda:

Vzrůstnost středně silná, dostatečně zahušťuje, plodf na krátkém dřevě. Plod podlouhle kuželovitý, středně velký až velký. Slupka tenká, hladká, slabě masná. Základní barva zelenožlutá, krycí červená ve formě žhání. Dužnina šťavnatá, krémové barvy.

Odrůda rezistentní proti napadení strupovitostí a středně odolná proti napadení padlím jabloňovým.

Sklizeň koncem srpna, skladovatelnost do září.

Sparjon

Zimní odrůda:

Vzrůstnost silná, dostatečně zahušťuje, plodf na krátkém dřevě. Plod kulovitý, středně velký. Slupka středně silná, hladká, suchá, bez ojínění. Základní barva světle zelená, krycí červená v rozmyté formě. Dužnina šťavnatá, zelenavé barvy.

Odrůda je středně odolná proti napadení strupovitostí a padlím jabloňovým.

Sklizeň začátkem září, konzumně dozrává v prosinci, skladovatelnost do února.

Jahodník

Fragaria L.

Evita

Raná remontantní odrůda:

Rostliny středně až silně vzrůstné, středně husté, habitus ploše kulovitý. Lesk listu slabý. Květenství nad úrovní listů. Plody kuželovitěho tvaru, středně velké, červené, středně až silně lesklé, tuhé. Dužnina světle červená s nepatrnou dutinou uprostřed plodu. Chuť sladce navinulá, aromatická.

Kdoulon
Cydonia oblonga Mill.

– podnož

MA-SE

Vegetativně množená odrůda kdouloně, určena jako podnož pro ovocný druh hrušeň. Vyrůstnost slabá až středně silná, odnožování v matečnické středně silné, kořenový systém středně velký a hustý. Afinita s odrůdami hrušní dobrá. Vhodná do úrodných půd a pro silně rostoucí odrůdy.

Okrasné druhy

Astra čínská
Callistephus chinensis (L.) Nees

Ivana

Odrůda k řezu, jehlicovitá.
Rostliny středně vysoké až vysoké, středně až silně větvené, stonek silný.
Úbory středně velké, růžové.

Pavla

Odrůda k řezu, hrubě drápovitá.
Rostliny středně vysoké až vysoké, středně až silně větvené, stonek středně silný.
Úbory středně velké, karmínově červené.

Jiřinka proměnlivá

Dahlia pinnata Cav. [syn.: Dahlia variabilis (Willd.) Desf.]

Berta

Odrůda se semikaktusovitým typem úboru.
Rostliny malé až středně vysoké, keřovité, slabě až středně větvičf. Stonek je pevný, světle zelený se světlejším hnědofialovým stínováním, listy středně zelené.
Úbory středně velké, oranžově červené, k okraji světlejší. Špičky květů žluté, střed úboru žlutooranžový.

Hana

Odrůda se semikaktusovitým typem úboru.
Rostliny středně vysoké, keřovité, keřovité, středně až silně větvičf. Stonek je pevný, světle zelený se světlejším hnědofialovým stínováním, listy středně až tmavě zelené.
Úbory středně velké, světle oranžové.

Harmonia

Odrůda s kaktusovitým typem úboru (fimbria).
Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičf. Stonek je pevný, zelený s tmavým antokyanovým stínováním, listy tmavě zelené.
Úbory středně velké až velké, oranžové.

Ludmila

Odrůda se semikaktusovitým typem úboru.
Rostliny malé až středně vysoké, keřovité, středně větvičf. Stonek je pevný, zelený s tmavě hnědofialovým stínováním, listy tmavě zelené.
Úbory středně velké, tmavě červené.

Půvab

Odrůda se semikaktusovitým typem úboru.
Rostliny středně vysoké, keřovité, středně až silně větvičf. Stonek je pevný, světle zelený se světlejším hnědofialovým stínováním, listy středně zelené.
Úbory středně velké, lososově růžové.

Urania

Odrůda s kaktusovitým typem úboru (fimbria).
Rostliny středně vysoké, keřovité, středně větvičf. Stonek je pevný, světle zelený s tmavě zeleným stínováním, listy tmavě zelené.
Úbory středně velké, světle žluté.

Metlice trsnatá
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.

Palava

Odrůda určená pro okrasné účely.
Rostliny polorozložitého, pravidelného vzrůstu. Listy tmavě zelené.
Květenství vzdušné, zlatavé barvy.

Paprika (okrasná)

Capsicum baccatum L.

Zvoneček

Odrůda určená pro okrasné účely.
Rostliny pěstované v květináčích jsou polovzpřímeného až rozkladitého vzrůstu.
Plody mají zvonečkovitý tvar, barva červená. Vhodné k dekoraci v čerstvém i suchém stavu.

3. Odrůdy rostlin, u kterých byla zrušena registrace podle § 16 zákona v období od 2. července 2000 do 31. května 2001

Ve sloupcích uvedeny následující údaje:

- 1 – identifikační číslo odrůdy
- 2 – udržovatel
- 3 – zmocněný zástupce
- 4 – název odrůdy
- 5 – datum nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace
- 6 – datum, do kdy smí být rozmnožovací materiál odrůdy uznáván a uváděn do oběhu

Jména a adresy udržovatelů odrůd a zmocněných zástupců jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Zemědělské plodiny

Obilniny

Ječmen

Hordeum vulgare L.

– jarní

HRV02520	202		Famin	29. 09. 2000	30. 06. 2003
HRV01389	202		Heran	29. 09. 2000	30. 06. 2003
HRV00594	202		Krystal	29. 09. 2000	30. 06. 2003
HRV00921	202		Perun	29. 09. 2000	30. 06. 2003
HRV00643	202		Rubín	29. 09. 2000	30. 06. 2003

– ozimý

HRV01483	292	172	Marinka	04. 11. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	-----	---------	--------------	--------------

Kukuřice

Zea mays L.

ZEA02710	339	124	Bonus (syn. Julia)	09. 04. 2001	30. 06. 2003
ZEA03762	711	268	Notoa	23. 03. 2001	30. 06. 2001

Pšenice obecná

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

– ozimá

TTA01830	202		Ina	29. 09. 2000	30. 06. 2003
TTA01245	172		Simona	04. 11. 2000	30. 06. 2003
TTA01167	172		Sofia	04. 11. 2000	30. 06. 2003
TTA00987	172		Sparta	04. 11. 2000	30. 06. 2003
TTA01381	202		Vega	29. 09. 2000	30. 06. 2003

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Krmné plodiny

Trávy

Jílek vytrvalý

Lolium perenne L.

LLP03461	115	32	Anduril	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	----	---------	--------------	--------------

Kostřava červená

Festuca rubra L. sensu lato

FSR02556	497	171	Barlotte	15. 03. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	----------	--------------	--------------

Luskoviny

Lupina bílá

Lupinus albus L.

LUP03403	460	171	Ida	15. 03. 2001	30. 06. 2001
LUP03431	460	171	Marita	15. 03. 2001	30. 06. 2001

Jeteloviny

Jetel luční

Trifolium pratense L.

TFP00485	159	786	Branisko	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	----------	--------------	--------------

Olejniny a přádné rostliny

Len

Linum usitatissimum L.

LNU01384	292	160	Marina	16. 03. 2001	30. 06. 2004
----------	-----	-----	--------	--------------	--------------

Řepka

Brassica napus L. (partim)

– jarní

BRN03957	777	493	46A75	28. 02. 2001–	30. 06. 2001
BRN03110	777	493	Patriot	28. 02. 2001	30. 06. 2001

Slunečnice

Helianthus annuus L.

HLA02764	944	469	Voltasol	28. 02. 2001	30. 06. 2003
----------	-----	-----	----------	--------------	--------------

Brambor a jiné okopaniny

Brambor

Solanum tuberosum L.

SLT00733	294	1040	Ausonia	26. 07. 2000	30. 06. 2002
SLT01419	519		Krystala	28. 02. 2001	30. 06. 2003
SLT01582	617	160	Folva	07. 03. 2001	30. 06. 2004

Cukrovka

Beta vulgaris L. var. altissima Döll.

BTA01703	268		Stella	28. 02. 2001	30. 06. 2003
----------	-----	--	--------	--------------	--------------

Zeleniny

Brokolice

Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

BRY04462	313	186	Murcia	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	--------	--------------	--------------

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Cibule

Allium cepa L.

– jarní

ALC00307	231		Zlatava	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	---------	--------------	--------------

Česnek

Allium sativum L.

– jarní

ALS00635	196		Prim	04. 11. 2000	31. 12. 2001
----------	-----	--	------	--------------	--------------

– ozimý

ALS02106	196		Vladan	04. 11. 2000	31. 12. 2001
----------	-----	--	--------	--------------	--------------

Fazol obecný keříčkový

Phaseolus vulgaris L. var. *nanus* (L.) Aschers.

PHV00264	231		Jantar	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	--------	--------------	--------------

Hrách setý dřevňový

Pisum sativum L. convar. *medullare* Alef. emend C. O. Lehm.

PSS00615	765	136	Citrina	16. 03. 2001	30. 06. 2001
PSS00510	231		Mojmír	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Květák

Brassica oleracea L. convar. *botrytis* (L.) var. *botrytis* L.

BRB02020	313	186	Ambassador	28. 02. 2001	30. 06. 2001
BRB00263	231		Super	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Okurka

Cucumis sativus L.

– šalátová

CCS05283	313	186	Utopia	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	--------	--------------	--------------

Paprika

Capsicum annuum L. (partim)

CPA04442	313	186	Lambada	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	---------	--------------	--------------

Pór

Allium porrum L.

ALP04880	313	186	Franse Zomer 3	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	----------------	--------------	--------------

Rajče

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

– determinantní

LYC00074	231		Imun	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	------	--------------	--------------

– indeterminantní

LYC02041	313	186	Isidro	28. 02. 2001	30. 06. 2001
LYC01772	313	186	Matra	28. 02. 2001	30. 06. 2001
LYC04477	313	186	Riwi	28. 02. 2001	30. 06. 2001

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. *sativus*

RPS05290	313	186	Scorpio	28. 02. 2001	30. 06. 2001
----------	-----	-----	---------	--------------	--------------

Salát hlávkový

Lactuca sativa L. var. *capitata* L.

LCS01947	313	186	Alto	28. 02. 2001	30. 06. 2001
LCS01561	313	186	Karlo	28. 02. 2001	30. 06. 2001
LCS00053	231		Mělnický Máj	04. 08. 2000	30. 06. 2003

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Špenát

Spinacia oleracea L.

SPO02052 313 186 Trio 28. 02. 2001 30. 06. 2001

Zelí hlávkové bílé

Brassica oleracea L. convar. *capitata* (L.) Alef. var. *alba* DC.

BRC02574	634	186	Freshma	28. 02. 2001	30. 06. 2001
BRC02578	634	186	Marner Allfrüh	28. 02. 2001	30. 06. 2001

Léčivé a kořeninové rostliny

Kopr vonný

Anethum graveolens L.

ANG00058	231		Pražský jemný	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	---------------	--------------	--------------

Ovocné druhy

Angrešt

Ribes uva-crispa L.

RIU00117	231		Britania	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	----------	--------------	--------------

Hrušeň

Pyrus communis L.

PYR00132	231		Červencová	04. 08. 2000	30. 06. 2002
PYR02330	231		Grosdemange	04. 08. 2000	30. 06. 2003
PYR00124	231		Charneuská	04. 08. 2000	30. 06. 2003
PYR00129	231		Pařížanka	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Jabloň

Malus Mill.

MAL00223	231		Bláhovo oranžové	04. 08. 2000	30. 06. 2003
MAL00273	231		Dukát	04. 08. 2000	30. 06. 2003
MAL00135	231		Jonathan	04. 08. 2000	30. 06. 2003
MAL00137	231		Ontario	04. 08. 2000	30. 06. 2003
MAL00725	231		Vista Bella	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Meruňka

Prunus armeniaca L.

– podnož

PRA00345	256		M - YA - 4	06. 11. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	------------	--------------	--------------

Rybíz černý

Ribes nigrum L.

RIN00976	231		Fertödi I.	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	------------	--------------	--------------

Slivoň

Prunus domestica L.

PRD00157	231		Lützelsachsenská	04. 08. 2000	30. 06. 2003
PRD00161	231		Zimmerova	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Třešeň

Prunus avium (L.) L.

PRV00166	231		Rychlice	04. 08. 2000	30. 06. 2003
PRV00183	231		Winklerova raná	04. 08. 2000	30. 06. 2003

Višeň

Prunus cerasus L.

PRC00299	231		Záhoračka	04. 08. 2000	30. 06. 2003
----------	-----	--	-----------	--------------	--------------

4. Odrůdy rostlin registrované podle § 11 zákona, u kterých byla změna údaje o udržovateli v období od 2. července 2000 do 31. května 2001

Ve sloupcích uvedeny následující údaje:

- 1 – identifikační číslo odrůdy
- 2 – název odrůdy
- 3 – udržovatel dříve
- 4 – udržovatel nyní
- 5 – datum změny

Jména a adresy udržovatelů odrůd jsou uvedeny v seznamu na konci oznámení

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Zemědělské plodiny

Obilniny

Tritikale

Triticosecale Wittm.

– jarní

XTS04437	Gabo	405	1053	15. 01. 2001
----------	------	-----	------	--------------

Olejniny a přadné rostliny

Mák

Papaver somniferum L.

PPS03746	Przemko	405	1053	15. 01. 2001
----------	---------	-----	------	--------------

Brambor a jiné okopaniny

Řepa krmná

Beta vulgaris L. var. crassa Mansf.

BTC00007	Kostecká Barres	203	1069	30. 09. 2000
BTC00468	Hakó	203	1069	30. 09. 2000
BTC00956	Terka	203	1069	30. 09. 2000
BTC01430	Lenka	203	1069	30. 09. 2000

Zeleniny

Lilek vejcoplodý

Solanum melongena L.

SLM00115	Český raný	253	950	27. 11. 2000
----------	------------	-----	-----	--------------

Paprika

Capsicum annuum L.

CPA03619	Slovakia	253	950	27. 11. 2000
----------	----------	-----	-----	--------------

Ředkvička

Raphanus sativus L. var. sativus

RPS00864	Maria	253	950	27. 11. 2000
----------	-------	-----	-----	--------------

5. Jména a adresy udržovatelů odrůd, žadatelů azmocněných zástupců

Kód firmy	Název firmy	Adresa firmy
16	S.E.S. Europe N.V./S.A.	Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgie
24	Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG	Hohenlieth, 24363 Holtsee, SRN
25	Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH	Postfach 1407, 59524 Lippstadt, SRN
31	F. von Lochow-Petkus GmbH	Postfach 1197, 29296 Bergen 1, SRN
32	DLF-TRIFOLIUM, Česká republika, s.r.o.	Fulnecká 95, 742 47 Hladké Žitovice
42	Norika Nordring-Kartoffelzucht und Vermehrungs GmbH	Institutplatz 1, 18190 Groß Lüsewitz, SRN
45	Nordkartoffel-Zuchtgesellschaft mbH	Postfach 1380, 21303 Lüneburg, SRN
46	Fr. Strube Saatucht KG Söllingen	Postfach 1353, 38358 Schöningen, SRN
66	W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co.	Postfach 1151, 33814 Leopoldshöhe, SRN
68	Delitzsch Pflanzenzucht GmbH	Postfach 1333, 29306 Winsen, SRN
69	KWS SAAT AG	Postfach 1463, 37555 Einbeck, SRN
77	Nordsaat Saatuchtgesellschaft mbH	Hauptstrasse 1, 38895 Böhnshausen, SRN
103	ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.	561 82 Klášterec nad Orlicí čp. 164
110	Danisco Seed	P.O.Box 29, 4960 Holeby, Dánsko
115	DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Plantereføedling	Hojerupvej 31, 4660 Store-Heddinge, Dánsko
124	AGROFINAL spol. s r.o.	Jana Masaryka 51, 120 00 Praha 2
136	BOHEMIASEED, spol. s r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
140	MORAVOSEED spol. s r.o.	692 01 Mikulov - Mušlov 347
145	FORCE LIMAGRAIN, s.r.o.	Masarykovo nám. 1054, 763 12 Vizovice
147	OSEVA UNI, a.s.	Na Bílé 1231, 565 14 Choceň
151	MEDIPO AGRAS H.B., spol. s r. o.	Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
157	Josef Thor	Pěněčín 39, 463 45 Pěněčín
158	OSEVA PRO s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
159	Výskumný ústav rastlinnej výroby	Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany, Slovenská republika
160	OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.	Přízova 8-10, 657 92 Brno
163	Výskumný ústav rostlinné výroby	Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
171	AGROGEN, spol. s r.o.	Zahradní 1a, 664 41 Troubsko
172	SELGEN, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
180	STRUBE-DIECKMANN ČR, spol. s r.o.	Ve Starém Lobečku 9, 278 01 Kralupy nad Vltavou
183	BEJO BOHEMIA, s.r.o.	Podůlšany 49, 533 45 Opatovice nad Labem
186	Ing. Ferdinand Hoffmann, CSc. - služby pro zemědělství	Stochovska 4, 161 00 Praha 6

<i>Kód firmy</i>	<i>Název firmy</i>	<i>Adresa firmy</i>
193	Ing. Milan Říha, CSc,	Nuselská 42, 140 00 Praha 4
196	CEZEA - šlechtitelská stanice, a.s.	696 14 Čejč
201	Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.	Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
202	PLANT SELECT, spol. s r.o.	Hrubčice 111, 798 21 Bedihošť
203	Šlechtitelská stanice Kostelec u Křížků	251 68 Štířín
213	Axel Toft Grovvarer A/S	Durup, 7870 Roslev, Dánsko
216	Vesa Velhartice, šlechtění a množení brambor, a.s.	341 42 Kolínec
219	Vysočina Vyklantice, a.s.	394 27 Vyklantice 32
222	AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.	Zemědělská 16, 787 01 Šumperk
231	SEMPRA PRAHA a.s.	U topfren 2, 170 41 Praha 7
239	SEMO s.r.o.	798 17 Smržice 414
242	Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví	Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
253	Semex spol. s r.o.	900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
255	SAATEN - UNION CZ s.r.o.	Dubová 17, 637 00 Brno
256	SEVA-FLORA s.r.o.	Mikulovská 366, 691 42 Valtice
268	Syngenta Czech s.r.o.	294 46 Semčice
271	Selekta, a.s.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
273	Mgr. Jan Meisl	Dvořákova 985, 697 01 Kyjov
276	Institut za ratarstvo i povrtarstvo	M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Jugoslavie
278	Bejo Zaden B.V.	P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemsko
279	D.J. Van der Have B.V.	P.O. Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
283	Hodowla Roslin Szelejewo Sp. z o.o.	63-813 Szelejewo, Polsko
292	Cebeco Zaden B.V.	P.O. Box 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemsko
293	De Ruiter Seeds C.V.	P.O. Box 1050, 2660 BB Bergschenhoeg, Nizozemsko
294	Agrico Holland	P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord, Nizozemsko
299	Royal Sluis B.V.	P.O. Box 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
301	Novartis Seeds B.V. Vegetables & Flowers	P.O. Box 26, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemsko
306	Zelder B.V.	P.O. Box 26, 6590 AA Gennep, Nizozemsko
310	De Z.P.C., B.A.	P.O. Box 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemsko
311	Hettema Zonen Kweekbedrijf B.V.	P.O. Box 99, 8304 AS Emmeloord, Nizozemsko
313	Rijk Zwaan B.V.	Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemsko
316	Kuhn & CO., International B.V.	Post Box 99, 5250 AB Vlijmen, Nizozemsko

Kód firmy	Název firmy	Adresa firmy
320	Nickerson Zwaan B.V.	Postbus 19, 2990 AA Barendrecht, Nizozemsko
339	Rustica Prograin Génétique	Domaine de Sandreau, 31700 Mondonville, Francie
357	Nickerson S.A.	Z.I. Route de Saumur, 49160 Longue Jumelles, Francie
362	LIMAGRAIN GENETICS Grandes Cultures S.A.	B.P. 115, 63203 Riom Cedex, Francie
373	Nickerson Seeds Ltd.	Rothwell, Lincoln LN7 6DT, Velká Británie
380	New Farm Crops Ltd.	Market Stajnton, Market Rasen Lincolnshire LN3 5 LJ, Velká Británie
405	I.H.A.R. Radzików	05-870 Blonie, Polsko
423	Crebas, J.A.	Hopweg 17, 8315 RH Luttelgeest, Nizozemsko
427	ADVANTA B.V.	P.O. Box 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemsko
444	Svalöf Weibull AB	268 81 Svalöv, Švédsko
447	Novartis Seeds AB	Box 302, 261 23 Landskrona, Švédsko
460	Südwestdeutsche Saat-zucht	Im Rheinfeld 1-13, 76437 Rastatt, SRN
463	Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
464	NOVUM SEEDS, s.r.o.	Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
469	MONSANTO ČR s.r.o.	Rybškova 1, 602 00 Brno
475	LIBERA, ing. Jiřina Teclová	Vrbka 154, 725 26 Ostrava - Krásné Pole
482	Danisco Seed Austria Ges.m.b.H., organizační složka v ČR	Leoše Janáčka 494, 280 00 Kolín
493	Pioneer Saaten GmbH, organizační složka	J. Opletala 1279, 690 02 Břeclav
495	AGRO ALI, spol. s r.o.	Přímětice 229, 669 02 Znojmo
497	Barenbrug Holland B.V.	Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout, Nizozemsko
498	Ing. Josef Vrabec	Kotorská 1579/36, 140 00 Praha 4
500	SAATBAU LINZ CIESKA REPUBLIKA spol. s r.o.	Čechova 59, 370 01 České Budějovice
514	TURF-SEED, Inc.	29975 Barlow Rd., Canby OR 97013, USA
515	Western Seed España Carrizal - Las Palmas, Gran Canaria, Španělsko	Bajada de Vargas s/n, 22-35080 Apdo. Correos,
519	Sativa Keřkov, a.s.	Dobrovského 3538, 580 03 Havlíčkův Brod
526	Saat-zucht Bauer GmbH	Postfach 1127, 93081 Niedertraubling, SRN
528	Saat-zucht J. Breun GdbR	Amselweg 1, 91074 Herzogenaurach, SRN
535	VP AGRO, spol. s r.o.	Stehlíkova 977, 165 00 Praha 6 - Suchbát
552	SATIVA - Soc. Coop. a r.l.	Via Calcinaro, No. 2425, 47023 Cesena, Itálie
558	PASÍČ spol. s r.o.	Nové domky 175, 747 56 Dolní Životice
562	Ing. Jan Kozák	Poběžovice 31, 534 01 Holice v Čechách

<i>Kód firmy</i>	<i>Název firmy</i>	<i>Adresa firmy</i>
578	Ústav experimentální botaniky AV ČR	Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
588	Miroslav Kostiha	Sadová 900, 691 42 Valtice
615	Kamjanec - Podolskij selskogospodarskij institut	Ševčenko 13, Kamjanec-Podolskij, 281900 Chmelnicka obl., Ukrajina
617	Landbrugets Kartoffelfond	Grindstedvej 55, 7184 Vandel, Dánsko
628	Řepářský institut Semčice, spol. s r.o.	294 46 Semčice 69
634	Marner GZG Saaten AG	Königstrasse 47, 25705 Marne, SRN
636	CEBECO SEEDS s.r.o.	Podedvorská 755/5, 198 00 Praha 9 - Kyje
645	Ing. Jaroslava Sácká	Dyákovičky 92, 669 02 Znojmo
653	Europant Pflanzenzucht GmbH	Postfach 1380, 21335 Lüneburg, SRN
657	Ing. Peter Kováčik	Pod Fialkou 2734/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
662	RAILA - IMPEX spol. s r.o.	Na Bílé 1231, 565 01 Choceň
670	R.A.G.T. S.A.	B.P. 31, 12033 Rodez Cedex 9, Francie
675	Nickerson Pflanzenzucht GmbH	Am Griewenkamp 2, 31234 Edemissen, SRN
678	MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet	Brunszvik út 2, 2462 Martonvásár, Maďarsko
708	Larsen Seeds	Sandagervej 12, 5240 Odense NO, Dánsko
711	Novartis Seeds SA	B.P. 27, 31790 Saint Sauveur, Francie
722	Ing. Dagmar Rajnochová	Slovácká 379, 691 44 Lednice
736	AGRI OBTENTIONS	La Minière, 78042 Guyancourt Cedex, Francie
738	Antonín Grošek	Zábranského 6, 616 00 Brno
753	RAPS GbR, Saatzucht Lundsgaard	Lundsgaarder Weg 1, 24977 Grundhof, SRN
765	Saatzucht Aschersleben	Albert-Drosihn-Strasse 9, 6449 Aschersleben, SRN
777	Pioneer Hi-Bred International, Inc. Iowa 50309, USA	700 Capital Square, 400 Locust Street, Des Moines,
781	MAIS ANGEVIN S.A.	49250 Saint Mathurin, Francie
784	Handelmaatschappij VAN RIJN B.V.	P.O. Box 6, 26900 AA s-Gravenzande, Nizozemsko
785	AGRORADOST s.r.o.	Radostín 12, 582 41 Skuhrov
786	MORSEVA, spol. s r.o.	Přerovská 41, 772 11 Olomouc
788	PROCOSEM SA	Domaine du Chaumois, 18570 Le Subdray, Francie
789	Ing. Bohuslav Holman	Bzinská 1420, 696 81 Bzenec
880	ELITA obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo	Brněnská 634, 664 42 Modřice
904	Peto Seed	P.O. Box 4206, Saticoy, California 93003, USA
916	Jižní Morava, a.s.	691 53 Tvrdonice 701

<i>Kód firmy</i>	<i>Název firmy</i>	<i>Adresa firmy</i>
923	Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa	ul. Kopanina 28/32, 60-951 Poznań, Polsko
944	Monsanto SAS	Immeuble Elysée la Défense, 92056 Paris la Défense, Francie
948	EUROPLANT šlechtitelská spol. s r.o.	Lhotská 2221/32, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
950	ZELSEED s.r.o. Slovenská republika	Horná Potoň 16, 930 36 Horná Potoň,
951	Ing. Jindra Skřivánková	Pražská 895, 289 12 Sadská
982	AMPELOS, ŠLECHTITELSKÁ STANICE VINAŘSKÁ ZNOJMO, a. s.	Vrbovec 274, 671 24 Vrbovec
992	Nunza B.V.	P.O. Box 4005, 6080 AA Haelen, Nizozemsko
996	Julius Wagner GmbH	Eppelheimer Str. 18-20, 69115 Heidelberg, SRN
1015	Advanta International B.V., organizační složka	Pohoří 184, 518 01 Dobruška
1032	Advanta Seeds BV	P.O. Box 127, 5250 AC Vlijmen, Nizozemsko
1033	Edward Vinson Ltd	Sandbanks, Faversham, ME13 9DJ Kent, Velká Británie
1039	Langrovo zahradnictví, Ing. Jiří Langr	Jurkova 338, 679 02 Rájec - Jestřebí
1040	AGRICO Bohemia s.r.o.	Šafaříkova 2962, 390 02 Tábor
1053	Hodowla Roslin Strzelce, Sp. z o. o.	ul. Główna 20, 99-307 Strzelce, Polsko
1061	NOREX NORIKA Exportgesellschaft mbH	Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
1069	Ing. Vladimír Pokorný	Čelakovského 957, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou